

Инструкция по применению в соответствии с Положением о фармацевтах (препараты) 1986 г.

Безрецептурный препарат

## "Аф Типонет" Капли для носа

**Состав:** Активные ингредиенты и их концентрация  
Натрия хлорид 0,9% (Sodium Chloride 0.9%)

**Неактивные ингредиенты:** см. пункт 6 "Дополнительная информация". Перед применением препарата внимательно прочтите инструкцию полностью. Данный вкладыш содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обращайтесь к врачу или к фармацевту. Вы должны использовать данный препарат правильным образом. Если вам необходима дополнительная информация, проконсультируйтесь с фармацевтом.

**Если в течение трех дней признаки заболевания (симптомы) не проходят или усугубляются, обратитесь к врачу.**

### 1. Для чего предназначен препарат?

Для облегчения заложенности носа у младенцев и маленьких детей.

**Терапевтическая группа** Солевой раствор

### 2. Перед использованием препарата

**Не используйте препарат:**

- если у вас или у вашего ребенка имеется чувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате. См. список неактивных ингредиентов в пункте 6: "Дополнительная информация".

### ⚠ Особые предостережения относительно применения данного препарата

• Не использовать препарат без консультации с врачом перед началом лечения. Если вы или ваш ребенок страдаете или страдали от следующих проблем:

- нарушение функции сердца и/или кровеносных сосудов, гипертония

- нарушение функции печени

- у вас имеется чувствительность к какому-либо продукту питания или лекарственному препарату.

• Не используйте данный препарат часто или в течение длительного периода, не проконсультировавшись с врачом.

Если вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

**Важная информация о некоторых ингредиентах лекарства** Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение слизистых оболочек носа Беременность и грудное вскармливание Данный препарат можно использовать в ходе беременности и грудного вскармливания.

### ⚠ Беременность и грудное вскармливание:

Данный препарат можно использовать в ходе беременности и грудного вскармливания

### 3. Использование лекарственного препарата

Если вы не уверены в том, как следует применять препарат, обратитесь к врачу или фармацевту.

#### Инструкция пользования:

• Осторожно высморкайте нос. В положении сидя или стоя запрокиньте голову ребенка назад или положите его и наклоните голову в сторону. Закапайте капли в каждую ноздрю, оставив после этого голову запрокинутой еще несколько минут, чтобы позволить препарату распространиться в полости носа.

• Промойте пипетку под теплой водой и осушите чистым бумажным полотенцем.

Плотно закройте флакон после использования. Во избежание распространения инфекции, используйте для каждого ребенка отдельный флакон.

**Дозировка:** Стандартная дозировка, если врач не дал иных указаний: по 2 капли в каждую ноздрю, 1-4 раза в день. **Не превышайте рекомендуемую дозу.**

Если не наблюдается улучшения в состоянии в течение трех дней, обратитесь к врачу. **Внимание!** Не глотать. Данный препарат предназначен для закапывания в нос.

#### Избегайте контакта с глазами.

В случае непреднамеренной передозировки или если препарат случайно проглотил ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку препарата.

Если вы забыли принять лекарство в запланированное время, примите его, как только вспомните. Ни в коем случае не принимайте две дозы вместе! Не принимайте лекарства в темноте! Проверьте этикетку и дозу при каждом приеме препарата. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь. Если у вас имеются дополнительные вопросы в отношении применения препарата, обращайтесь к врачу или к фармацевту.

### 4. Побочные явления:

Как и любое другое лекарство, раствор "Аф Типонет" может вызвать у некоторых людей побочные явления, такие как раздражение или временное жжение в носу. Не пугайтесь, читая список побочных явлений. Возможно, ни одно из них у вас не проявится.

### Прекратите применение и обратитесь к врачу:

- В случае гипертензии (выражается в таких симптомах, как румянец)
- В случае раздражения или местного воспаления (которых не было перед началом лечения препаратом), (редко).

### ⚠ Побочные явления у детей и младенцев

Родители должны сообщать лечащему врачу о любом побочном явлении и о любом дополнительном препарате, который получает ребенок. Обратитесь к списку особых побочных явлений выше. Если проявилось побочное явление, одно из побочных явлений ухудшается или если вы страдаете от побочных явлений, не упомянутых в инструкции, просьба проконсультироваться с врачом.

**Сообщение о побочных явлениях** О побочных явлениях можно сообщить посредством специализированной он-лайн формы, которая находится на домашней странице сайта Министерства здравоохранения [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

или по следующей ссылке:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

### 5. Как хранить препарат?

• **Избегайте отравления!** Данный препарат и любые другие лекарства необходимо хранить в закрытом и недоступном для детей и/или младенцев месте во избежание отравления.

Не вызывайте рвоту без четкого указания врача.

• Не используйте лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке.

Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

• Храните препарат в прохладном месте при температуре ниже 25°C.

• Плотно закрывайте, чтобы избежать проникновения воздуха и влажности.

• Хранить в оригинальной упаковке.

• Препарат можно использовать в течение месяца после вскрытия. Не используйте данный препарат, если вы замечаете изменение в цвете раствора или его помутнение

### 6. Дополнительная информация

Внешний вид препарата и содержание упаковки

Прозрачная жидкость. Содержимое: 10, 20 мл

**Производитель и владелец лицензии:**

"Бен-Шимон Флориш" Лтд., промышленный парк

Мисгав, полевая почта: Мисгав 2017400.

Данная инструкция была проверена и утверждена

Министерством здравоохранения: 08/2015

• Номер регистрации фармацевтического препарата в государственном реестре лекарств

в Министерстве здравоохранения: 1340831368