

ريزالت RPD
١٠ ملغ
أقراص ذوابة

كل قرص يحتوي على:
Rizatriptan 10 mg
(as benzoate)
ريزاتريبتان ١٠ ملغ
(على هيئة بينزوات)

ريزالت
١٠ ملغ
أقراص

كل قرص يحتوي على:
Rizatriptan 10 mg
(as benzoate)
ريزاتريبتان ١٠ ملغ
(على هيئة بينزوات)

ريزالت
٥ ملغ
أقراص

كل قرص يحتوي على:
Rizatriptan 5 mg
(as benzoate)
ريزاتريبتان ٥ ملغ
(على هيئة بينزوات)

لقائمة المواد غير الفعّالة، أنظر بند ٦. أنظر أيضًا بند ٢.٧ "معلومات مهمة بخصوص جزء من مركبات ريزالت أقراص وريزالت RPD أقراص ذوابة".

إلا إذا ذُكر غير ذلك، المعلومات في النشرة للمستهلك هذه صالحة لريزالت أقراص وريزالت RPD أقراص ذوابة.

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن ريزالت أقراص وريزالت RPD أقراص ذوابة. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، إسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
- هذا الدواء وُصف للعلاج من أجلك. لا تعطه إلا آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى لو بدا لك بأن أعراضهم مشابهة لأعراضك.
- الدواء مُخصص للبالغين فوق جيل ١٨.

١. ما هو ريزالت ولأي غرض يُستعمل؟

ريزالت يُستعمل لمعالجة النوبات الحادة من ألم الرأس النصفي (ميجرينا) لدى الكبار، مع أو بدون اوردة.

لا يجوز استعمال ريزالت لمنع نوبات ألم الرأس النصفي (ميجرينا).

ريزالت غير مُخصص لمعالجة الشقيقة الفالجية أو القاعدية.

من غير المعروف فيما إذا كان ريزالت آمن وفعال لمعالجة الصداع العنقودي.

الفصيلة العلاجية: ريزالت ينتمي لمجموعة أدوية المدعوة مُناهضات انتقائية لمستقبلات 5-HT_{1B/1D} أو تريبتانات.

٢. قبل تناول ريزالت

١.٢ لا تتناول ريزالت إذا:

- كنت حساس (أرجي) لريزاتريبتان بينزوات أو لأي واحد من المركبات الأخرى لريزالت (لقائمة المركبات غير الفعّالة، أنظر بند ٦).
- يوجد لديك أو كانت لديك في الماضي مشاكل في القلب.
- يوجد لديك أو كانت لديك في الماضي سكتة أو نوبة اقفارية عابرة (TIA).
- يوجد لديك أو كانت لديك في الماضي مشاكل في الأوعية الدموية بما في ذلك مرض معوي اقفاري.
- يوجد لديك ضغط دم مرتفع غير متوازن.
- كنت تتناول في نفس الوقت أدوية مضادة للإكتئاب النفسي من نوع مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAO) أو إذا تناولت مثبطات MAO خلال الأسبوعين الأخيرين (أنظر أيضًا بند "٢.٣ تناول أدوية أخرى").
- تناول أي دواء آخر من نفس الفصيلة (تريبتانات) مثل سوماتريبتان، ناراتريبتان، زولميتريبتان، إلبترينان، لمعالجة الشقيقة الخاصة بك خلال ال- ٢٤ ساعة الأخيرة (أنظر أيضًا بند "٢.٣ تناول أدوية أخرى").
- تناولت أدوية التي تحتوي على إيرغوتامين مثل إيرغوتامين، ديهيدرو إيرغوتامين أو ميتيسرجيد خلال- ٢٤ ساعة الأخيرة (أنظر أيضًا بند "٢.٣ تناول أدوية أخرى").
- يوجد لديك شقيقة فالجية أو قاعدية.

تحدث مع طبيبك قبل تناولك هذا الدواء إذا كان لديك أحد الأوضاع المسجلة أعلاه أو إذا كنت غير متأكد فيما إذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية.

٢.٢ تحذيرات خاصة بخصوص استعمال ريزالت

قبل العلاج بريزالت، أخبر طبيبك إذا:

- يوجد لديك أو كانت لديك في الماضي مشاكل في القلب (مثل نوبة قلبية، نقص في تزويد القلب بالدم أو تغيرات في النظم أو في وتيرة دقات القلب)، ضغط دم مرتفع، ألم في الصدر أو ضيق تنفس.
- يوجد لديك أي عامل اختطار (احتمال خطر) لمرض قلب أو مرض أو عية دموية مثل ضغط دم مرتفع، سكري، كولسترول مرتفع، بدانة زائدة، تدخين، سابقة عائلية لمرض في القلب، أنت امرأة بعد توقف الدورة الشهرية، أنت رجل فوق عمر ٤٠.
- يوجد لديك أو كانت لديك في الماضي أية حساسيات.
- يوجد لديك بييلة الفينيل كيتون (PKU). ريزالت RPD أقرص ذوابة تحتوي على فينيل آلانين (أنظر أيضًا بند ٢.٧ "معلومات مهمة بخصوص جزء من مركبات ريزالت أقرص وريزالت RPD أقرص ذوابة").
- أنت حامل أو تخططين للدخول في الحمل، أو إذا كنت مرضعة، أو تخططين للإرضاع (أنظري بند ٢.٥ "الحمل والإرضاع").
- أنت تتناول أو تخطط لتناول أي أدوية، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، والأدوية التي تتناولها عادةً لنوبات ألم الرأس النصفي (ميجرينا) (أنظر بند ٢.٣ "تناول أدوية أخرى"). التي من الممكن أن تُطور تدهور في ألم الرأس (MOH - medication overuse headache) نتيجة لاستعمال مُفرط بأدوية للشقيقة (مثل: إيرغوتامين، تريبتانات، أفيونات، أو دمج هذه الأدوية لأكثر من ١٠ أيام في الشهر).
- إذا كنت تتناول ريزالت بشكل متقارب أكثر مما ينبغي، الأمر قد يسبب لك آلام رأس مزمنة. في هذه الحالات، عليك التوجه إلى طبيبك، لأنه من الممكن أن تحتاج إلى التوقف عن تناول ريزالت.
- أنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الكلية أو في الكبد.
- يوجد لديك مشاكل طبية أخرى.
- أخبر طبيبك عن أعراضك. طبيبك سيقدر فيما إذا كان لديك ألم الرأس النصفي (ميجرينا). يجب تناول ريزالت فقط لأجل نوبة ألم الرأس النصفي (ميجرينا). لا يجوز استعمال ريزالت لمعالجة آلام رأس التي قد تنتج عن طريق أوضاع عصبية أخرى، وخيمة أكثر.

٢.٣ تناول أدوية أخرى

إذا كنت تأخذ أو أخذت في الآونة الأخيرة أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي بذلك.

أدوية التي لا يجوز تناولها بالتزامن مع ريزالت (أنظر بند ٢.١ "لا تتناول ريزالت إذا:")

- لا يجوز تناول ريزالت مع أي مستحضر آخر من نفس المجموعة (تريبينات) خلال ٢٤ ساعة، مثل سوماتريبتان، ناراتريبتان، زولميتريبتان، أو ألتريبيتان.
- لا يجوز تناول ريزالت خلال ٢٤ ساعة من موعد تناول أدوية التي تحتوي على إيرغوتامين، مثل إيرغوتامين، ديهيدرو إيرغوتامين أو ميتيسرجيد لمعالجة الشقيقة الخاصة بك.
- لا يجوز تناول ريزالت عندما أنت تتناول أدوية مضادة للاكتئاب النفسي من نوع مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAO)، مثل موكلوبيميد، ايزوكاربوكسازيد، فينيلزين أو ترانيلسيبرومين، وبارجيلين أو في حالة مرور أقل من أسبوعين منذ التوقف عن تناول مثبط ال-MAO.

على وجه الخصوص يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ:

- أدوية التي تحتوي على پروبرانولول (أنظر بند ٣ "كيف تستعمل ريزالت؟").
- أدوية المستعملة لمعالجة اضطرابات في المزاج، بما في ذلك أدوية من مجموعة مثبطات إعادة إمتصاص السروتونين (SSRIs) مثل فلوأوكسيتين، فلوفاكسامين، پاروكسيتين، اسيتالوبرام أوكساليت وسيرتالين أو مثبطات إعادة إمتصاص السروتونين- نورابينفرين (SNRIs)، مثل فينلافاكسين ودولوكسيتين للاكتئاب.

٢.٤ تناول ريزالت مع طعام وشراب

من الممكن أن يستغرق ريزالت وقت أكثر للعمل في حال تمّ أخذه بعد الطعام. بالرغم من أنه من المفضلّ أخذه على معدة فارغة، ما يزال باستطاعتك أخذه إذا أكلت.

٢.٥ الحمل والإرضاع

من غير المعروف فيما إذا كان ريزالت يضُر الجنين عندما يتمّ تناوله من قبل امرأة حامل.

أخبري الطبيب قبل تناول الدواء إذا كنت حامل أو تخططين للحمل.
من غير المعروف فيما إذا كان ريزالت ينتقل لحليب الأم. إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، إستشيري طبيبك. يجب الامتناع عن الإرضاع خلال ٢٤ ساعة بعد العلاج.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الأدوية.

٢.٦ السياقة أو استعمال الآلات

ريزالت قد يسبب الدوار، النعاس، التعب، الضعف أو الإغماء. إذا كنت تشعر بهذه الأعراض، لا يجوز سياقة مركبة، تشغيل آلات خطرة أو العمل بأي نشاط آخر الذي يستلزم اليقظة.

٢.٧ معلومات مهمة بخصوص جزء من مركبات ريزالت أقراص وريزالت RPD أقراص ذوابة

ريزالت ٥ ملغ وريزالت ١٠ ملغ أقراص: قرص من عيار ٥ ملغ يحتوي على ٣٠.٢٥ ملغ لكتوز مونهيدرات. قرص من عيار ١٠ ملغ يحتوي على ٦٠.٥٠ ملغ لكتوز مونهيدرات. يجب إعلام الطبيب إذا كنت تعاني من عدم تحمل للكتوز.

ريزالت ١٠ ملغ RPD أقراص ذوابة: يحتوي على مصدر للفينيل آلانين، الذي قد يكون مُضّر للأشخاص الذين يُعانون من بيلة الفينيل كيتون. كل قرص ذوَاب من ريزالت RPD ١٠ ملغ يحتوي على ٣.٧٥ ملغ من أسبارتام (الذي يحتوي على ٢.١٠ ملغ فينيل آلانين).

٣. كيف تستعمل ريزالت؟

دائمًا يجب تناول ريزالت وفقًا لتعليمات الطبيب تمامًا. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن مُتأكدًا. الجرعة وفترة العلاج يُحددان من قبل الطبيب.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

الجرعة القصوى هي ٣٠ ملغ ريزالت لفترة ٢٤ ساعة. لا يجوز تناول أكثر من ٣٠ ملغ ريزالت بفترة زمنية من ٢٤ ساعة (مثلًا، لا يجوز تناول أكثر من ثلاث أقراص أو أقراص ذوابة من ١٠ ملغ خلال ٢٤ ساعة).

إذا كنت مُعالج ببروبرانولول، عليك استعمال جرعة من ريزالت ٥ ملغ حتى ٣ جرعات بفترة زمنية من ٢٤ ساعة (١٥ ملغ إجمالًا).

هذا الدواء غير مُخصص للإعطاء للأطفال والمراهقين دون عمر ١٨ سنة.

إن أغلب نوبات ألم الرأس النصفى تخف بواسطة ريزالت. لكن، لدى بعض المرضى، أعراض ألم الرأس النصفى يمكنها أن تعود خلال فترة زمنية قدرها ٢٤ ساعة. في حالة تكرار ألم الرأس النصفى، بالإمكان تناول جرعة إضافية من ريزالت. يجب الإنتظار دائمًا ساعتين على الأقل بين جرعة وأخرى. في حالة عدم إستجابتك لريزالت خلال النوبة، من الموصى به عدم تناول ريزالت لمعالجة نفس النوبة. لكن، لا يزال بالإمكان أن تستجيب لريزالت في النوبة التالية.

طريقة الاستعمال:

ريزالت أقراص: يجب ابتلاع القرص كاملاً مع سائل. لا توجد معلومات بخصوص سحق/شطر/مضغ الأقراص.

ريزالت أقراص ذوابة: أبق قرص RPD الذوَاب في عبوته حتى اللحظة التي تكون بها أنت مستعد لتناوله.

لا يجوز إخراج لويحة الأقراص من الكيس الخارجي حتى موعِد قريب من تناول الدواء.

– فَمُ بإخراج لويحة الأقراص من كيس الألومنيوم. لا يجوز دفع القرص الذوَاب من ريزالت RPD عبر لويحة الأقراص.

– بأيدي جافة يجب تفشير لويحة الأقراص لفتحها ويجب وضع القرص الذوَاب على اللسان، هناك سوف يذوب بسرعة ويبلع مع لعابك. لا حاجة للتناول مع سائل. بالإمكان تناول القرص بدون علاقة مع وجبات الطعام.

إذا تناولت ريزالت أكثر مما ينبغي:

إذا قمت بتناول ريزالت أكثر مما ينبغي، توجه إلى طبيبك فورًا أو توجه فورًا إلى غرفة الطوارئ في المستشفى الأقرب إليك.

إذا أفرطت في تناول الجرعة أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فورًا إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحبًا عبوة الدواء معك.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! يجب التحقق من المصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. يجب تركيب النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

٤. الأعراض الجانبية

ككل أي دواء, قد بسبب استعمال ريزالت أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

يجب التوجه إلى الطبيب أو التوجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفى الأقرب إليك فوراً, إذا كنت تُطوّر أحد الأعراض الجانبية الوخيمة لريزالت بما في ذلك:

• نوبة قلبية. أعراض النوبة القلبية قد تشمل:

- عدم راحة في مركز الصدر الذي يستمر أكثر من عدة دقائق أو أنها تغيب وتعود
- عدم راحة في الصدر الذي يعطي شعور كضغط غير مريح, ضغط, شعور بالتخمة أو ألم
- ألم أو عدم راحة في الأذرع, في الظهر, في الرقبة, في الفك أو في البطن
- ضيق تنفس مع أو بدون عدم راحة في الصدر
- عرق بارد
- غثان أو تقيؤ
- شعور بالدوار

• سكتة دماغية. أعراض سكتة دماغية قد تشمل الأعراض المفاجئة التالية:

- قلة شعور أو ضعف في الوجه, في الأذرع أو في اليدين, خاصة في جانب واحد من الوجه
- ارتباك, مشاكل في التحدث أو في الفهم
- مشاكل في الرؤية في عين واحدة أو في كلتا العينين
- مشاكل في المشي, دوار, قلة توازن أو تناسق
- ألم رأس وخيم دون سبب معروف

• مشاكل في الأوعية الدموية. أعراض لمشاكل في الأوعية الدموية قد تشمل:

- ألم بطن
- إسهال دمّي
- مشاكل في الرؤية
- برودة وقلة شعور في اليدين وفي الرجلين

• متلازمة السروتونين. وضع المدعو متلازمة السروتونين قد يحدث عندما يتم تناول أدوية من نوع التريبتانات مثل ريزالت مع أدوية معينة أخرى. أعراض متلازمة السروتونين قد تشمل:

- عدم الهدوء
- هلوسات
- غيبوبة
- وتيرة قلب سريعة
- تغيرات سريعة في ضغط الدم
- ارتفاع في حرارة الجسم
- تشنجات عضلات
- فقدان التناسق
- غثيان, تقيؤ أو إسهال

• ضغط دم مرتفع.

• ردود فعل أرجية بما في ذلك انتفاخ الوجه, الشفتين, اللسان و/أو الحلق الذي قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس و/أو في البلع, صفير, شرى, طفح وتقشر وخيم للجلد.

• بالإضافة إلى ذلك, أخبر طبيبك إذا كنت تشعر بأعراض التي تُدل على رد فعل أرجي (مثل طفح أو حكة) بعد تناول ريزالت.

أعراض جانبية إضافية:

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لريزالت تشمل:

- شعور بالنعاس أو تعب
- ألم أو شعور بالضغط في الصدر أو في الحلق
- دوار

أعراض جانبية أخرى (ساعة: ١ حتى ١٠ ل-١٠٠ مُعالج: غير شائعة: من ١ حتى ١٠ ل-١٠٠٠ مُعالج: نادرة: ١ حتى ١٠ ل-١٠٠٠٠ مُعالج) وأعراض جانبية شائعة غير معروف:

اضطرابات في الجهاز المناعي: نادرة: رد فعل أرجي (حساسية مفرطة), رد فعل أرجي مفاجئ مُهدد للحياة (تفاعل تاق).
اضطرابات في الجهاز الهضمي: شائعة: غثيان, تقيؤ, اسهال, جفاف في الفم, صعوبات هضم (عسر هضم); غير شائعة: عطش.

اضطرابات في الجهاز التنفسي, القصبة الهوائية وتجويف الصدر: شائعة: عدم راحة/ألم في الحلق; غير شائعة: صعوبة في التنفس (ضيق تنفس); نادرة: صفير.

اضطرابات في جهاز الهيكل العظمي والعضلات والأنسجة الضامة: شائعة: شعور بالثقل في أجزاء من الجسم, تصلب, ألم في الرقبة; غير شائعة: شعور بالشد في أجزاء معينة من الجسم, ضعف عضلات, ألم عضلات وألم في الوجه.
اضطرابات في الجلد وفي الأنسجة تحت الجلد: شائعة: إحمرار الوجه (إحمرار في الوجه الذي يستمر مدة قصيرة); غير شائعة: تعرق, حكة, طفح الذي يتميز بكدمات مرتفعة (شرى), طفح, وذمة وعائية (انتفاخ الوجه, الشفتين, اللسان و/أو الحلق الذي قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس و/أو في البلع).

اضطرابات قلبية: شائعة: وتيرة قلب سريعة أو غير منتظمة (خفقان); غير شائعة: وتيرة قلب سريعة جدًا (تسرع القلب), تغيرات في نظم القلب أو في وتيرة خفقان القلب (اضطراب النظم), نتائج شاذة لتخطيط القلب (فحص الذي يسجل النشاط الكهربائي لقلبك), نادرة: سكتة دماغية (عادةً تحدث لدى معالجون أصحاب عوامل اختطار (احتمال خطر) لأمراض قلب وأوعية دموية (فرط ضغط الدم, سكري, تدخين, استعمال بدائل نيكوتين, تاريخ عائلي لمرض قلب أو سكتة دماغية, رجال فوق عمر ٤٠, نساء بعد توقف الدورة الشهرية, مشكلة معينة بالشكل الذي يخفق قلبك فيه (إنسداد حزمة bundle - branch block)), وتيرة قلب بطيئة (بطء نظم القلب).

اضطرابات في الأوعية الدموية: غير شائعة: موجات حرارة, فرط ضغط الدم; شائعة غير معروف: افقار في الأوعية الدموية المحيطة.

اضطرابات في الجهاز العصبي: شائعة: دوار, نعاس, شعور وخز في الجلد (مذل), ألم رأس, انخفاض في حساسية الجلد (hypoesthesia), تدني الحدة الذهنية; غير شائعة: إغماء, رجفة, مذاق سيء في الفم, قلة ثبات عند المشي (ترنح), دوار.

اضطرابات نفسية: شائعة: قلق قبل النوم; غير شائعة: ارتباك/تواهن.

اضطرابات في العينين: غير شائعة: رؤية مشوشة.

اضطرابات عامة وأوضاع متعلقة بمنطقة الإعطاء: شائعة: ألم في البطن أو في الصدر, تعب.

أعراض جانبية التي تم التبليغ عنها والتي تواترها غير معروف:

- نوبة قلبية, تشنج الأوعية الدموية للقلب (عادةً تحدث لدى معالجون أصحاب عوامل اختطار (احتمال خطر) لأمراض قلب وأوعية دموية (فرط ضغط الدم, سكري, تدخين, استعمال بدائل نيكوتين, تاريخ عائلي لمرض قلب أو سكتة دماغية, رجال فوق عمر ٤٠, نساء بعد توقف الدورة الشهرية, مشكلة معينة بالشكل الذي يخفق قلبك فيه (إنسداد حزمة - bundle branch block)).

- تقشر وخيم للجلد, مع أو بدون سخونة (تقشر الأنسجة المتموتة البشرية التسممي - Toxic epidermal necrolysis).

- اختلاجات (تشنجات/نوبات صرعية).

- متلازمة تُدعى "متلازمة السروتونين" التي قد تؤدي إلى أعراض جانبية مثل, غيبوبة, ضغط دم غير ثابت, حرارة جسم مرتفعة جدًا, قلة تناسق العضلات, قلة هدوء وهلوسات.

- تشنج أوعية دموية في الأطراف, بما في ذلك برودة وقلة شعور باليدين أو بالرجلين.

- تشنج أوعية دموية في القولون التي قد تسبب ألم في البطن.

- اضطرابات رؤية مثل بصيص, انخفاض في الرؤية, رؤية مزدوجة, فقدان الرؤية وفي حالات معينة حتى عيوب لا رجعة فيها في الرؤية (بالرغم من أن هذه قد تكون بسبب نوبة ألم الرأس النصفية (ميجرينا) نفسه).

إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة, عليك استشارة الطبيب.

٥. كيفية تخزين ريزالت؟

- **تجنب التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء, وكل دواء آخر, في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ونظر الأطفال و/أو الرضع, وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون أمر صريح من الطبيب!
- لا يجوز استعمال ريزالت بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين:

ريزالت ٥ ملغ أقراص, ريزالت ١٠ ملغ أقراص وريزالت RPD ١٠ ملغ أقراص ذوابة: يجب التخزين دون ٣٠ درجة مئوية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي ليس لها ضرورة بعد. هذه الخطوات تُساهم في الحفاظ على جودة البيئة.

٦. معلومات إضافية

٦.١ ماذا يحوي ريزالت؟

المادة الفعالة بريزالت هي ريزاتريبتان (على هيئة بينزوات).
قرص واحد من ريزالت ٥ ملغ يحتوي على ٥ ملغ ريزاتريبتان ما يقارب ٧.٢٦٥ ملغ من ريزاتريبتان بينزوات.
قرص واحد من ريزالت ١٠ ملغ يحتوي على ١٠ ملغ ريزاتريبتان ما يقارب ١٤.٥٣ ملغ من ريزاتريبتان بينزوات.
قرص ذواب واحد من ريزالت RPD ١٠ ملغ يحتوي على ١٠ ملغ ريزاتريبتان ما يقارب - ١٤.٥٣ ملغ من ريزاتريبتان بينزوات.

المركبات الإضافية بريزالت أقراص هي:

microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, pregelatinised starch, magnesium stearate and Ferric oxide (red).

ريزالت ٥ ملغ أقراص و ريزالت ١٠ ملغ أقراص تحتوي على لكتوز مونوهيدرات, أنظر بند ٢.٧ "معلومات مهمة بخصوص جزء من مركبات ريزالت أقراص وريزالت RPD أقراص ذوابة".

المركبات الإضافية بريزالت RPD ١٠ ملغ أقراص ذوابة هي:

gelatin, mannitol, glycine, aspartame and peppermint Naefco P.

ريزالت RPD ١٠ ملغ أقراص ذوابة تحوي على أسبارتام, أنظر بند ٢.٧ "معلومات مهمة بخصوص جزء من مركبات ريزالت أقراص وريزالت RPD أقراص ذوابة".

٦.٢ كيف يبدو ريزالت ومحتوى العبوة

ريزالت ٥ ملغ أقراص: أقراص ٥ ملغ هي بلون وردي فاتح, بشكل كبسولة, مقعرة, مختومة ب- MSD في جانب واحد و-266 في الجانب الثاني.

ريزالت ١٠ ملغ أقراص: أقراص ١٠ ملغ هي بلون وردي فاتح, بشكل كبسولة, مقعرة, مختومة ب - 267 في جانب واحد وملساء في الجانب الثاني.

ريزالت RPD ١٠ ملغ أقراص ذوابة: أقراص ذوابة ١٠ ملغ هي بلون أبيض-أوف وايت, مستديرة صاحبة سطح أملس أو خشنة قليلاً مع مربع في جانب واحد وملساء في الجانب الآخر, بطعم نعنec. كل قرص ذواب مُعبأ لوحده بعبوة صينية الموجودة داخل ألومنيوم (كيس).

حجم العبوات: عبوات التي تحتوي على ٣ أو ٦ أقراص أو أقراص ذوابة. عبوات التي تحتوي على ١٢ قرص أو أقراص ذوابة لريزالت ١٠ ملغ أقراص و ريزالت RPD ١٠ ملغ أقراص ذوابة.
قد لا تكون جميع أحجام العبوات مُسوّقة.

صاحب التسجيل وعنوانه:

شركة ميرك شارپ ودوهم (إسرائيل - ١٩٩٦) م.ض, ص.ب. ٧١٢١ بيتح تكفا, ٤٩١٧٠.

المنتج: ميرك شارپ ودوهم كورپ, نيوجيرسي, الولايات المتحدة الأمريكية.

فُحصت هذه النشرة وتمّ المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في آذار ٢٠١٥.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

١١٢.٣٥.٢٩٥٠٧

ريزالت ٥ ملغ أقراص:

١١٢.٣٦.٢٩٥٠٨

ريزالت ١٠ ملغ أقراص:

١١٢.٣٨.٢٩٥١٠

ريزالت RPD ١٠ ملغ أقراص ذوابة:

للتبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك, الدواء مُخصص لكلا الجنسين.