

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**ריזלט RPD
10 מ"ג
טבליות מסיסות**

**ריזלט
10 מ"ג
טבליות**

**ריזלט
5 מ"ג
טבליות**

כל טבליה מסיסה מכילה:
Rizatriptan 10 mg
(as benzoate)
ריזאטריפטאן 10 מ"ג
(כבנזואט)

כל טבליה מכילה:
Rizatriptan 10 mg
(as benzoate)
ריזאטריפטאן 10 מ"ג
(כבנזואט)

כל טבליה מכילה:
Rizatriptan 5 mg
(as benzoate)
ריזאטריפטאן 5 מ"ג
(כבנזואט)

לרשימה של החומרים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6. ראה גם סעיף 2.7 "מידע חשוב בנוגע לחלק מהמרכיבים של ריזלט טבליות וריזלט RPD טבליות מסיסות".

אלא אם כן צוין אחרת, המידע בעלון לצרכן זה תקף לריזלט טבליות ולריזלט RPD טבליות מסיסות.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על ריזלט טבליות וריזלט RPD טבליות מסיסות. אם יש לך שאלות נוספות, שאל את הרופא או הרוקח שלך.
- תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה כי תסמיניהם דומים לשלך.
- התרופה מיועדת למבוגרים מעל לגיל 18.

1. מהי ריזלט ולמה היא משמשת?

ריזלט משמשת לטיפול חריף (אקוטי) בהתקפים של מיגרנה במבוגרים, עם או ללא אאורה.

אין להשתמש בריזלט למניעת התקפי מיגרנה.

ריזלט אינה מיועדת לטיפול במיגרנות המיפלגיות או בזילריות.
לא ידוע אם ריזלט בטוחה ויעילה לטיפול בכאבי ראש מקבציים.

קבוצה תרופוטית: ריזלט שייכת לקבוצה של תרופות הנקראת אגוניסטים סלקטיביים לקולטן 5-HT_{1B/1D} או טריפטנים.

2. לפני נטילת ריזלט

2.1 אל תיטול ריזלט אם:

- הינך רגיש (אלרגי) לריזאטריפטאן בנזואט או לכל אחד מהמרכיבים האחרים של ריזלט (לרשימת המרכיבים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6).
- יש לך או היו לך בעבר בעיות בלב.
- יש לך או היה לך בעבר שבץ או התקף איסכמי חולף (TIA).
- יש לך או היו לך בעבר בעיות בכלי הדם כולל מחלת מעי איסכמית.
- יש לך לחץ דם גבוה לא מאוזן.
- הינך נוטל בו זמנית תרופות נגד דיכאון מסוג מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAO) או נטלת מעכב MAO במהלך השבועיים האחרונים (ראה גם סעיף "2.3 נטילת תרופות אחרות").
- נטלת כל תרופה אחרת מאותה הקבוצה (טריפטנים) כגון סומאטריפטן, נארטריפטן, זולמיטריפטן, אלטריפטן, לטיפול במיגרנה שלך ב-24 השעות האחרונות (ראה גם סעיף "2.3 נטילת תרופות אחרות").
- נטלת תרופות המכילות ארגוטמין כגון ארגוטמין, דהידרוארגוטמין, או מתיסרג'יד ב-24 השעות האחרונות (ראה גם סעיף "2.3 נטילת תרופות אחרות").
- יש לך מיגרנות המפלגיות או בזילריות.

דבר עם הרופא שלך לפני שאתה נוטל תרופה זו אם יש לך את אחד המצבים הרשומים מעלה או אם אינך בטוח אם הינך נוטל אחת מתרופות אלו.

2.2 אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בריזלט

לפני הטיפול בריזלט, ספר לרופא שלך אם:

- יש לך או שהיו לך בעבר בעיות בלב (כגון התקף לב, אספקת דם מופחתת ללב או שינויים במקצב או בקצב פעימות הלב), לחץ דם גבוה, כאב בחזה או קוצר נשימה.
- יש לך גורם סיכון כלשהו למחלת לב או מחלת כלי דם כמו לחץ-דם גבוה, סוכרת, כולסטרול גבוה, השמנת יתר, עישון, היסטוריה משפחתית של בעיות בלב, את אישה לאחר הפסקת המחזור החודשי, אתה גבר מעל גיל 40.
- יש לך או היו לך בעבר אלרגיות כלשהן.
- יש לך פנילקטונוריה (PKU). **ריזלט RPD** טבליות מסיסות מכילות פנילאלינין (ראה גם סעיף 2.7 "מידע חשוב בנוגע לחלק מהמרכיבים של **ריזלט** טבליות ו**ריזלט RPD** טבליות מסיסות").
- את בהריון או מתכננת להיכנס להריון, או אם את מניקה, או מתכננת להניק (ראה סעיף 2.5 "הריון והנקה").
- אתה נוטל או מתכנן ליטול תרופות כלשהן, כולל תרופות ללא מרשם, ואלו שאתה נוטל בדרך-כלל למיגרנה (ראה סעיף 2.3 "נטילת תרופות אחרות"). שכן עלולה להתפתח החמרה בכאב הראש (MOH-medication overuse headache) בעקבות שימוש עודף בתרופות למיגרנה (כגון: ארגוטאמין, טריפטנים, אופיואידים, או שילוב של תרופות אלו יותר מ-10 ימים בחודש).
- אם אתה נוטל **ריזלט** באופן תכוף מדי, הדבר עלול לגרום לך לכאבי ראש כרוניים. במקרים כאלו, עליך לפנות לרופא שלך, מכיוון שיתכן ותצטרך להפסיק ליטול **ריזלט**.
- אתה סובל או סבלת בעבר מבעיות בכליה או בכבד.
- יש לך בעיות רפואיות אחרות.
- ספר לרופא על תסמיניך. הרופא שלך יחליט אם יש לך מיגרנה. יש ליטול **ריזלט** רק עבור התקף מיגרנה. אין להשתמש ב**ריזלט** לטיפול בכאבי ראש אשר עלולים להיגרם על ידי מצבים נירולוגיים אחרים, יותר חמורים.

2.3 נטילת תרופות אחרות

אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא המטפל או לרוקח.

תרופות שאין ליטול בו זמנית עם ריזלט (ראה סעיף 2.1 "אל ליטול ריזלט אם:")

- אין ליטול **ריזלט** עם תכשיר אחר כלשהו מאותה קבוצה (טריפטנים) במהלך 24 שעות, כגון סומאטריפטן, נאראטריפטן, זולמיטריפטן, או אלטריפטן.
- אין ליטול **ריזלט** במהלך 24 שעות מזמן נטילת תרופות המכילות ארגוטמין, כגון ארגוטמין, דהידרוארגוטמין או מתיסרג'יד לטיפול במיגרנה שלך.
- אין ליטול **ריזלט** כאשר אתה נוטל תרופות נגד דיכאון מסוג מעכבי מונואמיין אוקסידאז (MAO), כגון מוקלובמיד, איזוקרבוקסזיד, פנלזין או טרנילסיפרומין, ופרג'ילין או במידה ועברו פחות משבועיים מאז הפסקת נטילת מעכב ה-MAO.

במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות המכילות פרופרנולול (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש ב**ריזלט**?").
- תרופות המשמשות לטיפול בהפרעות במצב רוח, כולל תרופות מקבוצת מעכבי קליטה מחדש של סרוטונין (SSRIs) כגון פלוואוקסטין, פלווקסטין, פרוקסטין, אציטאלופראם אוקסלט וסטרלין או מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין נוראפינפרין (SNRIs), כגון ונלאפאקסין ודולוקסטין לד'קאון.

2.4 נטילת ריזלט עם מזון ושתייה

ייתכן וייקח ל**ריזלט** יותר זמן לעבוד במידה והיא תלקח אחרי האוכל. למרות שעדיף לקחת אותה על קיבה ריקה, אתה עדיין יכול לקחת אותה אם אכלת.

2.5 הריון והנקה

לא ידוע אם **ריזלט** מזיקה לעובר כאשר היא ניטלת על ידי אישה הרה.

ספרי לרופא לפני נטילת התרופה אם את בהריון או מתכננת הריון.

לא ידוע אם ריזלט עוברת לחלב האם. אם את מניקה או מתכננת להניק, התייעצי עם הרופא שלך. יש להמנע מהנקה ב-24 שעות שלאחר הטיפול.

יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופות.

2.6 נהיגה או שימוש במכונית

ריזלט עלולה לגרום לסחרחורת, נמנום, עייפות, חולשה או עילפון. אם אתה חש בתופעות אלו, אין לנהוג ברכב, להפעיל מכונית מסוכנות או לעסוק בכל פעילות אחרת המחייבת ערנות.

2.7 מידע חשוב בנוגע לחלק מהמרכיבים של ריזלט טבליות וריזלט RPD טבליות מסיסות

ריזלט 5 מ"ג וריזלט 10 מ"ג טבליות: טבלית ה-5 מ"ג מכילה 30.25 מ"ג לקטוז מונוהידראט. טבלית ה-10 מ"ג מכילה 60.50 מ"ג לקטוז מונוהידראט. יש ליידיע את הרופא אם אתה סובל מאי-סבילות ללקטוז.

ריזלט 10 מ"ג RPD טבליות מסיסות: מכילה מקור לפניאלנין, אשר עלול להיות מזיק לאנשים הסובלים מפנילקטונוריה. כל טבליה מסיסה של ריזלט RPD 10 מ"ג מכילה 3.75 מ"ג של אספרטיים (אשר מכיל 2.10 מ"ג פניאלנין).

3. כיצד תשתמש בריזלט?

תמיד יש ליטול ריזלט בדיוק לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון ומשך הטיפול יקבעו על ידי הרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

המינון המירבי הוא 30 מ"ג ריזלט בפרק זמן של 24 שעות. אין ליטול יותר מ-30 מ"ג ריזלט בפרק זמן של 24 שעות (למשל, אין ליטול יותר משלוש טבליות או טבליות מסיסות של 10 מ"ג ב-24 שעות).

אם אתה מטופל בפרופרנולול, עליך להשתמש במינון של ריזלט 5 מ"ג עד 3 מנות בפרק זמן של 24 שעות (15 מ"ג סה"כ).

תרופה זו אינה מיועדת למתן לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

רוב התקפי המיגרנה מוקלים על ידי ריזלט. אולם, במספר חולים, תסמיני המיגרנה יכולים לשוב בתוך פרק זמן של 24 שעות. במידה והמיגרנה שלך חוזרת, ניתן ליטול מנה נוספת של ריזלט. תמיד יש להמתין לפחות שעתיים בין מנה למנה. במידה ואינך מגיב לריזלט בזמן התקף, מומלץ שלא ליטול ריזלט לטיפול באותו התקף. אולם, עדיין ייתכן שתגיב לריזלט בהתקף הבא.

אופן השימוש:

ריזלט טבליות: יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם נוזל. אין מידע לגבי כתישה/חציה/לעיסה של הטבליות.

ריזלט טבליות מסיסות: השאר את טבלית ה-RPD המסיסה באריזתה עד לרגע שבו אתה מוכן ליטול אותה.

אין להוציא את אריזת המגשית משקית האלומיניום החיצונית אלא ממש לפני השימוש בתרופה.

– הוצא את אריזת המגשית משקית האלומיניום. אין לדחוף את הטבליה המסיסה של ריזלט RPD דרך אריזת המגשית.

– בידיים יבשות יש לקלף את אריזת המגשית על מנת לפתוח אותה ואת הטבליה המסיסה יש להניח על הלשון, שם היא תתמוסס במהירות ותיבלע עם הרוק שלך. אין צורך בנטילה עם נוזל. ניתן ליטול את הטבליה המסיסה ללא קשר לארוחות.

אם נטלת יותר ריזלט מכפי שהיית צריך:

אם אתה נוטל יותר ריזלט מכפי שהיית צריך, פנה לרופא שלך מיד או גש מיד לחדר מיון של בית החולים הקרוב ביותר.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לחדר מיון של בית חולים ולהביא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות כלשהן בנוגע לשימוש בתרופה, שאל את הרופא או הרוקח שלך.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בריזלט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות לרופא או לגשת לחדר המיון בבית החולים הקרוב ביותר מיד, אם הינך מפתח אחת מתופעות הלוואי החמורות של ריזלט כולל:

- **התקף לב.** תסמינים של התקף לב עלולים לכלול:
 - אי-נוחות במרכז החזה אשר נמשכת יותר ממספר דקות או אשר נעלמת וחוזרת
 - אי-נוחות בחזה אשר מרגישה כמו לחץ שאינו נוח, סחיטה, תחושת מלאות או כאב
 - כאב או אי-נוחות בזרועות, בגב, בצוואר, בלסת או בבטן
 - קוצר נשימה עם או ללא אי-נוחות בחזה
 - זיעה קרה
 - בחילה או הקאה
 - תחושת סחרחורת
- **שבץ.** תסמינים של שבץ עלולים לכלול את התסמינים הפתאומיים הבאים:
 - חוסר תחושה או חולשה בפנים, בזרועות או ברגליים, במיוחד בצד אחד של הגוף
 - בלבול, בעיות בדיבור או בהבנה
 - בעיות בראיה בעין אחת או בשתיים
 - בעיות בהליכה, סחרחורת, חוסר איזון או קואורדינציה
 - כאב ראש חמור ללא סיבה ידועה
- **בעיות בכלי דם.** תסמינים של בעיות בכלי דם עלולים לכלול:
 - כאב בטן
 - שלשול דמי
 - בעיות בראיה
 - קרירות וחוסר תחושה בידיים וברגליים
- **תסמונת סרוטונין.** מצב הנקרא תסמונת סרוטונין עלול להתרחש כאשר תרופות מסוג הטריפטנים כגון ריזלט ניטלות עם תרופות מסוימות אחרות. התסמינים של תסמונת סרוטונין עלולים לכלול:
 - חוסר שקט
 - הזיות
 - תרדמת
 - קצב לב מהיר
 - שינויים מהירים בלחץ הדם
 - עליה בחום הגוף
 - עוויתות שרירים
 - איבוד קואורדינציה
 - בחילה, הקאה או שלשול

• **לחץ דם גבוה.**

- **תגובות אלרגיות** כולל התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון אשר עלולה לגרום לקושי בנשימה ו/או בבליעה, צפצופים, חרלת, פריחה וקילוף חמור של העור.
- בנוסף, ספר לרופא שלך אם הנך חווה תסמינים אשר מעידים על תגובה אלרגית (כגון פריחה או גרד) לאחר נטילת ריזלט.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות הלוואי השכיחות ביותר של ריזלט כוללות:

- תחושת נמנום או עייפות
- כאב או תחושת לחץ בחזה או בגרון
- סחרחורת

תופעות לוואי אחרות (שכיחות: 1 עד 10 ל-100 מטופלים): שאינן שכיחות: מ-1 עד 10 ל-1000 מטופלים; נדירות: 1 עד 10 ל-10,000 מטופלים) ותופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה:
הפרעות במערכת החיסון: נדיר: תגובה אלרגית (רגישות יתר), תגובה אלרגית פתאומית מסכנת-חיים (אנפילקסיס).

הפרעות במערכת העיכול: שכיחות: בחילה, הקאה, שלשול, יובש בפה, קשיי עיכול (דיספפסיה); שאינן שכיחות: צמא.

הפרעות במערכת הנשימה, קנה הנשימה וחלל החזה: שכיחות: אי-נוחות/כאב בגרון; שאינן שכיחות: קושי בנשימה (קוצר נשימה); נדירות: צפצופים.

הפרעות במערכת השלד והשרירים ורקמות חיבור: שכיחות: תחושה של כבדות בחלקים מהגוף, קשיין, כאב צוואר; שאינן שכיחות: תחושת מתיחות בחלקים מסויימים של הגוף, חולשת שרירים, כאב שרירים וכאב בפנים.

הפרעות בעור וברקמה התת-עורית: שכיחות: הסמקה (אודם בפנים הנמשך זמן קצר); שאינן שכיחות: הזעה, גרד, פריחה המאופיינת בחבורות מוגבהות (סרפדת), פריחה, אנגיואדמה (התנפחות הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון העלולה לגרום לקשיי נשימה ו/או בליעה).

הפרעות לבביות: שכיחות: קצב לב מהיר או שאינו סדיר (פלפיטציה); שאינן שכיחות: קצב לב מאוד מהיר (טכיקרדיה), שינויים במקצב או בקצב פעימות הלב (אריתמיה), ממצאים חריגים בא.ק.ג. (בדיקה אשר רושמת את הפעילות החשמלית של הלב שלך); נדירות: שבץ (בדרך כלל מתרחש במטופלים בעלי גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם (יתר לחץ דם, סוכרת, עישון, שימוש בתחליפי ניקוטין, היסטוריה משפחתית של מחלת לב או שבץ, גברים מעל גיל 40, נשים לאחר הפסקת המחזור החודשי, בעייה מסויימת באופן שבו לבבך פועם (חסם צרור - bundle branch block)), קצב לב איטי (ברדיקרדיה).
הפרעות בכלי דם: שאינן שכיחות: גלי חום, יתר לחץ דם; שכיחותן אינה ידועה: איסכמיה בכלי הדם הפריפריים.

הפרעות במערכת העצבים: שכיחות: סחרחורת, ישנוניות, תחושת נימול בעור (פאראסטזיה), כאב ראש, ירידה ברגישות של העור (היפואסתזיה), ירידה בחדות מנטלית; שאינן שכיחות: התעלפות, רעד, טעם רע בפה, חוסר יציבות בהליכה (אטקסיה), ורטיגו.

הפרעות פסיכיאטריות: שכיחות: נדודי שינה; שאינן שכיחות: בלבול/חוסר התמצאות.

הפרעות בעיניים: שאינן שכיחות: ראייה מטושטשת.

הפרעות כלליות ומצבים הקשורים לאזור המתן: שכיחות: כאב בבטן או בחזה, עייפות.

תופעות לוואי שדווחו אשר תדירותן אינה ידועה:

- התקף לב, התכווצות של כלי הדם של הלב (אלה בדרך כלל מתרחשים במטופלים בעלי גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם (יתר לחץ דם, סוכרת, עישון, שימוש בתחליפי ניקוטין, היסטוריה משפחתית של מחלת לב או שבץ, גברים מעל גיל 40, נשים לאחר הפסקת המחזור החודשי, בעייה מסויימת באופן שבו לבבך פועם (חסם צרור - bundle branch block)).
- קילוף חמור של העור, עם או ללא חום (נמק אפידרמלי רעיל - Toxic epidermal necrolysis).
- פרכוסים (עוויתות/התקפים אפילפטיים).
- תסמונת הנקראת "סינדרום סרטונין" העלולה לגרום לתופעות לוואי כגון, תרדמת, לחץ דם לא יציב, טמפרטורת גוף גבוהה מאוד, חוסר קואורדנציה של השרירים, חוסר שקט והזיות.
- התכווצות כלי דם בגפיים, כולל קרירות וחוסר תחושה בידיים או ברגליים.
- התכווצות כלי דם במעי הגס העלולה לגרום לכאב בטן.
- הפרעות ראייה כגון הבהוב, ירידה בראיה, ראייה כפולה, אובדן ראייה ובמקרים מסויימים אפילו ליקויים בלתי הפיכים בראיה (אם כי אלה עלולים להיות בגלל התקף המיגרנה עצמו).

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. כיצד לאחסן ריזלט?

- **מנע הרעלה!** תרופה זו, כמו כל תרופה אחרת, יש לשמור במקום בטוח מחוץ להישג ידם וראייתם של ילדים ו/או תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
- אין להשתמש בריזלט לאחר תאריך התפוגה (exp. date) אשר מצויין על האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש המצויין.

- **תנאי אחסון:**
ריזלט 5 מ"ג טבליות, ריזלט 10 מ"ג טבליות וריזלט RPD 10 מ"ג טבליות מסיסות: יש לאחסן מתחת ל- 30°C.
- אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה הביתית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

6.1 מה ריזלט מכילה?

החומר הפעיל בריזלט הוא ריזאטריפטאן (כבנזואט).
טבליה אחת של ריזלט 5 מ"ג מכילה 5 מ"ג ריזאטריפטאן כ- 7.265 מ"ג של ריזאטריפטאן בנזואט.
טבליה אחת של ריזלט 10 מ"ג מכילה 10 מ"ג ריזאטריפטאן כ- 14.53 מ"ג של ריזאטריפטאן בנזואט.
טבליה מסיסה אחת של ריזלט RPD 10 מ"ג מכילה 10 מ"ג ריזאטריפטאן כ- 14.53 מ"ג של ריזאטריפטאן בנזואט.

המרכיבים הנוספים בריזלט טבליות הם:

microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, pregelatinised starch, magnesium stearate and Ferric oxide (red).

ריזלט 5 מ"ג טבליות וריזלט 10 מ"ג טבליות מכילות לקטוז מונוהידראט, ראה סעיף 2.7 "מידע חשוב בנוגע לחלק מהמרכיבים של ריזלט טבליות וריזלט RPD טבליות מסיסות".

המרכיבים הנוספים בריזלט RPD 10 מ"ג טבליות מסיסות הם:

gelatin, mannitol, glycine, aspartame and peppermint Naefco P.

ריזלט RPD 10 מ"ג טבליות מסיסות מכילות אספרטיים, ראה סעיף 2.7 "מידע חשוב בנוגע לחלק מהמרכיבים של ריזלט טבליות וריזלט RPD טבליות מסיסות".

6.2 כיצד נראית ריזלט ותכולת האריזה

- ריזלט 5 מ"ג טבליות: טבליות 5 מ"ג הינן בצבע ורוד בהיר, בצורת כמוסה, קמורות, מקודדות ב- MSD בצד אחד ו-266 בצד השני.
- ריזלט 10 מ"ג טבליות: טבליות 10 מ"ג הינן בצבע ורוד בהיר, בצורת כמוסה, קמורות, מקודדות ב- 267 בצד אחד וחלקות בצד השני.
- ריזלט RPD 10 מ"ג טבליות מסיסות: טבליות מסיסות 10 מ"ג הינן בצבע לבן-אוף ווייט, עגולות בעלות פני שטח חלקים או מעט מחוספסים עם ריבוע בצד אחד וחלקות בצד האחר, בטעם מנטה. כל טבליה מסיסה ארוזה בנפרד באריזת מגשית אשר נמצאת בתוך שקית אלומיניום (שקיק).

גודל האריזות: אריזות המכילות 3 או 6 טבליות או טבליות מסיסות. אריזות המכילות 12 טבליות או טבליות מסיסות עבור ריזלט 10 מ"ג טבליות וריזלט RPD 10 מ"ג טבליות מסיסות. ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

בעל הרישום וכתובתו:

חברת מרק שארפ ודוהם (ישראל - 1996) בע"מ, ת.ד. 7121 פתח תקוה, 49170.

יצרן: מרק שארפ ודוהם קורפ, ניו ג'רסי, ארה"ב.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות במרץ 2015.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

112.35.29507	ריזלט 5 מ"ג טבליות:
112.36.29508	ריזלט 10 מ"ג טבליות:
112.38.29510	ריזלט RPD 10 מ"ג טבליות מסיסות:

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.