

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة
الصيادة (مستحضرات - ١٩٨٦)

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب
تامس EX بدون

سكر

أقراص للمضغ كل قرص يحتوى على كاربيونات
الكالسيوم ٧٥٠ ملغم (ما يقرب
من الكالسيوم في القرص)

Calcium Carbonate 750 mg
(elemental calcium 300 mg)
كل قرص يعدل ١٥ ملي مول من مكافىء
الحديد.

قائمة المركبات الإضافية مفصلة في
الفقرة ٦. إقرأ النشرة بتمعن حتى
 نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوى
 هذه النشرة على معلومات موجزة عن
 الدواء. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية،
 راجع الطبيب أو الصيدلي.

(١) لأي غرض مخصص الدواء؟
لتحفيض الحرقان والحموضة في المعدة.
الفصيلة العلاجية:
من مضادات الحموضة

(٢) قبل إستعمال الدواء:

لا يجوز إستعمال الدواء:
إذا كنت حساساً (اليرجي)
لكاربيونات الكالسيوم أو لكل واحد
من المركبات الإضافية التي يحتويها
الدواء (مفصلة في الفقرة ٦)
لدى معالجين لديهم فائض من

الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على
ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى
اليوم الأخير من نفس الشهر.
يجب تخزين دون ٢٥ درجة مئوية.

(٦) معلومات إضافية
• يحتوى الدواء بالإضافة لمادة الفعالة
أيضاً.

Sorbitol, calcium stearate,
gum acacia, natural and
artificial flavors, adipic
acid, yellow 6 (E110) lake,
aspartame.

• كف يبدو الدواء وما هو محتوى
العلبة - قنينة بلاستيكية تحتوى
على ٨٠ قرصاً للمضغ. القنينة
مغلفة بسادة داخلية وبغطاء.

• صاحب الامتياز: جلاكسوسينتكالين
(إسرائيل) م.ض. شارع بازيل ٢٥.
بيت تكفا.

• المنتج: جلاكسوسينتكالين
كونسيومر هيلث كير، L.P., سانت
لويس، الولايات المتحدة.

• أقرت وزارة الصحة صحة هذه
النشرة ومحظواها فحص ورخص
في تاريخ: تشرين الثاني ٢٠١٤
رقم سجل الدواء في سجل الأدوية
الحكومي في وزارة الصحة:
٣٢٤-٤٩٣٢٧٨

• من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت
صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر.
على الرغم من ذلك، فإن الدواء
مخصص لكلا الجنسين.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا
بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً
للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى
وأخضر عبوة الدواء معلماً.

لا تتناول الأدوية في العتمة!
يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من
الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها
دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم
الامر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال
الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

(٤) الأعراض الجانبية

كم بالكم دواء، إن إستعمال تامس قد يسبب
أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين.
لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية.
من الجائز لا تعاني أي منها.
الأعراض الجانبية تشمل: إمساك، غازات،
غثيان، ترجحات، إذا ظهر عرض جانبي،
إذا اتفاقت إحدى الأعراض الجانبية، أو
عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر
في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب
أو الصيدلي.

(٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء
وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن
مجال رؤية وتناول أيدي الأطفال
و/أو الرضع، وذلك لتفادي أصادبهم
بالتسمم.
لاتسبّب التقطيع بدون تعليمات صريحة
من الطبيب.
لا يجوز إستعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ

معلومات هامة عن بعض مركبات
الدواء sunset yellow
• يحتوى الدواء على sunset yellow (E110)
لردوه فعل تحسسيّة.

• يحتوى الدواء على سوربيتول، إذا قيل
لك من قبل طبيبك بأنك تعاني من عدم
تحمل لسكريات معينة، راجع طبيبك
قبل تناول هذا الدواء.

• يحتوى الدواء على أسيبرتام، مصدر
لفينيل الأنين، الذي من الممكن أن يكون
مضراً لأناس مع بيلة الفينيل كثيرون.
(٣) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من
الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية الإعتيادية لدى الكبار
والأطفال فوق عمر ١٢ سنة هي:
أمضغ ٤-٦ أقراص عند ظهور الأعراض،
أو يحبس توصية الطبيب. لا يجوز تناول
أكثر من ١٠ أقراص خلال ٢٤ ساعة.
إذا كنت في فترة الحمل، فلا يجوز تناول
أكثر من ٦ أقراص خلال ٢٤ ساعة.

لا يجوز إستعمال الجرعة الدوائية
العظمى لفترات تتجاوز الأسابيع، إلا
بتوصية طبيب.

لا يجوز إنتقال ٣-٤ ساعات بين تناول
الاعراض لأكثر من أسبوعين، إلا بتوصية
من الطبيب.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية
الموصى بها
الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر
١٢ سنة.

الكالسيوم في الدم (فروت كالسيوم
الدم) أو فائض من الكالسيوم في
البول (فروت كالسيوم في البول)
لدى معالجين متبعين لحصة فقيرة
الفوسفات

• لدى معالجين ذوي مشاكل في
نشاط الغدد نظيرة الدرقية
لدى معالجين لديهم مشاكل في

الكل (مثل حصى في الكلى)
لدى معالجين مصابون بمتلازمة
زولينغر-اليسون

• لدى معالجين يتلقون ديجوكسين
لأمراض القلب.

لا يجوز إستعمال الدواء بدون
استشارة الطبيب قبل بدء العلاج:
لدى أطفال دون عمر ١٢ سنة.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً،
أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون
وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدى
الطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالخصوص
إذا كنت تتناول:

مدرسات بولية من نوع تيازيدات،
بيسفوفونات لعلاج تخلخل المطام،
تراسيكيلينات وسبيروفلوكساسين
(مضادات حيوية).

يوصى الإنقطاع ٣-٤ ساعات بين تناول
هذا الدواء وبين تناول أدوية أخرى عن
طريق الفم.

الحمل والإرضاع
يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي
قبل إستعمال الدواء أنطري الفرة ٢
الجرعة الدوائية الإعتيادية.