



עלון לצריך לפי תקנות
הרוקחים (תקשיים)
התשמ"ו – 1986
התרופה משוקת
לא מושם רפואי

סאמס^{MD} EX לילא

סיכום

- טיפולו של גוףך בטעות או בטעות מילוי תרופה.
- התרופה מילאה מילויים (היפרקלצמייה) או עודף סידן בשתן.
- במטופלים בעלי ערך אדרטן (היפרקלצאיוריה).
- במטופלים הנמצאים על דיאטה דלול פופאטס.
- במטופלים עם בעיות בעפליות של בלוטות יותרת התריס.
- במטופלים עם בעיות בכליות (כגון אבניהם בכליות).
- במטופלים בעלי תסמונת זוליגר-אליסון.
- במטופלים הממקלים דיגוקסין למחלות לב.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:
אם אתה רגיש (אלרגי) לקלציטום קרבונט או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מילא התרופה (ופורט בערך 6).

של ש להוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה. ראי סעיף 3 לMINON המקבלי.

בדולול עצמו, טטראצ'יקלינים וציפורולוקסיצין (אנטיביוטיקות) מומלץ להמתן 2-3 שעות בין נטלת תרופה זו לבן ונטלת תרופות אחרות דרך הפה.

הרין והנקה

שלן לא השתמש בתרופה באם הסימפטומים נמשכים מעל שבועיים, אלא בהמלצת הרופא.

3. כיצד תשתחם בתרופה?

לארם לתגובה לרגאות.

4. תופעות לוואי

לארם לתגובה לחושן בדוח התווית והמנה בכל פעע ששאתה לרוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה דזוק להם.

5. איך לאחסן את התרופה?

לארם לתגובה לחושן בדוח אם אין בסות.

6. מידע נוסף

לארם לתגובה לחושן בדוח אם אין בסות.

- acid, yellow 6 (E110) lake, aspartame.
- כיצד נראות התרופה ומה תוכן הארץזה – בקבוק פלסטיק המכיל 80 טבליות לילא. הבקבוק סגור באמצעות פניימי ובפקק.
- בעל הרישום: גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בל' 25, פתח תקווה.
- יצרן: גלקסוסמיתקליין קוונטירם הלתקקר, L.P., סינט לאויס, ארה"ב.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: נובמבר 2014.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי בישראל: 134-49-31378.
- שם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מוגדרת לבני שני המינים.

הלואו. יתכן ולא תסבול מאך אחת מהן, תופעות הלואו כוללות: עצירות, גזים, בחילות, גירוזים. אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואו, מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא או הרוקח.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלתו התרופה זו וככל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ לשדהראיים והשיג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כר תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה ממופרשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התגופה (date of exp.) המופיע על גבי הארייה. תאריך התגופה מתיחס ליום האחרון של אותו חדש.
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.

6. מידע נוסף

- ኖסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם - Sorbitol, calcium stearate, gum acacia, natural and artificial flavors, adipic acid, yellow 6 (E110) lake, aspartame.

אין לקחת יותר מ- 10 טבליות ב- 24 שעות. אם את בהריון, אין לקחת יותר מ- 6 טבליות ב- 24 שעות. אין להשתמש במנה המקסימלית במסך יותר משבעים, אלא בהמלצת בהמלצה ופיקוח של הרופא שלן.

6. מידע נוסף

התרופה מכילה מיודת לילדים מתחילה לגיל 12 שנים. אם لكחת מנת יתר או אם בטיעות בעליל יlid מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

7. תיבות וarnings

כמו בכל תרופה, השימוש בטאים עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא ורשימת תופעות