

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة
الصيدلة (مستحضرات) - ١٩٨٦
يحتوي الدواء بدون وصفة طبيب

تاميس EX سمو تيس بطعم التفون

أعراض للمضمة

كل قرص يحتوي على كاربونات
الكالسيوم ٧٥٠ ملг (مما يوفر
ملغ من الكالسيوم في الفرط)

Calcium Carbonate 750 mg
(elemental calcium 300 mg)
كل قرص يعدل ١٥ ملي مول من مكافيء
الحمض.

قائمة المركبات الإضافية مفصلة في
الفقرة ٦.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل
استعمال الدواء، تحتوي هذه النشرة
على معلومات موجزة عن الدواء، إذا
توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع
الطبيب أو الصيدلي.

(١) لأي غرض مخصص الدواء؟
لتخفيف الحرقان والحموضة في المعدة:
الفصيلة العلاجية:
من مضادات الحموضة

(٢) قبل استعمال الدواء:
لا يجوز استعمال الدواء:
إذا كنت حساساً (اليرجي)

لكاربونات الكالسيوم أو لكل واحد
من المركبات الإضافية التي يحتويها
الدواء (مفصلة في الفقرة ٦)

٦) معلومات إضافية
• يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة
أيضاً.
Dextrose monohydrate,
sorbitol, sucrose, corn
starch, microcrystalline
cellulose, magnesium
stearate, guar gum,
maltodextrin, peppermint
flavor.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى
العلبة - قنية بلاستيكية تحتوي على
٦٠ أو ٧٢ قرصاً للمضمة. القنية مغلقة
بسادة داخلية وبغطاء.
من الجائز لا تأسو ف كافة أحجام العلب.
صاحب الإمتياز: چلاكسوس ميتكلاين
(ישראל) מ.ض، شارع بازيل، ٢٥
بيت تكفا.
المنتج: چلاكسوس ميتكلاين
كونسيوم هيلث كير، L.P.، سانت
لويس، الولايات المتحدة.

اقررت وزارة الصحة صيغة هذه
النشرة ومحتهاها فحص ورخص
في تاريخ: تشرين الثاني ٢٠١٤.
رقم سجل الدواء في سجل الأدوية
الحكومي في وزارة الصحة:
١٣٤-٣١٧٥
من أجل سهولة وتوسيع القراءة، تمت
صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة.
على الرغم من ذلك، فإن الدواء
مخصص لكلا الجنسين.

يجب التخزين دون ٢٥ درجة مئوية.

واحضر عبوة الدواء معك. لا تتناول
الأدوية في العتمة! يجب تشخيص
طابع الدواء والتاكيد من الجرعة الدوائية
في كل مرة تتناول فيها دواء، اعرض
النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول استعمال
الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

(٤) الأعراض الجانبية
كمابكلايد، إن استعمال تامس قد يسبب
أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين.
لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية.
من الجائز الا تعاني أي منها.
الأعراض الجانبية تشمل: إمساك، غازات،
غثيان، تشنجات، إذا ظهر عرض جانبي،
إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو
عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر
في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب
أو الصيدلي.

(٥) كيفية تخزين الدواء؟
• تحفظ التسمم! يجب حفظ هذا
الدواء وكل دواء في مكان مغلق
بعيدة عن مجال رؤية ومتناول أيدي
الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادى
إصابةهم بالتسوس. لا تسبب التسمم
بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء
تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي
يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ
الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس
الشهر.
يجب التخزين دون ٢٥ درجة مئوية.

الحمل والإرضاع
يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي
قبل استعمال الدواء، أنظر الفقرة ٣
الجرعة الدوائية الإعتيادية.

معلومات هامة عن بعض مركبات
الدواء
يحتوي الدواء على سكريات. إذا قيل لك
من قبل طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل
لسكريات معينة، راجع طبيبك قبل تناول
هذا الدواء.

(٣) كيفية إستعمال الدواء؟
عليك الاستشارة من الطبيب أو من
الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية الإعتيادية لدى الكبار
والأطفال فوق عمر ١٢ سنة هي:
أمضغ ٤-٥ أقراص عند ظهور الأعراض،
أو بحسب توصية الطبيب.
لا يجوز تناول أكثر من ١٠ أقراص خلال
٢٤ ساعة.

إذا كنت في فترة الحمل، فلا يجوز تناول
أكثر من ٦ أقراص خلال ٢٤ ساعة.
لا يجوز استعمال الجرعة الدوائية
العظمى لفترة تتجاوز الأسبوعين، إلا
بتوصية وبمراقبة من طبيبك.

لا يجوز استعمال الدواء إذا إستمرت
الأعراض لأكثر من أسبوعين، إلا بتوصية
من الطبيب. لا يجوز تجاوز الجرعة
الدوائية الموصى بها في الدواء غير
مخصص للأطفال دون عمر ١٢ سنة.
إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا
بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً
للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى

• لدى معالجين لديهم فائض من
الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم
(الدم) أو فائض من الكالسيوم في
البول (فرط كالسيوم البول).
• لدى معالجين متبعين لحمية فقيرة
الفسفات.

• لدى معالجين ذوي مشاكل في
نشاط الغدد ظاهرة الدرقية.
• لدى معالجين لديهم مشاكل في
الكل (مثل حصى في الكل)
• لدى معالجين مصابون بمترلازمه
زوليغين ليسون
• لدى معالجين يتلقون ديبوكسين
لأمراض القلب.

لا يجوز استعمال الدواء بدون
إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج:
• لدى أطفال دون عمر ١٢ سنة
• إذا كنت تعاني من السكري (تحتوي
الدواء على السكر).

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً،
أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون
وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام
للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالآخر
إذا كنت تتناول:

مدرسات بولية من نوع تيازيدات،
بيسفوفونات لعلاج تخلخل العظام،
تترايسيلكليات وسيپروفلوكساسين
(مضادات حيوية).

يوصى الإننتار ٣-٢ ساعات بين تناول
هذا الدواء وبين تناول أدوية أخرى عن
طريق الفم.