

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

## תינוק אף טיפות

הרכב: נתרן כלורי 0.9% Sodium Chloride

לרישמת חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6- מידע נוסף.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה-בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

### 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלה בגודש באף במיוחד אצל תינוקות.

### 2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה או ילדך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול באף קיד, ספר לרופא אם:

- הינך או ילדך סובל או סבל בעבר מליקוי בתפקוד הלב ו/או כלי דם, יתר לחץ דם, הכבד.
- הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. אין להשתמש בתרופה זו כשחל שינוי בצבע התמיסה או שהיא הופכת לעכורה

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התכשיר מכיל בנזלקוניום כלוריד אשר עלול לגרום לגירוי ברירית האף

הריון והנקה

אפשר להשתמש בתרופה בהריון או אם הינך מניקה

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

#### **מינון מקובל בדרך כלל הוא:**

1-2 טיפות בכל נחיר 1-4 פעמים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

**אם לא חל שיפור במצב תוך 3 ימים יש לפנות לרופא.**

**אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.**

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת; אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

#### **שים לב:**

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש באף.

#### **אין להשתמש בעניים.**

יש להקפיד על מדידת המנה במזלף.

#### **אופן השימוש:**

1. כיצד להשתמש בטיפות: קנח את האף בעדינות. הטה את ראשך או של הילד לאחור תוך כדי עמידה או ישיבה, או שכב והטה ראשך או של הילד הצידה. טפטף את הטיפות לכל אחד מהנחיריים, תוך כדי הטיית הראש אחורה למשך מספר דקות, זאת בכדי לאפשר לתרופה להתפזר בחלל האף.

2. שטוף את הטפטפת בעזרת מים חמים ויבש בעזרת ממחטת נייר נקיה. יש לסגור את הבקבוק היטב לאחר השימוש. בכדי להימנע מהפצת הזיהום, אין להשתמש באותו מיכל של תרופה ליותר מאדם אחד.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון: גירוי או צריבה זמנית באף.

#### **תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:**

יתר לחץ דם, פריחה או דלקת מקומית (שלא היו קיימות לפני השימוש בתכשיר – נדיר): הפסק את הטיפול ופנה לרופא.

#### **תופעות לוואי בילדים ותינוקות:**

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי הנצפית בילד.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון בקישור הבא:

<http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic%40moh.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אחסנה: יש לאחסן מתחת ל-25°C  
לאחר פתיחה ראשונה, יש להשתמש תוך 28 ימים. יש לכתוב על אריזה תאריך פתיחה.

## 6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Benzalkonium Chloride, Purified Water.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

**נוזל שקוף ארוז בקבוק 10 מ"ל**

בעל הרישום והיצרן:

רקח תעשיית תרופות בע"מ, רח' המלאכה 30, חולון

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 05-2015

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 117 68 29702 00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר/ נקבה. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.