

رينوكليز - بخاخ معايير للأنف

المادة الفعالة وتركيزها: أوكسيميتازولين هيدروكلوريد (Oxymetazoline hydrochloride) بتركيز ٠.٠٥٪

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة ٦.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء غير مخصص عادة للرضع والأطفال دون عمر ٦ سنين.

عليك إستعمال الدواء بالشكل الصحيح. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقم الأعراض.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

للتخفيف المؤقت من إحتقان الأنف، نتيجة زكام، التهاب الجيوب، حمى العلف أو حساسيات أخرى للطرق التنفسية العليا.

الفصيلة العلاجية: من مقلدات الأعصاب الودية.

٢) قبل إستعمال الدواء

❗ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة ٦).
- لا يجوز إستعمال هذا الدواء بصورة متزامنة مع أدوية من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOI - لعلاج الإكتئاب) أو خلال ١٤ يوماً بعد إنتهاء العلاج بها.
- إجتزت إستئصال للغدة النخامية (pituitary gland).
- كنت تعاني من التهاب جلد أو مخاطية الأنف.

قبل العلاج بالدواء إستشر الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي:

- من خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية.
- من فرط نشاط الغدة الدرقية.
- من مرض في العينين (مثل الجلوكوما).
- من تضخم غدة البروستات.
- من السكري.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- لا يجوز الإستعمال في أوقات متقاربة دون إستشارة الطبيب.
- إستعمال متكرر ومتواصل قد يسبب إحتقان متجدد وضرر لمخاطية الأنف.
- يحتوي المستحضر بنزالكونيوم كلوريد الذي قد يسبب تهيج مخاطية الأنف.
- هناك قابلية لإمتصاص هذا الدواء جهازياً بالأخص لدى الأطفال ونتيجة لذلك تزداد إمكانية ظهور أعراض جانبية في سياق العلاج.
- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل إستعمال الدواء.

⚠ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية مضادة للإكتئاب من نوع ثلاثية الحلقة أو مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOI) أو خلال ١٤ يوماً بعد إنتهاء العلاج بها.
- أدوية لتخفيض ضغط الدم (مثل ميتيل دوبا).
- أدوية پاركينسون (مثل بروموكريبتين).

⚠ الحمل والإرضاع

يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج بالدواء، إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واقفاً.

لا يجوز إستعمال المستحضر لأكثر من ٣ أيام متواصلة إلا إذا وصف من قبل الطبيب.

عليك مراجعة الطبيب فيما إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو لم تتحسن بعد ٣ أيام متواصلة.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو ٢-٣ بخات في كل منخر مرتين في اليوم، في الصباح وفي المساء.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به. يجب الخض جيداً قبل الإستعمال.

طريقة الإستعمال:

• إنزع غطاء البلاستيك وبخ بختين في الهواء قبل الإستعمال الأول.

• نظف الأنف بلطف. برأس منتصب، بخ الدواء داخل كل واحد من المنخرين (في غضون ذلك يجب سد المنخر الثاني بالأصبع) على الشكل التالي: إستنشق عدة نشقات قصيرة من خلال كبسات سريعة وقوية على القنينة وفق المقدار الدوائي. إنتظر ٣-٥ دقائق. نظف الأنف بلطف ثانية وكرر العملية حسب اللزوم.

• أشطف فوهة البخاخ بماء دافئ، ولكن إحرص على عدم دخول الماء داخل القنينة. جففها بواسطة منديل ورقي نظيف وأغلق جيداً.

• لتجنب تقشي التلوث، لا يجوز إستعمال نفس قنينة الدواء لأكثر من شخص واحد.

• عليك إستعمال البخاخ بصورة صحيحة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

لا يجوز البلع. للإستعمال الخارجي فقط.

• إذا إستعملت مقدارا دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

• لا تتناول أدوية في العتمة! يجب فحص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

• إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بخصوص إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال رينوكليز قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يمكن أن تظهر أثناء إستعمال الدواء أعراض جانبية مثل حرقة، جفاف أو وخز في الأنف أو عطاس.

تختفي هذه الأعراض عادة خلال وقت قصير بعد فترة التعود على المستحضر، لكن إذا إستمرت أو كانت مزعجة يجب إستشارة الطبيب.

أعراض جانبية تقتضي إهتماماً خاصاً:

تظهر في أحيان نادرة - يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب:

- ظهور متجدد للإحتقان.
- علامات لإمتصاص الدواء لداخل الجسم: صداع، عصبية، إرتجاف، ضربات قلب سريعة أو قوية، إضطرابات في النوم.

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وعن متناول أيديهم وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقويؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون ٢٥ درجة مئوية.

٦) معلومات إضافية

• يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً: Benzalkonium chloride, benzyl alcohol, dibasic sodium phosphate, edetate disodium, carboxymethylcellulose sodium, microcrystalline cellulose, monobasic sodium phosphate, polyethylene glycol, povidone, purified water.

• محتوى الصوديوم في المقدار الدوائي: ٠,١٢٤ ملغ. كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: قنينة بلاستيكية ذات ٣٠ ملل مزودة ببخاخ متعدد الإستعمال. يمكن إستعمال الدواء حتى تاريخ إنقضاء الصلاحية حتى بعد فتحه أيضاً.

• صاحب الإمتياز: وكالات بيريجو إسرائيل م.ض.، شارع ليحي ٢٩، بني - براق، ٥١٢٠٠

• إسم المنتج: شركة بيريجو، أليجان، ميشيغان، الولايات المتحدة.

• أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في تاريخ: تموز ٢٠١٣

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٠٠٠-٢١١٧٢-٨٨-١٣٧

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.