

רינוקליר - תרסיס מדוד לאף

החומר הפעיל וריכוזו: אוקסימטזולין הידרוכלוריד (Oxymetazoline hydrochloride) בריכוז 0.05%.

חומרים בלתי פעילים: ראה בסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות ולילדים מתחת לגיל 6 שנים.

עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם התסמינים (סימפטומים) מחמירים.

1. למה מיועדת התרופה?

להקלה זמנית של גודש באף, כתוצאה מהצטננות, סינוסיטיס, קדחת השחת או אלרגיות אחרות של דרכי הנשימה העליונות. קבוצה תרפויטית: סימפטומטיים.

2. לפני שימוש בתרופה

✘ אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- אין להשתמש בתרופה זו בו זמנית עם נטילת תרופות מקבוצת מעכבי מונואמינאווקסייד (MAOI) - לטיפול בדיכאון) או במשך 14 יום לאחר סיום הטיפול בהן.
- עברת כריתתה של ההיפופיזה (pituitary gland).
- אתה סובל מעור או רירית מודלקים של האף.

לפני הטיפול בתרופה היוועץ ברופא אם אתה סובל או סבלת בעבר:

- מליקוי בתפקוד הלב ו/או כלי הדם.
- מפעילות יתר של בלוטת התריס (תירואיד).
- ממחלת עיניים (כמו גלאוקומה).
- מהגדלת בלוטת הערמונית.
- מוסוכרת.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין להשתמש לעיתים קרובות מבלי להיוועץ ברופא.
- שימוש תכוף וממושך עלול לגרום לגודש חוזר ולנזק לרירית האף.
- התכשיר מכיל בנזלקוניום כלוריד אשר עלול לגרום לגירוי ברירית האף.
- בילדים במיוחד יש נטייה לספיגה סיסטמית של תרופה זו וכתוצאה מכך עליה באפשרות להופעת תופעות לוואי בהמשך הטיפול.
- אם אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות נגד דיכאון מסוג טריציקליים או מעכבי מונואמינאווקסייד (MAOI) או במשך 14 יום לאחר סיום הטיפול בהן.
- תרופות להורדת לחץ הדם (כגון מתילדופה).
- תרופות לפרקינסון (כגון ברומוקריפטין).

הריון והנקה

יש להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול בתרופה אם את בהריון או מניקה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

אין להשתמש בתכשיר למעלה מ- 3 ימים רצופים אלא אם נרשם על ידי הרופא.

עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים רצופים.

המינון המקובל בדרך כלל הוא 2-3 ריסוסים לכל נחיר פעמיים ביום, בבוקר ובערב. **אין לעבור על המנה המומלצת. יש לנער היטב לפני השימוש.**

אופן השימוש:

• הסר את מכסה הפלסטיק והתז 2 התזות באויר לפני השימוש הראשון.

• קנח את האף בעדינות. בראש זקוף, רסס את התרופה אל תוך כל אחד מהנחיריים (תוך כדי כך יש לסתום באצבע את הנחיר השני) באופן הבא: שאף מספר שאיפות קצרות תוך כדי לחיצות מהירות וחזקות על הבקבוק בהתאם למינון. המתן 3-5 דקות. קנח שוב את האף בעדינות וחזור על הפעולה במידת הצורך.

• שטוף את פיית המרסס בעזרת מים חמים, אך הקפד שלא יכנסו מים אל תוך הבקבוק. נגב בעזרת מפת נייר נקיה וסגור היטב.

• בכדי להימנע מהפצת הזיהום, אין להשתמש באותו בקבוק של תרופה ליותר מאדם אחד.

עליך להשתמש בתרסיס בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף.

אין לבלוע. לשימוש חיצוני בלבד. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברינוקליר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

בזמן השימוש בתרופה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון צריבה, יובש או עקצוץ באף או עיטוש. תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר, אך אם הן נמשכות או מטרידות יש להתייעץ עם הרופא.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת: מופיעות לעיתים נדירות - יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא:

- הופעה מחודשת של הגודש.
- סימנים של ספיגת התרופה לתוך הגוף: כאבי ראש, עצבנות, רעד, דפיקות לב מהירות או חזקות, הפרעות שינה.
- אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.

6. מידע נוסף

• נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Benzalkonium chloride, benzyl alcohol, dibasic sodium phosphate, edetate disodium, carboxymethylcellulose sodium, microcrystalline cellulose, monobasic sodium phosphate, polyethylene glycol, povidone, purified water.

תכולת נתרן במנה: 0.124 מ"ג.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: בקבוק פלסטיק 30 מ"ל עם מרסס לשימוש רב פעמי.

ניתן להשתמש בתרופה עד תאריך התפוגה גם לאחר פתיחתה.

• בעל הרישום: פריגו ישראל סוכנויות בע"מ, רחוב לח"י 29, בני-ברק, 51200.

• שם היצרן: חברת פריגו, אלאגן, משיגן, ארה"ב.

• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: יולי 2013.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 137-88-31672-00.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.