

Препарат отпускается без рецепта врача

Риноклир – Дозированный назальный аэрозоль

Активное вещество и его концентрация:
Оксиметазолина гидрохлорид концентрации 0.05%
(Oxymetazoline hydrochloride)

Вспомогательные вещества: см. раздел 6.

Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту.

Данный препарат обычно не предназначается для младенцев и детей младше 6 лет.

Правильно применяйте препарат. Посоветуйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации. Обратитесь к врачу, если симптомы ухудшаются.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ?

Для временного облегчения заложенности в носу, возникшей в результате простуды, синусита, сенной лихорадки или других аллергических реакций верхних дыхательных путей.

Фармакологическая группа: Симпатомиметики.

2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

❌ Не применяйте препарат, если:

- У Вас повышенная чувствительность (аллергия) к активному веществу или к любому другому ингредиенту, содержащемуся в препарате (см. раздел 6).
- Не применяйте данный препарат одновременно с приемом препаратов группы ингибиторов моноаминоксидазы (MAOI – для лечения депрессии) или в течение 14 дней после окончания их приема.
- Вам удалили гипофиз (pituitary gland).
- Вы страдаете воспалением кожи или слизистой оболочки носа.

Перед применением препарата посоветуйтесь с врачом, если Вы страдаете или страдали в прошлом:

- Нарушением функции сердца и/или кровеносных сосудов.
- Повышенной активностью щитовидной железы (тироид).
- Болезнью глаз (например, глаукомой).
- Увеличением предстательной железы.
- Сахарным диабетом.

Особые предостережения относительно применения препарата:

- Не принимайте препарат часто, не посоветовавшись с врачом.
- Частое и длительное применение может привести к повторной заложенности носа и нанести вред слизистой оболочке носа.
- Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение слизистой оболочки носа.
- У детей особенно имеется тенденция к системной абсорбции данного препарата, и в результате этого повышается вероятность возникновения побочных явлений в процессе лечения.
- Если у Вас повышенная чувствительность к какому-либо пищевому продукту или к какому-либо лекарственному препарату, Вы должны сообщить об этом врачу перед применением препарата.

❗ Если Вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

В особенности, следует поставить в известность врача или фармацевта, если Вы принимаете:

- Антидепрессанты типа трициклинов или ингибиторы моноаминоксидазы (MAOI) или не прошло 14 дней после окончания их приема.
- Препараты, снижающие артериальное давление (такие, как метилдопа).
- Препараты для болезни Паркинсона (такие, как бромокриптин).

❗ Беременность и кормление грудью

Посоветуйтесь с врачом перед началом применения препарата, если Вы беременны или кормите грудью.

3. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТ?

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если Вы не уверены.

Не применяйте препарат более 3 дней подряд, если только это не является предписанием врача.

Обратитесь к врачу, если признаки болезни (симптомы) ухудшаются или не улучшаются после 3 дней подряд.

Обычная дозировка, как правило, это 2-3 впрыскивания в каждую ноздрю два раза в день, утром и вечером.

Не превышайте рекомендуемую дозу. Тщательно взбалтывайте перед употреблением.

Способ применения:

- Снимите пластмассовую крышку и брызните два раза в воздух перед использованием в первый раз.
- Осторожно высморкайтесь. Держа голову прямо, впрысните препарат в каждую ноздрю (в это время зажмите вторую ноздрю пальцем) следующим образом: сделайте пару коротких вдохов, нажимая при этом быстро и сильно на флакон, в соответствии с дозировкой. Подождите 3-5 минут. Снова осторожно высморкайтесь, и, при необходимости, повторите процедуру.
- Промойте горячей водой наконечник пульверизатора, но следите, чтобы вода не попала во флакон. Вытрите чистой бумажной салфеткой и тщательно закройте.
- Во избежание распространения инфекции, не используйте один и тот же флакон с препаратом более чем одним человеком.

Правильно применяйте аэрозоль. Посоветуйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации.

Не глотать. Только для наружного применения. Если Вы применили избыточную дозу, или если ребенок случайно проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.

Не применяйте препараты в темноте! Каждый раз при применении препарата проверяйте этикетку и дозировку. В случае необходимости пользуйтесь очками.

Если у Вас имеются дополнительные вопросы, касающиеся применения препарата, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Как и при лечении любым препаратом, применение Риноклир может вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

Во время применения препарата могут появиться побочные явления, такие, как жжение, сухость или пощипывание в носу, или чихание. Обычно эти явления прекращаются в течение короткого периода времени после адаптации к препарату, но если они продолжаются или доставляют неудобство, посоветуйтесь с врачом.

Побочные явления, требующие особого внимания: Возникают довольно редко – прекратите применение препарата и обратитесь к врачу:

- Повторная заложенность носа.
- Признаки системной абсорбции препарата: головные боли, нервозность, дрожь, учащенное или сильное сердцебиение, нарушения сна.

Если одно из побочных явлений становится более выраженным, или Вы страдаете от побочных явлений, не упомянутых в данной инструкции, Вам следует посоветоваться с врачом.

5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

- Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, вне зоны зрения, и недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача.
- Не применяйте препарат после истечения срока его годности (exp. date), который указан на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
- Хранить при температуре ниже +25°C.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• В дополнение к активному веществу, препарат также содержит:

Benzalkonium chloride, benzyl alcohol, dibasic sodium phosphate, edetate disodium, carboxymethylcellulose sodium, microcrystalline cellulose, monobasic sodium phosphate, polyethylene glycol, povidone, purified water.

Содержание натрия в каждой дозе: 0.124 мг.

• Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки: Пластмассовый флакон с 30 мл аэрозоля с пульверизатором для многократного использования.

Препарат годен к употреблению до истечения срока его годности, даже после его открывания.

• Владелец лицензии: Перриго Израиль Агенства Лтд., ул. Лехи 29, Бней-Брак, 51200.

• Производитель: Компания Перриго, Аллеган, Мичиган, США.

• Данная инструкция проверена и утверждена Министерством Здравоохранения в Июле 2013 года.

• Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 137-88-31672-00.