

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים  
(תכשירים) התשמ"ו - 1986  
התרופה משווקת ללא מרשם רופא  
**יודין טינקטורה**  
טינקטורה  
**FLORIS**

הרכב: החומרים הפעילים וריכוזם:  
יודין 2.5%, אשלגן יודיד 2.5%  
(Iodine 2.5%, Potassium Iodide 2.5%)

**לרשימת החומרים הבלתי פעילים:**

ראה סעיף 6 "מידע נוסף". קרא בעיון את העלון  
עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע  
תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל  
הרופא או אל הרוקח. התרופה מיועדת למבוגרים, ילדים  
ומתבגרים. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח  
אם הנך זקוק למידע נוסף.

**1. למה מיועדת התרופה?**

התרופה מיועדת לחיטוי מקומי.

**קבוצה תרופית - תכשירים אנטיספטיים.** (מחטאים)

**2. לפני שימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה:**

אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד  
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת  
החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

**1. אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד ליבוש מוחלט של התכשיר.
- יש להיוועץ ברופא לפני טיפול בפצעים עמוקים/כוויות קשות.
- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
- יש להימנע משימוש על איזורים נרחבים של העור.
- לפני הטיפול ביוזין טינקטורה ספר לרופא אם: הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).

**2. אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

**3. הריון והנקה:** אם הנך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

**4. מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:**

החומר יודין הנמצא בתכשיר עלול להכתים את הבגדים. התכשיר מכיל אלכוהול חומר דליק.

**3. כיצד תשתמש בתרופה?**

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

**המינון המקובל בדרך כלל הוא:** יש למרוח התמיסה על המקום הנגוע. יש להימנע ממריחה על שטח נרחב של עור פצוע. אין לחבוש את המקום הנגוע בצורה אטומה.

יש להימנע ממגע עם עיניים - במקרה של מגע, לשטוף עם הרבה מים. אם התפתח גירוי מקומי או דלקת או פריחה פנה לרופא. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

אין לבלוע. התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

**4. תופעות לוואי:**

כמו בכל תרופה, השימוש ביוזין טינקטורה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא:**

- במקרה של גירוי מקומי, פריחה או דלקת (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר), (נדיר).

בכל מקרה שבו הנך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית יש להיוועץ עם הרופא מיד.

**דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffect>  
Medic@moh.gov.il

**5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date)
- המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- אחסן במקום קריר, מתחת ל - 25°C.
- סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות.
- אחסן באריזה המקורית.
- ניתן להשתמש במוצר לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה במשך 3 שנים.

**6. מידע נוסף: נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:**

Alcohol 95%, Purified water

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

תמיסה בצבע חום. תכולה: 10 מ"ל.

**היצרן ובעל הרישום:**

בן-שמעון פלוריש בע"מ,

פארק תעשייה משגב, ד.ב. משגב 2017400.

**עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות**

בתאריך: 06/08/2015.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות

הממלכתי במשרד הבריאות: 590627289

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח

בלשון זכר.

על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.