

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

פנדולTM, טבליות מצופות פילם, 500 מ"ג
כל טבליה מצופה פילם מכילה: פאראצטמול 500 מ"ג

רשימת הרכיבים הנוספים מפורטת בסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה אינה מומלצת לילדים מתחת לגיל 6 שנים, אלא בעצה רפואית.

1. למה מיועדת התרופה?

טבליות פנדול משמשות להורדת חום ושיכוך כאבים. לטיפול בכאבי ראש, כאבי שלד ושרירים, כאבי מחזור וכאבי שיניים.

קבוצה תרפויטית
משכך כאבים ומוריד חום

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם הייתה לך בעבר תגובה אלרגית לפאראצטמול או לאחד מהרכיבים הנוספים (מפורטים בסעיף 6).
- אם אתה לוקח תרופות אחרות המכילות פאראצטמול.
- אם אתה מתחת ל 6 שנים אלא אם הרופא שלך אמר לך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בפנדול, ספר לרופא:

- אם יש לך מחלת כבד או מחלת כליה חמורה, כולל מחלת כבד אלכוהולית.
- פאראצטמול עלול לגרום לנזק בכבד כאשר:
- ניתן במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת.
- שותים משקאות אלכוהוליים בזמן הטיפול.
- נוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.

אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח למניעת מינון יתר או הרעלת פאראצטמול.

יש להמנע מלקיחת מינון גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.

אם אתה לוקח תרופות אחרות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחורונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות נגד קרישת דם במיוחד וארפרין
- תרופות הממריצות יצור אנזימים בכבד (לדוגמא: ברביטורטים)
- תרופות לאפילפסיה – פניטואין, קארבאמזאפין
- תרופות נוגדת דלקת שאינן סטרואידיות
- מטוקלופראמיד או דומפרידון (לטיפול בבחילה, הקאה ובעיות עיכול נוספות)
- כלורמפניקול או ריפאמפיצין (אנטיביוטיקות)
- פרובנציד (לטיפול בשגדון)
- כולסטיראמין (להפחתת יתר שומני הדם).

הריון והנקה

אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל הוא:

מבוגרים, קשישים, וילדים בגילאי 12 שנים ויותר:

1-2 טבליות כל 4-6 שעות לפי הצורך.

יש להקפיד על מרווח של לפחות 4 שעות בין מנה למנה.

אין לקחת יותר מ- 8 טבליות ב- 24 שעות.

ילדים בגילאי 6-12 שנים:

1/2-1 טבליה כל 4-6 שעות לפי הצורך.

יש להקפיד על מרווח של לפחות 4 שעות בין מנה למנה.

אין לתת יותר מ- 4 טבליות ב- 24 שעות.

לא מומלץ לילדים מתחת ל-6 שנים אלא בעצה רפואית.

- אין לקחת למשך יותר משלושה ימים בלי להיוועץ ברופא שלך.
- אין לקחת יותר מהמנה המומלצת.
- אם תסמינים ממשיכים היוועץ ברופא שלך.
- שימוש ממושך שלא תחת השגחה רפואית עלול להיות מזיק.

אם אתה לוקח יותר מדי טבליות

אם לקחת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. גם אם הרגשתך טובה, טיפול מיידי הוא חיוני, בגלל הסיכון להתפתחות נזק חמור לכבד. תופעות לוואי יכולות להיות בחילה והקאה, שלשול, אובדן תאבון, כאבי בטן, נפיחות, הזעה מוגברת, כאב או רגישות בכטן העליונה ויתכן שהן לא משקפות את חומרת הנזק לכבד.

אין לקחת תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפנדול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

הפסק תרופה זו וספר לרופא שלך מיד אם:

- אתה חווה תגובות אלרגיות כגון פריחה עורית או גרד, לפעמים עם בעיות נשימה או בליעה, או התנפחות של השפתיים, הלשון, הגרון או הפנים.
 - אתה חווה פריחה עורית חמורה או קילוף של העור שעלול להיות מלווה בכיבים בפה.
 - חווית בעבר בעיות נשימה עם אספירין או תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, ואתה חווה תגובה דומה למוצר זה.
 - אתה חווה פציעה או דימום לא מוסברים או התפתחות דלקות ביתר קלות.
- תגובות אלה נדירות.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין לאחסן מעל 25°C .

אין להשתמש בתרופה זו אחרי תאריך התפוגה (exp.date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: pregelatinised starch, maize starch, talc, stearic acid, povidone, potassium sorbate, hypromellose and triacetin.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה- טבליות פנדול הן לבנות, טבליות מצופות פילם בעלות קצוות שטוחים עם לוגו משולש מוטבע על צד אחד וקו חציה על הצד השני. טבליות פנדול מיוצרות באריזות של 8, 10, 12, או 20 טבליות.
- יתכן ולא כל גדלי האריזות ישווקו.
- בעל הרישום: גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקוה.
- יצרן: גלקסו סמיתקליין דנגרבן בע"מ, דנגרבן, אירלנד.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: יוני 2015

- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 122-37-30225
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Pan PT v4