

بانادول، أقراص مطلية بفيلم، ٥٠٠ ملغ

كل قرص مطلي بفيلم يحتوي على: باراسيتامول ٥٠٠ ملغ

قائمة مفصلة للمركبات الإضافية في الفقرة ٦

اقرأ كامل النشرة بتمعن قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. لا يوصى بإستعمال الدواء لدى الأطفال دون عمر ٦ سنوات، إلا بتوصية من الطبيب.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

تستعمل أقراص بانادول لتخفيف السخونة ولتسكين الألم. لمعالجة الصداع، الإضطرابات العضلية الهيكلية، آلام الدورة الشهرية وآلم الأسنان.

الفصيلة العلاجية: مسكن للألام وخافض للسخونة

٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا حصل لديك ذات مرة رد فعل تحسسي لـ باراسيتامول أو لأي من المركبات الإضافية (مفصلة في الفقرة ٦).
- إذا كنت تتناول أدوية إضافية تحتوي على باراسيتامول.
- إذا كنت دون عمر ٦ سنوات إلا إذا أوصاك الطبيب بذلك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء قبل العلاج بـ بانادول، إحك للطبيب:

• إذا كان لديك مرض شديد في الكبد أو الكلى، بما في ذلك مرض الكبد الكحولي.

يمكن أن يسبب باراسيتامول ضرراً للكبد عندما:

- يعطى بجرعة دوائية أكبر من الموصى بها أو لفترة زمنية طويلة.
- يتم شرب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.
- تتناول أدوية أخرى تؤثر على وظيفة الكبد.

لا تتناول أدوية أخرى لتخفيف السخونة وتخفيف الآلام أو أدوية الرشح بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي وذلك لمنع فرط الجرعة الدوائية أو التسمم بالباراسيتامول.

تجنب تناول جرعة دوائية مرتفعة من هذا الدواء (وذلك ضمن الحدود الموصى بها) أثناء الصيام.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- مضادات التخثر خاصة وارفارين
- الأدوية المحفزة لإنتاج إنزيمات الكبد (مثل باربيتورات)
- مضادات الصرع - فينيتوين، كاربامازيبين
- مضادات الإلتهاب اللاستيرويدية
- ميتوكلوبراميد أو دومبيريدون (لعلاج الغثيان، التقيؤ أو مشاكل هضمية أخرى)
- كلورامفينيكول أو ريفامبيسين (مضادات حيوية)
- بروبينيسيد (لعلاج النقرس)
- كوليسيرامين (لتخفيف فائض الشحوم في الدم)

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة إستشيري الطبيب قبل بدء العلاج بالدواء.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيحاء من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية الاعتيادية هي:

الكبار، المسنين والأطفال بعمر ١٢ سنة وما فوق:

١-٢ أقراص كل ٤-٦ ساعات حسب الحاجة.

تأكد من ترك فاصل زمني قدره ٤ ساعات على الأقل بين الجرعات الدوائية.

لا تتناول أكثر من ٨ أقراص خلال ٢٤ ساعة.

الأطفال بعمر ٦-١٢ سنة:

نصف قرص حتى قرص كل ٤-٦ ساعات حسب الحاجة.

تأكد من ترك فاصل زمني قدره ٤ ساعات على الأقل بين الجرعات الدوائية.

لا تعطي أكثر من ٤ أقراص خلال ٢٤ ساعة.

الدواء غير موصى به للأطفال دون عمر ٦ سنوات إلا بتوصية من الطبيب.

- لا تتناول الدواء لفترة تزيد عن ثلاثة أيام بدون إستشارة طبيبك.
- لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.
- إستشر طبيبك إذا إستمرت الأعراض.
- الإستعمال المطول بإستثناء الخاضع لمراقبة طبية يمكن أن يكون ضاراً.

إذا تناولت أقراص أكثر مما ينبغي

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لفرقة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبه الدواء معك. حتى ولو كنت تشعر بشكل جيد فإن العلاج الفوري ضروري، نظراً لخطورة تطور ضرر شديد للكبد. الأعراض الجانبية يمكن أن تشمل غثيان وتقيؤ، إسهال، فقدان الشهية للطعام، ألم في البطن، إنتفاخ، تعرق زائد، ألم أو حساسية في أعلى البطن حيث أنها لا تعكس شدة الضرر الحاصل للكبد.

لا تتناول الأدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة أخرى حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال بانادول قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

توقف عن تناول الدواء وبلغ الطبيب حالاً إذا:

- كنت تقاسي من رد فعل تحسسي مثل طفح جلدي أو حكة، تترافق أحياناً بمشاكل في التنفس أو البلع أو بإنتفاخ الشفتين، اللسان، الحنجرة أو الوجه.
- كنت تقاسي من طفح جلدي شديد أو تقشر الجلد الذي قد يترافق بتقرحات في الفم.
- قاسيت في الماضي من مشاكل في التنفس عند إستعمال أسبيرين أو مضادات الإلتهاب اللاستيرويدية وتقاسي من رد فعل مشابه عند إستعمال هذا المستحضر.
- كنت تقاسي من كدمات أو نزف مجهولة السبب أو في حال تطور إلتهابات بسهولة أكبر لديك.

ردود الفعل هذه هي نادرة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز تخزين الدواء بدرجة حرارة تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبه. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

pregelatinised starch, maize starch, talc, stearic acid, povidone, potassium sorbate, hypromellose and triacetin.

- كيف يبىد الدواء وما هو محتوى العلبه -
- أقراص بانادول بيضاء، مطلية بفيلم أطرافها مسطحة منقوش عليها من جانب واحد شعار مثلث الشكل وخط للشطر من الجانب الثاني.
- أقراص بانادول متوفرة بعلب ذات ٨، ١٠، ١٢، ٢٠ قرصاً.
- من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمتياز: جلاكسو سميثكلين (اسرائيل) م.ض.، شارع بازل ٢٥، بيتح - تكفا.
- المنتج: جلاكسو سميثكلين دونجارفان م.ض.، دونجارفان إيرلندا.
- أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص في حزيران ٢٠١٥
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٣٠٢٢٥-٣٧-١٢٢
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.