

**chronogest**

**Chronogest PMSG 6000 IU Veterinary**  
**כרונוג'סט I.U. 6000 PMSG וטרינרי**



אבקה להכנת תמיסה להזרקה תוך שרירית

**הרכב:**

כל בקבוקון מכיל:

Pregnant mare serum gonadotrophin 6000 IU

כל בקבוקון מכיל 6000 יחב"ל של סרום גונדוטרופינים, בצורה של אבקה סטרילית  
שעברה תהליך יבוש בהקפאה.

כרונוג'סט I.U. 6000 PMSG הוא חלק ממסלול הטיפול של כרונוג'סט לבקרת הרבייה  
בכבשים ועיזים.

**קבוצה תרפויטית:**

הורמונים וטרינריים.

**פעילות רפואית:**

השראה וסינכרוניזציה של הביוץ בכבשים, רחלות ועיזים.

**מנגנון הפעולה:**

כאשר ספוגית הפרוגסטוגן נמצאת בנרתיק הכבשה או העז, היא משרה בחיה פעילות  
פרוגסטטיבית, בדומה לשלב הלוטאלי במחזור המיני. התקופה הפרוגסטטיבית  
המלאכותית הזו מסתיימת ברגע הוצאת הספוגית. בשלב זה (או בעיזים לעיתים  
יומיים קודם לכן) הזרקה של כרונוג'סט PMSG גורמת להתחלת השלב הפוליקולרי.  
הגופיפים המתפתחים גורמים להופעת הייחום והביוץ בזמן המתוכנן.

**מינון והגשה:**

מינון כרונוג'סט PMSG תלוי בגיל החיה, גזע, עונה וכו'. יש להמיס את התרופה  
בממס ולהזריק את המנה הנדרשת בהזרקה תוך שרירית. יש להזריק את התרופה מיד  
לאחר המסתה, ולהשמיד את הבקבוק הריק לאחר השימוש.

**הערה:**

ניתן להשתמש בכרונוג'סט לבקרת רבייה בבקר בשילוב טיפול פרוגסטוגני מתאים.

**אזהרות:**

במקרים נדירים, ככלל התכשירים המכילים חלבונים, תגובה אנפילקטית עלולה להופיע  
זמן קצר לאחר ההזרקה.  
במקרים כאלה ניתן לטפל בזריקת אדרנלין. כמו כן גם טיפול סטרואידי יכול להועיל  
במקרים אלה.  
קיימת אפשרות, עקב תגובות אלרגיות, שחום יופיע עד היום הרביעי לאחר הטיפול. אין  
להרביע במקרה זה, אלא להמתין לתקופה הבאה.

**חומרי גלם בלתי פעילים:**

Disodium Hydrogen Phosphate, Sodium Dihydrogen Phosphate, Mannitol.

**אחסנה:**

יש לאחסן את האבקה היבשה במקרר בין 2°C-8°C.  
לשימוש מיידי לאחר שיחזור.  
יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.

**מספר רישום התרופה:** 083-72-92133-00.

**יצרן:** אינטרווט בע"מ, בוקסמיר, הולנד.

**בעל הרישום:**

אינטרווט ישראל בע"מ, א.ת. נווה-נאמן, הוד השרון 45240.

