

فنتولين ديسكوس

يحتوي كل مقدار دوائي على ٢٠٠ ميكروغرام سالبوتامول (كسولفات) (salbutamol as sulfate) من مسحوق للإستنشاق يحتوي فنتولين ديسكوس على ٦٠ مقدار دوائي معابر. قائمة المركبات الإضافية مفصلة في الفقرة ٦.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدلك أن مرضهم مشابه لمرضك.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

يحتوي فنتولين ديسكوس دواء يسمى سالبوتامول. وهو ينتمي إلى فصيلة الأدوية المسماة موسعات القصبات سريعة التأثير. • تساعد موسعات القصبات على بقاء الممرق التنفسية مفتوحة في رثتك. الأمر الذي يسهل من دخول وخروج الهواء. • هي تساعد على تخفيف الضغط في الصدر، الصفير والسعال.

يستعمل فنتولين ديسكوس لمعالجة المشاكل التنفسية لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو ومن حالات مشابهة. بما في ذلك تخفيف ومنع الربو الناتج عن النشاط البدني أو "عوامل" أخرى مثل غبار البيت، غبار الطلع، القطط، الكلاب ودخان السجائر. **الفصيلة العلاجية:** مقاد للمستقبل الأدرينالي β_2 .

٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) ل سالبوتامول سولفات أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء كما هو مفصل في الفقرة ٦.
- كان من المفترض أن تتجاذي ولادة مبكرة بشكل غير متوقع أو كنت معرضة لخطورة حدوث إجهاض.
- لديك حساسية شديدة لبروتين الحليب.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل إستعمال فنتولين ديسكوس إذا:

- الربو لديك نشيط (مثلاً لديك أعراض متكررة أو تبتعث من جديد أو قدرة جسدية محدودة). للسيطرة على الربو لديك يمكن للطبيب أن يضيف دواء أو يرفع مقدار دوائي لدواء مثلاً الستيروئيدات بالإستنشاق.
- لديك ضغط دم مرتفع
- لديك فرط نشاط في الغدة الدرقية
- لديك سابقة لمشاكل في القلب مثل نظم قلب غير منتظم أو سريع أو ذبحة صدرية.
- كنت تتناول مشتقات الكسانتين (مثل تيوفيلين) أو ستيروئيدات لمعالجة الربو.
- كنت تتناول المدرات البولية، تستعمل أحياناً لمعالجة ضغط الدم المرتفع أو الأمراض القلبية.
- إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من شأنك أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. لا تنسى أخذ هذا الدواء معك إذا كنت بحاجة للذهاب للمستشفى. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:
- أدوية لنظم القلب غير المنتظم أو السريع (خاصة من فصيلة حاجبات بيتا مثل پروبرانولول).
- أدوية أخرى للربو لديك.

إستعمال الدواء والطعام

يمكنك إستعمال فنتولين ديسكوس في كافة ساعات اليوم، مع أو بدون طعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة، تعتقدن بأنه من الجائز أنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل، إستشيرى الصيدلي أو الطبيب الخاص بك قبل إستعمال هذا الدواء.

السياقة وإستعمال الماكنت

من غير المحتمل أن يؤثر فنتولين على قدرتك على السياقة، إستعمال أدوات العمل أو الماكنت.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

هذا الدواء يحوي لكتون. إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، إتصل بطبيبك قبل إستعمال هذا المنتج الطبي.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي هو:

الكبار والأطفال:

للتخفيف الفوري، نشقة واحدة (٢٠٠ ميكروغرام).

في العلاج المزمن، نشقة واحدة (٢٠٠ ميكروغرام) حتى ٤ مرات في اليوم.

للمنع نتيجة النشاط البدني أو التعرض لمولد حساسية، نشقة واحدة (٢٠٠ ميكروغرام)، ١٠ - ١٥ دقيقة قبل التعرض أو النشاط البدني.

المقدار الدوائي الأقصى هو نشقة واحدة (٢٠٠ ميكروغرام) ٤ مرات في اليوم.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به

تابع تعليمات الإستعمال في نهاية النشرة

إذا إستعملت بالخطأ مقدار دوائي أكبر عليك إبلاغ الطبيب بأسرع ما يمكن.

قد تحدث الأعراض التالية:

- قلبك يخفق بشكل أسرع من المعتاد
- كنت تشعر برجفان
- فرط نشاط (hyperactivity).

تزول تلك الأعراض عادة خلال عدة ساعات.

إذا نسيت إستعمال الدواء

• إذا نسيت مقدار دوائي، إستعمله لحظة تذكرك بذلك

• مع ذلك، إذا حان موعد المقدار الدوائي التالي، فوّت المقدار الدوائي المنسي.

• لا تستعمل مقدار دوائي مضاعف لإكمال المقدار الدوائي المنسي.

يجب المواظبة على العلاج كما وصيت من قبل الطبيب.

في حال توقفك عن إستعمال الدواء

لا تتوقف عن إستعمال فنتولين ديسكوس من دون التحدث مع طبيبك.

لايجوز تناول الأدوية في العتمة؛ إفحص للملصقة والمقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

إذا تفاقم التنفس أو الصفير لديك حالاً بعد إستعمال هذا الدواء، توقف في الحال عن إستعماله وبلغ طبيبك بأسرع ما يمكن.

كما بكل دواء، إن إستعمال فنتولين ديسكوس قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندمش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

قد تحدث الأعراض الجانبية التالية نتيجة هذا الدواء:

ردود فعل تحسسية (نادر جداً، من شأنها أن تظهر لدى حتى شخص ١ من بين ١٠٠٠٠ شخص)

إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي، توقف عن إستعمال فنتولين ديسكوس وتوجه حالاً إلى الطبيب. علامات رد الفعل التحسسي تشمل: إنقناخ الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة والذي قد يؤدي لصعوبات في البلع أو في التنفس، طفح حاك، الشعور بإغماء ودوار، وإنهيار.

يجب التوجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن إذا:

- كنت تشعر بأن قلبك يخفق بشكل أسرع أو أقوى من المعتاد (خفقان القلب). هذا العرض غير ضار عادة، ويتوقف على الأغلب بعد إستعمالك للدواء لفترة معينة
- من الجائز أن تشعر بعدم إنتظام ضربات قلبك أو أن قلبك يبيض نبضة إضافية
- من شأن هذا الأمر أن يظهر لدى حتى شخص ١ من كل ١٠ أشخاص (شائع).
- إذا كنت تعاني من إحدى تلك الأعراض، تحدث مع طبيبك بأسرع ما يمكن. لا تتوقف عن إستعمال هذا الدواء إلا إذا قيل لك أن تفعل ذلك.

أعراض جانبية إضافية

بلغ طبيبك إذا كنت تعاني من إحدى الأعراض الجانبية التالية التي من شأنها أن تحدث أيضاً مع هذا الدواء:

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى شخص ١ من بين ١٠ أشخاص)

- الشعور برجفان
- صداع

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى شخص ١ من بين ١٠٠ شخص)

- تهيج في الفم والحنجرة
- تقلصات عضلية.

أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تظهر لدى حتى شخص ١ من بين ١٠٠٠ شخص)

- نسبة منخفضة لليوتاسيوم في دمك
- زيادة تدفق الدم إلى أطرافك.

أعراض جانبية نادرة جداً (من شأنها أن تظهر لدى حتى شخص ١ من بين ١٠٠٠٠ شخص)

- تغيرات في أنماط النوم وتغيرات في السلوك، مثل قلة راحة وإنفعال زائد (hyperactivity).

قد تظهر أيضاً الأعراض الجانبية التالية ولكن شيوعها غير معروف:

- ألم في الصدر، بسبب وجود مشاكل في القلب مثل ذبحة صدرية. بلِّغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا حدث هذا الأمر. لا تتوقف عن إستعمال هذا الدواء إلا إذا قيل لك أن تفعل ذلك.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

إذا كنت تعتقد بأن هذا الدواء لا يعمل جيداً بشكل كافٍ بالنسبة لك

إذا بدا لك أن هذا الدواء لا يؤثر عليك كالمعتاد، بلِّغ طبيبك بأسرع ما يمكن. من الجائز أن مشكلة التنفس قد تفاقمت لديك ومن الجائز أنك بحاجة لدواء آخر. لا تستعمل مقادير دوائية إضافية من فنتولين ديسكوس إلا إذا قال لك الطبيب أن تفعل ذلك.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الإستمارة المباشرة للإبلاغ عن الأعراض الجانبية الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

www.health.gov.au أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.au/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdverseEffectMedic@moh.gov.au>

٥ كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية. يجب الحفظ في العلبة الأصلية.

٦ معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً: لكتوز مونهيدرات.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتواه: يحتوي فنتولين ديسكوس على ٦٠ مقدراً دوائياً ذات ٢٠٠ ميكروغرام من سالبوتامول (على شكل فوسفات).
- صاحب الإمتياز: جلاكسوسميثكلان (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل ٢٥، بيتح تكفا.
- المنتج: چلاكسو ويلكام پروديكشن، إقري، فرنسا.
- أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في تاريخ: آب ٢٠١٥.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة ١٢٦-٩٧-٣٠٦٧٤
- من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تعليمات الإستعمال:

- يريك الطبيب أو الصيدلي كيفية إستعمال الديسكوس الخاص بك. وسيفحصان من حين لآخر كيفية إستعمالك له. إن إستعمال فنتولين ديسكوس بشكل غير صحيح أو بشكل مغاير عما وصف قد لا يساعد في الربو لديك كما هو مفترض.
- يحتوي جهاز فنتولين ديسكوس على لويحات (بليست) التي تحتوي على فنتولين بشكل مسحوق.
- هناك عداد في القسم العلوي من فنتولين ديسكوس الذي يريك كم تبقى من المقادير الدوائية. يقوم العداد بالعد التنازلي حتى 0 (صفر). الأرقام 5 (خمسة) حتى 0 (صفر) تظهر باللون الأحمر لتنبهك بأنه تبقى عدة مقادير فقط. في اللحظة التي يظهر فيها العداد رقم 0 (صفر)، فإن الديسكوس الخاص بك قد فرغ. لا تستعمل الديسكوس الخاص بك في أوقات أقرب مما أوصاك الطبيب.
- بلِّغ الطبيب إذا بدا لك أن دوائك لا يعمل عليك كالمعتاد، لأنه من الجائز أن مشكلة التنفس لديك قد تفاقمت ومن الجائز أنك بحاجة لدواء آخر.
- من الجائز أن طبيبك قال لك أن تستعمل مقدار دوائي أكبر من الموصى به كعلاج طارئ وذلك إذا تفاقم جداً الصغير أو التنفس لديك. من المهم جداً أن تلتزم بتعليمات طبيبك بالنسبة لكمية النشقات الواجب إستعمالها وبأية وتيرة يجب إستعمال الديسكوس الخاص بك.

إستعمال الديسكوس الخاص بك

- ١) لفتح فنتولين ديسكوس، إمسك العلبة الخارجية بيد واحدة وضع إبهام يدك الثانية على مقبض الإبهام. قم بدفع الإبهام بعيداً عنك ما أمكن، حتى سماع طقة (كليك)، وسيفتح ثقب صغير في الفوهة.




- ٢) إمسك فنتولين ديسكوس الخاص بك بحيث تتجه الفوهة بإتجاهك. يمكن مسكه بيدك اليمنى أو اليسرى. قم بزلق الرفاعة بعيداً عنك ما أمكن، حتى سماع كليك. هذه العملية تحرر مقدار دوائي من دواك في الفوهة. في كل مرة تدفع فيها الرفاعة إلى الوراء سيتحرر في الداخل مقدار دوائي من مسحوق جاهز للإستنشاق من قبلك. لا تلعب بالرفاعة لأن هذا الأمر يحرق مقادير دوائية من المسحوق ويهدر الدواء.



- ٣) إمسك فنتولين ديسكوس بعيداً عن فمك، إزفر الهواء إلى الخارج قدر إستطاعتك. لا تزفر لداخل فنتولين ديسكوس الخاص بك. لا تستنشق هواء إلى الداخل حتى الآن.

- ٤) أطلب شفطك على الفوهة، قم بالإستنشاق إلى الداخل بشكل عميق وثابت عبر فنتولين ديسكوس عن طريق فمك وليس عن طريق أنفك. أبعد فنتولين ديسكوس عن فمك، إحبس نفسك لمدة ١٠ ثوان تقريباً أو قدر إستطاعتك. إزفر ببطء.



- ٥) لإغلاق فنتولين ديسكوس، قم بزلق مقبض الإبهام ثانية بإتجاهك ما أمكن، حتى سماع كليك. ستعود الرفاعة إلى مكانها الأصلي وتصبح جاهزة للتشغيل من جديد. الآن الديسكوس الخاص بك جاهز للإستعمال من جديد من أجلك.



تنظيف الديسكوس الخاص بك

إمسح فوهة الديسكوس بمسحوق جاف من أجل تنظيفه.