

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

טולפיין – תמיסה להזרקה וטרינרי
Tolfine – solution for injection veterinary

חייב מרשם רופא וטרינר

הרכב: Tolfenamic Acid 4%
חומרים בלתי פעילים: Sodium formaldehyde sulfoxylate, Benzyl alcohol, Ethyldiglycol, Ethanolamine, Water for injection

קבוצה תרפויטית: נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDS)

פעילות רפואית: אנטי דלקתי, נוגד חום ומרגיע כאבים המותווה לשימוש בבקר כתוספת לטיפול ב- acute mastitis, בשילוב עם טיפול אנטיביוטיאלי ובחזירים כתוספת לטיפול ב- Metritis Mastitis Aqalactia Syndom בשילוב עם טיפול אנטיביוטיאלי.

התוויות נגד: לא למתן תוך שרירי בבקר בטיפול ב Mastitis. לא למתן תוך ורידי בחזירים.

אין להשתמש בחיות הסובלות ממחלות לב, כבד או כליות, כשאר יש חשש לכיב קיבה או מעי או דימום במערכת העיכול או כאשר ידועה רגישות למרכיבי התרופה.

תופעות לוואי: נפיחות חולפת ואדמומיות עלולים להופיע במקום ההזרקה.

אזהרות

- יש להזהר בשימוש על מנת להימנע מתאונת הזרקה עצמית
- בחשיפה של העיניים או העור לחומר, יש לשטוף במים מיד.
- יש לנקות היטב את מקום ההזרקה.
- אין להזריק מעל 20 מ"ל באותו מקום.
- אין לעבור על המנה המומלצת.
- יש להזריק בתנאים אספטים.
- כאשר מטפלים במספר חיות מומלץ להשתמש במחט קבועה לשאיבת החומר על מנת להמנע מניקוב רב של הפקק.
- אין להשתמש בתרופות אחרות ממשפחת ה- NSAIDS במקביל לתרופה, יש לחכות לפחות 24 שעות בין תרופה לתרופה.
- Tolfenamic acid נקשרת בזיקה גבוהה לחלבוני הפלסמה ועלולה להתחרות בתרופות הנקשרות גם לחלבוני הפלסמה, ובכך ליצור אפקט טוקסי.
- יש להיזהר בשימוש בחיות מבוגרות, או חיות שגילן מתחת ל- 6 שבועות או אם לא ניתן להמנע מהשימוש, יש לתת מנה מופחתת ולעקוב אחר החיה המטופלת.
- להימנע משימוש בחיות הסובלות מהתייבשות, חסר נפח דם או לחץ דם נמוך.

- עדיף להימנע משימוש בחיות שעברו הרדמה כללית עד להתאוששותן המלאה.
- אין להשתמש במקביל עם תרופות נפרוטוקסיות.

הריון והנקה

- ניתן להשתמש בזמן הנקה.
- לגבי שימוש בהריון הנתונים אינם מלאים, וניתן להשתמש לפי החלטת המנתח הוטרינרי, לאחר ששקל סיכונים מול תועלת.

מינון

בקר : Mastitis – 4 מ"ג לק"ג משקל גוף (1 מ"ל ל- 10 ק"ג משקל גוף) בהזרקה תוך ורידית. שימוש שלא ב- Mastitis : 2 מ"ג לק"ג משקל גוף (1 מ"ל ל- 20 ק"ג משקל גוף) בזריקה לתוך השריר באזור הצוואר.
 MMA Syndrome בחזירים : 2 מ"ג ל- ק"ג משקל גוף (1 מ"ל 20 לק"ג משקל גוף) - זריקה לשריר הצוואר.

זמן המתנה

- בקר : לבשר - 3 ימים. לחלב – 24 שעות.
- חזירים : לבשר - 3 ימים

אחסון

- שמור את התכשיר בטמפרטורה של מתחת ל- 25°C, להגן מאור.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- לאחר פתיחה ראשונה- ניתן להשתמש בתכשיר עד 28 יום.

יצרן : Vetoquinole 70204 Lure Cedex France
 בעל הרישום : אליעזר לינביץ בע"מ, ת"ד 2920 אבן יהודה
 אריזה : 100 מ"ל
 מספר רישום התרופה : 082-44-92298-00



לשימוש וטרינרי בלבד