

אף-קאר

טיפות/ תרסיס במינון מדוד לאף – מבוגרים

אף-קאר ילדים

טיפות/ תרסיס במינון מדוד לאף - ילדים

הרכב:

אף קאר: Xylometazoline 0.1%

אף קאר ילדים: Xylometazoline 0.05%

לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר ראה סעיף 6 – "מידע נוסף"

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה,

תרופה זו משווקת ללא מרשם רופא. התרופה מיועדת למבוגרים, ילדים ומתבגרים. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא באם סימני המחלה מחמירים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מכווצת את כלי הדם באף וכך מפחיתה את הגודש באף.

התוויות: להקלה מהירה, עד 10 שעות, של גודש האף.

קבוצה תרפויטית:

מכיל קסילומטאזולין הידרוכלוריד, הנמנה על קבוצת הסימפטומימטים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם: ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לתכשירים דומים לאותה מטרה. הינך לאחר כריתה טרנס-ספנואידלית של בלוטת יותרת המוח או ניתוחי אף ולוע.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה :

- א) אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול: אם הינך בהריון או אם הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד הלב או כלי דם (הסתיידות עורקים), העיניים (כגון גלאוקומה), מליקוי בתיפקוד הכבד, הכליה/ מערכת השתן וכן מפעילות יתר של בלוטת התריס, יתר לחץ דם או סוכרת.
- ב) שימוש ממושך או מופרז עלול לגרום להחמרה בגודש ולפגיעה ברירית האף! אין להשתמש בתרופה לעתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. אין להשתמש בקסילוזיט יותר מאשר 3 ימים רצופים אלא אם כן נרשם ע"י הרופא.
- ג) אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
- ד) תגובות בין תרופתיות: אם הינך נוטל תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות נגד דיכאון כגון בולמי מונואמיין אוקסידאז (MAOI) הטרי-ציקליים או הטטרה-ציקליים (שימוש בו זמני עלול לגרום להעצמת האפקט הסיסטמי של קסילומטאזולין), תרופות להורדת לחץ דם מסוג מתיל דופא או תירוקסין.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

שים לב: לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

המינון המקובל (בהעדר הוראה אחרת מרופא):

מבוגרים וילדים מעל גיל 12:

טיפות: 2-3 טיפות, כל 8-10 שעות.

תרסיס במינון מדוד: 1-2 ריסוסים, כל 8-10 שעות.

ילדים בגיל 2-12 שנים: השתמש באף-קאר ילדים:

טיפות: 2-3 טיפות, כל 8-10 שעות.

תרסיס במינון מדוד – 1 ריסוס, כל 8-10 שעות.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל שנתיים אלא בהמלצת הרופא ותחת השגחתו.

אין לעבור על המנה המומלצת. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הקצוב, יש ליטול מנה מיד כשזכרת, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד.

כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול?

טיפות אף: א. כיצד להשתמש בטיפות: קנח את האף בעדינות. הטה את ראשך לאחור, או שכב על המיטה. טפטף הטיפות לכל נחיר, והמשך להטות ראשך למשך מספר דקות, לאפשר פיזור התרופה בכל איזור האף. ב. רחץ היטב את הטפטפת במים חמים יבש במגבת ניר נקיה, אך הקפד שלא ייכנסו מים לתוך הבקבוק. סגור הבקבוק היטב לאחר השימוש. ג. למניעת הפצת הזיהום – אל תשתמש באותו בקבוק של תרופה ליותר מאדם אחד.

תרסיס (ספריי לאף): א. קנח את האף בעדינות. כשראשך זקוף, רסס התרופה לתוך כל נחיר (תוך כדי כך יש לסתום באצבע את הנחיר השני), באופן הבא: שאף שאיפות קצרות תוך כדי לחיצות מהירות וחזקות על הבקבוק. מספר הלחיצות יהיה בהתאם למינון המומלץ. ב. המתן 3-5 דקות. ג. קנח שוב את האף בעדינות וחזור על הפעולה במידת הצורך. ד. שטוף פיית המרסס במים חמים, אך הקפד שלא יכנסו מים לתוך הבקבוק. נגב במפית נייר נקיה, וסגור היטב. ה. למניעת הפצת הזיהום- אל תשתמש באותו בקבוק ליותר מאדם אחד.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה משתמש בתרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש קסילווטי, עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

עלולות להופיע השפעות לוואי כגון:

הרגשת צריבה באף ובגרון, יובש באף, בחילות עיטוש או עקצוץ באף. תופעות אלה חולפות בדרך כלל זמן קצר לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר. אם הן נמשכות או מטרידות, יש להתייעץ עם הרופא.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: במקרה של גודש חוזר או תופעות המהוות סימן לספיגה סיסטמית (לגוף) כגון: כאב ראש, הפרעות ראייה, הפרעות בשינה ודפיקות לב מהירות או חזקות, תופעות היכולות להעיד על תגובה אלרגית; קושי בנשימה או בבליעה, נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון, גרד חמור בעור המלווה בפריחה אדומה או בליטות בעור: הפסק את הטיפול ויש לפנות לרופא מיד!

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ובתינוקות: על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד! ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

5. איך לאחסן את התרופה?

אחסן במקום חשוך, בטמפרטורה הנמוכה מ 25°C .
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp.date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
גם לפי תנאי האריזה /אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. ניתן להשתמש בתרופה עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק לראשונה ולא יאוחר מתאריך התפוגה המופיע על האריזה התרופה היא תמיסה צלולה וחסרת צבע.
אחסן באריזה המקורית. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור, מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא איתך את אריזת התרופה.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

6. מידע נוסף:

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם את החומרים הלא פעילים הבאים:
Sodium Chloride, Potassium Chloride, Benzalkonium Chloride, Disodium Edetate, Disodium Hydrogenphosphate, Potassium Dihydrogenphosphate, Purified Water

מספר רישום התרופה: אף-קאר- 134.71.31422

אף-קאר ילדים- 134.70.31421

יצרן: ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 114 בנימינה 3055002, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: 04/2015

התרופה מיועדת לבני שני המינים. לשם הפשטות והקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.