

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986.

## התרופה משווקת ללא מרשם רופא.

**הרכב:** כל קפליה מכילה:

פראצטמול 500 מ"ג  
Paracetamol 500 mg

שימית המרכיבים הבולטו פעילים בתכשיר  
- ראה טעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אחר ש'ך למרות השימוש הרופא או לרופא. לתלך.

הרופא או ניתנת ללא צורך במרשם רופא ומיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל 6 בלבד, מתחת לגיל זה יש להשתמש בצורות מתן המיועדות לילדים. עליון להשתמש בה בצורה כנונה. היועץ ברופא או ברופא אם הנך זקוק למידע נוסף.

יש לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ- 3 ימים או אם סימני המחלה מחמירים או לא מתחמרים לאחר 3 ימים למרות השימוש בתרופה או בכל מצב שבו מופיעים תסמינים חדשים.

## 1. למה מיועדת התרופה?

**דקסמול** מיועד לשיכוך כאבים והורדת חום הגורמים למצב של חום שנוטח כגון כאבי ראש, כאבי שיניים, הצטננות, שפעת, כאבים שיגורוניים (רואומטיים) וכאבי מחזור.

**קבוצת הרואידים:**  
משכך כאבים ממויז חום.

## 2. לפני השימוש בתרופה

### אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש לפראצטמול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים שמכילה התרופה.

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- לפני הטיפול בדקסמול, ספר לרופא אם:
  - הנך סובל או סבלת בעבר מאלכוהוליזם, משכבי כאב בכל יום.
  - הנך רגיש ללוקיית תפקוד הכבד או לתפקוד הכליה/מערכת השתן.
  - הנך רגיש למונח כלשהו או לתרופה כלשהי.
  - אתה סובל מדלקת פרקים ונאלץ ליטול משכבי כאב בכל יום.
  - אתה השתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להיוועץ ברופא.
  - הימנע מלקחת מינון גבוה (אף אם גבגב) המומלץ של תרופה זו בזמן צום.
  - התכשיר מכיל פראצטמול העלול לגרום לזקק כבד במקרים אלה: ניתן מינון גבוה מומלץ או לתקופה ממושכת. שתיית משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול, או שנטולטים תרופות נוספות המשפיעות על פעולת הכבד.

- אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים, או תרופות להצטננות ללא ההתייעצות עם רופא או רוקח - למנעת מינון יתר/הרעה של פראצטמול.
- אין ליטול תרופות נוספות ממשפחת "דקסמול" ו/או תכשירים נוספים המכילים פראצטמול.
- אם פיתחת בעבר תופעות לואי עוריות כתוצאה מנטילת תכשירים המכילים פראצטמול, אין ליטול תכשירים המכילים פראצטמול, כדי שלא יגרמו שוב לתופעות עוריות חמורות.

### אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות נגד: קרישת דם (כגון וורפרין).
- תרופות המזרות פעילות אנטימי הכבד כגון בריבוטריס, פנטואין או קרבמזפול (מכשכת כאבים בעיקר לאפילפסיה, לעוויות ולבעיות פרכיבנדי (לטיפול בגשדון).
- אספירין או סליצילטים אחרים, תרופות נוספות בעלות פעילות משככת כאבים או מורידת חום ונוגדי דלקות שאינם סטרואידים.
- מטבולופראמיד או דומפרידון (לטיפול בבחילה, הקאות ובעיות קיבה אחרות) וכולסטרראמין (להפתחת יתר שומני הדם).
- אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול (אם אינך בטוח שהתרופה שהנך נוטל מכילה פראצטמול, היועץ ברופא או ברופא).

### שימוש בדקסמול בצריכת אלכוהול

אין לשלחת משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול בתרופה בגלל העלת הסיכון לזקק לכבד.

### הריון והנקה

אם אתה בהריון או מיקה היועץ ברופא לפני תחילת השימוש.

### שימוש בילדים

תרופה זו מיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל 6 שנים, ראה טעיף 3.

על ההורים לחזות לרופא המטפל על כל תופעות הלואי וכל תרופה נוספת הניתנת לילד.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

- עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
- הנערד הוראה אחרת מהרופא. המינון המקובל בדרך כלל הוא:
- מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה: 1-2 קפלויות כל 4-6 שעות לפי הצורך.
- אין לעבור על מינון של 8 קפלויות לימור.

ילדים בגיל 6-9 שנים: ½ קפליה כל 4-6 שעות לפי הצורך. אין לעבור על מינון של 3 קפלויות ליממה (1.5 גרם).

ילדים בגיל 12-9 שנים: 1-½ קפליה כל 4-6 שעות לפי הצורך. אין לעבור על מינון של 4 קפלויות ליממה (2 גרם).

אין לתת קפליה זו לילדים מתחת לגיל 6 שנים.

אין לעבור על המנה המומלצת על ידי הרופא או הרוקח. יש לבלוע את התרופה עם מים. מותר לחצות או לכתוש.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** או אם יש לבלוע את התרופה עם מים. מותר לחצות או לכתוש.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** או אם יש לבלוע את התרופה עם מים. מותר לחצות או לכתוש.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** או אם יש לבלוע את התרופה עם מים. מותר לחצות או לכתוש.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם יש לבלוע את התרופה עם מים. מותר לחצות או לכתוש.

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדקסמול עלול לגרום לתופעות לוואי כגון סחרחורת בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. תופעות הלוואי עלולות להיות חמורות יותר בקשישים.

### 5. תופעות לוואי חמורות: ישימוש בתרופה או השימוש ולפנות מיד לרופא בהופעת:

סימנים של אלרגיה כגון: פריחה, גרוד בעור המלווה לעיתים בהתנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון ושריר, עיניים, לגרום לקשיש נישמון/קוצר נשימה, התנפחות הגפיים.

פראצטמול יכול לגרום במקרים נדירים, להופעת מחלות עור חריפות שהסימנים שלהן יכולים להיות: אודם, פריחה, שלפוחיות, כיבים בפה, קילוף העור, פגיעה עורית נרחבת. תופעות לואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול ללא גבגב. סימנים של שנייים במערכת הדם כגון: נטייה לדומימים, ששפי' דם בלתי מוסברים, התפתחות דלקות ביתר קלות.

- בחילה, ירידה פתאומית במשקל, תאבון ירוד והצהבה של העור והעיניים.
- תופעות לואי הנובעות ממינון יתר (ראה טעיף 6) "אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר".
- אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לואי שפאל אתה הזכרה בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.

### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע מפורשת מהרופא!

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו הווש.

באריזת בקבוק, ניתן להשתמש בתרופה לאחר פתיחתה עד לתאריך התפוגה המצויין על גבי האריזה.

**הנאי אחסון:**  
יש לאחסן מתחת ל-25°C.

אחסן באריזה המוקרית.

### 6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Povidone, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate.

Coating: Hypromellose, Macrogol, Titanium dioxide, Carnauba wax.

Pigments: E-104, E-110

כל קפליה מכילה כ- 0.3 מ"ג נתרן.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**  
קפליה מוארכת בצבע צהוב עם קו חציה בשני הצדדים.

גדלי אריזה מואשרים:  
1000, 100, 64, 56, 50, 32, 20, 16, 10, 8.

קפלויות עבור התרופה הארוזה במגשיות.

עבור אריזת הבקבוק: 50 קפלויות. ייתכן שלא כל גדלי האריזה משוקים.

יצון ובעל רישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור-עקיבא 3060000. "שרא".

**עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות**

ב-2013/11/11.

**מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

039 64 25921 00

**לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בשלשון זכר. על אף זאת, התרופה והמידע בעלון מיועדים לזני שני מינים.**

**דקססל® בע"מ**

רח' דקסל 1, אור-עקיבא 3060000, ישראל