

דקסמל[®], קפליות

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תק Shir)
בתרופת משועגת ללא מושך רופא

בררבָר: רל גפלֶה מְבוֹלָה:

פרק כב. כר. קפ"ה מיל' 500 מ"ג

Paracetamol 500 mg

כשומת בתרבויות

ပုဂ္ဂန်

U 11X1 -

קרא בעיון את העלון

תשתחמש בתורופה. עלון זה מכיל מידע מצוי על התורופה. אם יש לך שאלות

מראות זו ייחום ללא אוצר במרחץ רופא

ומיעודת למוגרים ולילדים מעל גיל 6 בלבד.

מתחת לגיל זה יש להשתמש בצורות מתן המידות לילדים. עלייר להשתמש בה בצורה נרחבת, בשושך, ברכזאץ או ברכזק אם גיבג

יש לנו למסור את החלטתנו מושב ונטר.

מ- 3 ימים או אם סימני המחלת מחרימות או לא משתפרות לאחר 3 ימים למשך

השימוש בתרכופה או בכל מצב שבו מופיעים תסמים חדשים.

דקססמל מיועד לשיכון כאבים והורדת

חום הנגרמים מסיבות שונות כגון כאבי ראש, כאבי שיניים, חטננות, שפעת,

קבוצה רפואיית: קבוצה של רפואיים (ראומטיטים) וכאבי מוחזק.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בת蘿פה אם:

■ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש

- לפני הטיפול בדקסטול, ספר לרופא אם: גורם חסילן נר, קבלת גאנז מסלול גאנזוליטי

- והן שוכן או שבון גבעון מארכיזיטם, צהבת, ליקוי בתפקידו הכביד או בתפקידו במלון/מערכת גשטו

- הנר רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.

- אתה סובל מודלקת פרקים ונאלץ ליטול משככי כאב בכל יום.

- אין להשתמש בתהופה זו לעיתים קרובות בלבד להוויע ברופא.

- הימנע מלכךות מנגן גבוה (אך אף בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.
- בתקבושה אכלי פראגוטומיל בשליל לירכוט

- הונפקו מכרזים למכירת ציוד וגוון
לנזק בכבד במרקירים אלה: ניתן במינו
గורם מהותי או לתזוזה ממושחת

שתיית משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול, או כשןוטלים תרופות נוספת

- אין ליטול תרופות נוספת להורדת חום המשפיעות על פעילות הגוף.