

ДЕКСАМОЛЬ, Каплеты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986

Препарат отпускается без рецепта врача

Состав: Каждая каплета содержит:

Парацетамол 500 мг (Paracetamol 500 mg)

Список вспомогательных веществ в препарате – см. раздел 6.

Внимательно и полностью прочтите данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту.

Данный препарат отпускается без рецепта врача и предназначен для взрослых и детей только старше 6 лет, младше этого возраста следует применять в лекарственных формах, предназначенных для детей. Правильно применяйте препарат. Посоветуйтесь с врачом или фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации.

Обратитесь к врачу, если повышенная температура сохраняется более 3-х дней, или если признаки болезни усугубляются или не прекращаются после 3-х дней, несмотря на прием препарата, или в любом случае, когда возникают новые симптомы.

1. Для чего предназначен препарат?

Дексамоль предназначен для облегчения болей и понижения температуры, вызванных различными причинами, такими, как головные боли, зубные боли, простуда, грипп, ревматические боли и менингитальные боли.

Фармакологическая группа:

Аналгетик и жаропонижающее средство.

2. Перед началом применения препарата

Не примените препарат, если:

У Вас имеется повышенная чувствительность к парацетамолу или к любому другому ингредиенту, содержащемуся в препарате.

1. Особые предостережения относительно применения препарата:

- Перед началом применения Дексамоля сообщите врачу, если:
 - Вы страдаете или страдали в прошлом алкоголизмом, желтухой, нарушением функции печени или функции почек/мочевыводящей системы.
 - У вас имеется повышенная чувствительность к какому-либо лекарственному продукту или к какому-либо лекарственному препарату.
 - Вы страдаете артритом и нуждаетесь в каждом дневном приеме анальгетиков.

- Не примените данный препарат часто без консультации врача.
- Избегайте приема больших (даже в рекомендованных пределах) доз данного препарата в период снаряжения поста.

- Препарат содержит парацетамол, который может привести к поражению печени в следующих случаях: при применении в дозе, выше рекомендуемой, или в течение продолжительного периода, употреблении

алкогольных напитков в период приема препарата, или при приеме дополнительных препаратов, влияющих на функцию печени.

- Не принимайте дополнительные жаропонижающие и болеутоляющие препараты или противопростудные препараты, не проанализировавшиеся с врачом или фармацевтом – во избежание передозировки/отравления парацетамолом.
- Не принимайте дополнительные препараты из семейства "Дексамоль," или дополнительные препараты, содержащие парацетамол.
- Если в прошлом у Вас были кожные побочные явления, как следствие приема препаратов, содержащих парацетамол, не принимайте препараты, содержащие парацетамол, во избежание возникновения повторных тяжелых поражений кожи.

1. Если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. В особенности, следует поставить в известность врача или фармацевта, если Вы принимаете:

- Антикоагулянты (такие, как варфарин).
- Препараты, стимулирующие активность печеночных ферментов, такие, как барбитураты, фениотицин или карбамазепин (применяемые, в основном, при эpileпсии, судорогах и психиатрических проблемах), рифампицин (антибиотик), пробенеид (для лечения подагры).
- Аспирин или другие салицилаты, дополнительные препараты, обладающие обезболивающим или жаропонижающим действием, и нестероидные противовоспалительные препараты.
- Метоклопрамид или домперидон (для лечения тошноты, рвот и других желудочных проблем) и холестирамин (для снижения избытка липидов в крови).
- Не принимайте данный препарат вместе с другими препаратами, содержащими парацетамол (если Вы не уверены, что принимаемый Вами препарат содержит парацетамол, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом).

1. Прием Дексамоля и потребление алкоголя

Не употребляйте алкогольные напитки в период приема препарата из-за повышения риска поражения печени.

1. Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, проанализируйтесь с врачом перед началом применения препарата.

1. Прием препарата детьми

Данный препарат предназначен для взрослых и детей старше 6 лет, см. раздел 3. Родителям следует сообщить лечащему врачу обо всех побочных явлениях и о любом дополнительном препарате, который получает ребенок.

3. Каким образом применяют препарат?

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если Вы не уверены. При отсутствии других указаний врача, обычная доза, как правило:

Взрослые и дети от 12 лет и старше: 1-2 каплеты каждого 4-6 часов, по мере необходимости. Не превышайте дозу в 8 капле в течение суток. Дети в возрасте 6-9 лет: ½ каплеты каждые 4-6 часов, по мере необходимости. Не превышайте дозу в 3 каплеты в течение суток (1,5 грамма). Дети в возрасте 9-12 лет: ¼-1 каплета каждые 4-6 часов, по мере необходимости. Не превышайте дозу в 4 каплеты в течение суток (2 грамма). Не давайте данную каплету детям младше 6 лет. Не превышайте дозу, рекомендованную врачом или фармацевтом.

Проложите препарат с водой. Можно разделить на две или растолочь.

Если Вы случайно применили избыточную дозу, или если ребенок случайно проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата! Не выливайте ровно без получения точных указаний врача! Даже при хорошем самочувствии немедленное лечение необходимо из-за риска развития тяжелого поражения печени.

Возможные побочные явления, такие, как: диарея, чрезмерная потливость, снижение аппетита, тошнота или рвоты, спазмы или боли в животе, вздутие, боль или чувствительность в верхней части живота, могут не отражать тяжелых поражений печени.

Не принимайте препараты в темноте! Каждый раз при приеме препарата проверяйте этикетку и дозировку. В случае необходимости пользуйтесь очками.

4. Побочные явления

Как и при лечении любым препаратом, применение Дексамола может вызывать побочные явления, такие, как головокружение, укус паразитов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них. Побочные явления могут быть тяжелее у пожилых людей.

Тяжелые побочные явления:

Прекратите применение и немедленно обратитесь к врачу, если развиваются:

- Признаки аллергии, такие, как: сыпь, кожный зуд, иногда сопровождающийся отеком лица, гус. языка, горла, которые могут вызвать затруднения дыхания/одышку, отек конечностей.

- Парацетамолом в редких случаях может привести к возникновению тяжелых кожных заболеваний, признаками которых могут быть: покраснение, сыпь, волдыри, язвы во рту, шелушение кожи, обширное

повреждение кожи.

Тяжелые кожные побочные явления могут возникнуть, даже, если у Вас не было никаких проблем в прошлом при приеме препаратов, содержащих активное вещество парацетамол.

• Признаки изменений в системе кроветворения, такие, как: склонность к кровотечениям, необычные кровоподтеки, повышенная склонность к развитию воспалений.

• Тоннота, быстрая потеря веса, снижение аппетита и похудение кости и глаз.

• Побочные явления, возникающие при передозировке (см. раздел "Если Вы случайно применили избыточную дозу"). Если одно из побочных явлений становится более выраженным, или Вы страдаете от побочного явления, не упомянутого в инструкции, Вам следует посоветоваться с врачом.

5. Как следует хранить препарат?

Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Не высыпайте ровно без получения точных указаний врача!

Не применяйте препарат после истечения срока его годности (exp. date), если указан на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Условия хранения:

Хранить при температуре ниже + 25°C.

Хранить в оригинальной упаковке.

6. Дополнительная информация

В дополнение к активному веществу, препарат также содержит: Povidone, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate.

Coating: Hydroxypropylcellulose, Macrogol, Titanium dioxide, Carnauba wax.

Pigments: E-104, E-110

Каждая каплета содержит 0,3 мг натрия.

Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки:

Удлиненная каплета желтого цвета, с разделительной бороздкой с двух сторон.

Утвержденные размеры упаковок:

8, 16 каплет препарата в blisterных упаковках. Возможно, что не все размеры упаковок имеются в продаже.

Производитель и владелец лицензии: Дексель Ltd., ул. Дексель 1, Ор-Акива 3060000, Израиль
Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения в 1/2013.
Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства здравоохранения: 039 64 25921 00

ДЕКСЕЛЬ LTD.

Улица Дексель 1, Ор-Акива 3060000, Израиль