

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986.

התרופה משווקת ללא מרשם רופא
לכל קפליה מכילה:
פראצטמול 500 מ"ג
פסאודופדרין הידוכלוריד 25 מ"ג
Paracetamol 500 mg
Pseudoephedrine HCl 25 mg

רשמת המרפאים הבולתי פעילים בתכשיר –
ראה סעיף 6.

קרא בינון את העלון וע סופו טרם
שתמשם בתרופה. עלון זה כולל מידע
הנצטיע על התרופה. אם יש לך שאלות
נספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא
ומיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל 6 בלבד,
מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. עליו
לשתמשם בה בצורה נכונה. היעוץ הרפואי עליו
ברוקח אם היקר זקוק למידע נוסף.
יש לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3
ימים או אם סימני המחלה מתחילים או יש
משפטים נוספים לאחר 3 ימים למרות השימוש
בתרופה או בכל מצב, שבו מופיעים תסמינים
חדשים.

1. למה מיועדת התרופה?

להקלה בתסמונתם של הצטננות ובדם באף
המלווים בחום אביבאכסי - לטיפול ביום.

הקבוצה תרפויטית:

- פראצטמול: משכך כאבים ומוריד חום.
- פסאודופדרין הידוכלוריד: אופן
- סימפטומטי המקל על זלז, גודש באף.
- דואוקינים, הועדטת הענות מלווה בסימפטום.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- היקר בהריון או במיכה.
- היקר ריש לחומרים הפעילים (פראצטמול
- או פסאודופדרין), או למגיד גודש אחיים
- או לאלו מרפאים התחנה אחיים.
- היקר מטפל בו זמנית בתרופות המכילות
- התרופה, מכיבי מנוממים אוקסיאז
- MAOIs (למשל לטיפול בדיכאון) או בתוך
- 14 יום מהפסקת הטיפול בתוך מגיד גודש
- אחיים; חוסמי בטא (למשל לטיפול
- בבעיות לב או יתר לחץ דם).
- אין להשתמש בתכשיר זה בו זמנית עם
- התרופות אחיים המכילים פראצטמול (אם
- ישן בטוח שהרופא שחקר טוטי מכילה
- פראצטמול, היעוץ ברופא אל הרוקח).
- היקר סובל מהחלת הבאות. יתר לחץ
- דם, חמור, מחלת לב או כלי דם, מחור,
- המורה של הכבד או הליבות. פעילות יתר
- של בלוטת התריס (תיוריד), לחץ תוך
- עיני גבוה (גלאוקומה) או סוכרת.

אזהרות מיוחדות המנוגות לשימוש בתרופה:

- לפני הטיפול בפראמול אף לטיפול
- ביום ספר לרופא אם:

בבחילה, הקאות ובעיות קיבה (אחרות),
מוליטיסטיס (להפתחת רמת המוליטורל
בדם), תרופות הולכות לגורם ליושב
בפה, גלולות למניעת הריון, אוקסיטוצין
• לידות ידה ועצרת דיומו יתר לאחר לידה).
אחיים המכילים פראצטמול, מגיד גודש
אחיים, חוסמי בטא, מכיבי מנוממים
או MAOIs (ראה גם סעיף 1.1)
להשתמש בתרופה אם.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
אין לשתות משקאות אלכוהוליים בתקופת
הטיפול בתרופה בגלל הגדלת הסיכון לחק
לכבד.

הריון והנקה:
אין להשתמש בתרופה כאשר היקר בהריון או
במיכה.

שימוש בילדים:
תרופה זו מיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל
6 שנים בלבד, ראה סעיף 3.
ליועץ לרווח לרופא המטפל על כל
התופעות הלוואות וכל תרופה נוספת הניתנת
לידם.

3. כיצד שתמשם בתרופה?
עליו לבדוק עם הרופא או הרוקח אם היקר בטוח.

**1. הבעדר הוראה אחרת מרופא, המינון
המקובל בדרך כלל הוא:**
מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: 1-2
קפלויות כל 4-6 שעות, עד 4 פעמים ביום.
ילדים מגיל 10-12 שנים: 1
קפליה כל 4-6
שעות, עד 4 פעמים ביום.
ילדים מגיל 9-10 שנים: 1/2
קפליה כל 4-6
שעות, עד 4 פעמים ביום.

בשימוש המקובל בפראמול אף לטיפול בבילה
יש להחליף מנה של פראמול אף לטיפול
ביום במנה של פראמול אף לטיפול בבילה,
ולא לטויל אותה תכופות על מנת המקסימלי
לעל על פראמול אף לטיפול ביום.

המתן לפחות 4 שעות בין נטילת מנה אחת לבאה.

**אין לטבוע על המנה המומלצת ע"ה רופא
או הרוקח.**

יש לבלוע את התרופה עם מים. מותר לחצות
או לתכוש.

**אם נטלת תרופה מינון גבוה יותר או אם
בטעות בלע ידן למך התרופה, פנה מיד לרופא
או לחדר מינון של בית חולים, והבא אריות
התרופה איתך! אין לגרומם להקפא ללא
הוראה מפורשת מרופא! גם אם הגרשך
טובה, טיפול מחדש יתחיל. בגלל סיכון
ההפתחות חק ממוגד לכבד.**

עלולות להופיע תופעות לוואי כגון: שלשול,
הזעה מגוברת, תאבון ירוד, בחילה או כאש

הקאות, דלקת חריפה בבלב, שויות או
כאבי בטן. נפחות, כאב או רגשות אחרת
עליוה, וייתכן וכן לא משקפות את התובל לכבד.

4. תופעות לוואי:
כמו בכל תרופה, השימוש בפראמול אף
לטיפול ביום עלול לגרום לתופעות לוואי
בהלק מופשטמשמים. אל תיבהר למקרא
רשימת התופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול במגן
אחת מןן.

תופעות הלוואי עלולות לחמרות יתר
בקשישים.

תופעות לוואי חמורות:
יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות
מיד לרופא הבנופיע:
סימנים של ארגיה כגון: פריחה, גרוד
בעור המלווה ליעינים, התנפחות של
הפינים, השפתיים, הלשון, הגרון ואשר
עליוס לגרומ קלטישי נשימה/קוצר נשימה,
התנפחות הפגיים.
• פראצטמול יכול לגרומ בקרמייס דמוים,
להופעת מחלות עור חריפות בסימנים
שלחן יסיוס לחיות. אודם, פריחה,
שלפוחית, כיכס בפה, קילוף העור,
פיגוע עורית נרחבת.

3. כיצד נראית התרופה ומה היא האריזה:
קפליה מוכרת בצבע ירוק עם קו חציה
בשני הגודים.
ללא אריזה מילה 20, 24, 30, 50
100 קפלויות באריות מגושת.
יתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים.

משוקה לבידוע ע"י: סופר פארם
(ישראל), בע"מ. ת.ד. 2171, הרצליה
4672516

היצרן ובעל הרישום: דקסל בע"מ
רח דקסל 1, או-קעבא 306000,
ישראל

**מספר רישום התרופה בפנקס
התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**
127 93 30767 00

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד
הבריאות ב-04/2014.

לשם הפטנט ולהקלת הקריאה, עלון זה
נוסח בשלש זכר. על אף זאת, התרופים
הומידיע בעלון מיועדים לבני שני המינים.

תופעות לוואי נוספות:
כאב ראש, חילות רעים, תחושת מתח,
תחושת הרגשות יתר.

אחת מתופעות הלוואי חמורות, או כאשר
אחה סובל ממופעת לוואי שלא הזכרנה
בעלון, עליו להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת
יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם
של ילדים ואלו זניקות ועל ידי כך תמנע
הרעלה. אל תגרומ להקאה ללא הוראה
מפורשת מרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך
התפוגה (exp. date). המופיע על גבי
האריזה. אחרי תאריך התפוגה מתייחס ליום
האחרון של תארו חודש
אין לאחסן מעל ל- 25°C.
אחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף
נוסף על החומרים הפעילים,
התרופה מכילה גם:

Povidone, Croscarmellose sodium,
Hydroxypropyl, Magnesium stearate,
Titanium dioxide E171, Macrogol,
Quinoline yellow aluminium lake
E-104, FD&C blue no.1 aluminium lake
E-133, Silica colloidal anhydrous,
FD&C yellow no.6 aluminium lake
E-110, Camaruba wax.