

كلسيليس أقراص

المواد الفعالة

كل فرس يحتوي

ديباسيلك صوديوم فوسفات ٢٨٥ ملخ

Dibasic sodium phosphate 285 mg

مونيباسيك بورتاسيروم فوسفات ٦٠٢ ملخ

Monobasic potassium phosphate 602 mg

المواد غير الفعالة في المستحضر - انظر القراءة ٧

اقرء النشرة بتمعن حتى تهابتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك استشارة طبية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعلمي للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حاليم الطيبة مشابهة حالتك.

(١) لأي غرض مخصوص الدواء؟

لعلاج ووقاية من حصى أو كسلات في الكثلا.

القصيلة العلاجية: مستحضر على أساس معدني

(٢) قبل استعمال الدواء

☒ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الergicي) للمواد الفعالة أو وكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.
- كنت تعاني من خلل شديد في الأداء الوظيفي الكثلا. من فرم فوسفات الدم، من التحصين الرياني

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً أي ملأم أو لاي دواء، عليك بإبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.
- أثناء فترة العلاج بهذا الدواء يجب إجراء فحوصات لملايات الوظيفي الكثلا. تسبب الكالسيوم والمواد الفعالة في الدم.

☒ قبل العلاج بـ كلسيليس إحدى للطبيب إذا:

- كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.
- كنت تعاني من خلل في الماضي من خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية.
- التهد. الكثلا /جهاز البول، الغدة الدرقية (thyroid). من نسبة مرتفعة للصوديوم في الدم، اضطرابات في الغضلات، التكساح، إنهااب، البكرياس، فسورة في الغدة التائية، حرقة حدية أو من تهافت خطير، أو إذا كنت متضاة الحمية قفيرة أو حالية من الصوديوم.

- ☒ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرأ، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأصناف عذائية، إحدى للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخضر إذا كنت تتناول:

• أسيبيرين ومسبيبلات

• مستحضرات تحتوي على البوتاسيوم وبدائل الملح

• مستحضرات مضادة للإنزيم لاستيقروفيتية

• دووية لخفض سلطة الدم وادوية للقلب، بما ذلك مدرات بولية

• كورتيكosteroidات

• سيلكلاسيوريين (القلب)

• بيهوكسجين (القلب)

• دووية تحتوي على صوديوم أو فوسفات، أملاح الكالسيوم، الومنيوم وفينزيريوم مثل

مضادات المجموعة

• هبارين.

☒ الحمل والإرضاع إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الأدوية.

- * يحتوي المستحضر على صوديوم. يحتوي كل قرص تقريباً على ٤٠ ملخ صوديوم.

٣) كيفية استعمال الدواء؟

يجب الاستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً.

طبلة الاستهلاك من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون ولائتاً طبلة الاستهلاك من الطبيب فقط.

* الدرجة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

يجب بلع الدواء مع الماء.

يمكن شرب أو سحق الأقراص حالاً قبل بلعها. لا يجوز شربهن أقراص ثم شطرها أو سحقها.

أثناء فترة العلاج من الجرائز أن يتم توجيهك أيضاً من إجراء فحوص لوظيفة الكثلا، تسبب

الكالسيوم والمواد الفعالة في الدم.

إذا شارلت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع مبلغ بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو الشرب من الماء كل ساعة.

* كيف تستطيع المساعدة في تجاه العلاج؟ يجب الإكثار من الشرب أثناء العلاج (كأس

من الماء كل ساعة).

* لا تتناول الأدوية في القمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية

في كل مرة تتناول فيها دوا، ضع المفارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أستهلاك إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استخدام كلسيليس قد يسبب اعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تنتهي من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز إلا تعيين أي منها.

يجب التوقف عن الاستهلاك وزيارة الطبيب حالاً إذا ظهرت إحدى الأعراض الجانبية التالية: إفراقة الرجال، إرهاق، إفراقة سلطة الدم، شعف الأطراف، إرهاق

أو ضعف متزايد، إفراقة في التبول (أعراض نادرة).

أعراض جانبية إضافية: ثبتان، درار، الم في البطن، عدم إنكراش.

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعيين من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

* يتجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال /أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتشمم.

* لا يجوز استعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظرف المضافة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهور.

* شروط التخزين: يجب تخزين دون ٢٥ درجة مئوية. فترة الصلاحية بعد فتح الدواء - شهر.

٦) معلومات إضافية

* يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً: powder cellulose, povidone, Eudragit, magnesium stearate, silicon dioxide, castor oil, talc.

* كل قرص يحتوي تقريباً على ٤٠ ملخ صوديوم.

* كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة - قليلة تحتوي على ٢٠٠ قرصاً بلون أبيض.

* صاحب الميكان: المتنبج وعنهاته: سام، أون. م. ض، شارع هاغالودا، ٢٥، بات، يام.

* آب ٢٠١٤ - ٢٠١٤

* رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٤٢٦٦٢٢٦١٤٢

* من أجل سلامة وتهور القراءة، تتم صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا البنين.