

3. כיצד תשתמש בתורופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.
עליך לבדוק אם הרופא מס אירך בסוטה.
* המופיע ואפונן בטבליות קיברנו על ידי הרופא בלבד.
אין לעבורי על המנה המומלצת.
יש לשלוח תờ התרופה עם מים.
נתון לצעות או לכחות את הסבלות מיד לפני בלעטה, אין לאחוט.
סבלות חמימות או כותשות.

בדיקות ומעקב
בתיקופת הטיפול יתכן ותוגנה גם לבדוקות תפקוד הכליות, רמות סיכון ורשותם. בסיום טיפול יתרכז על מין התרופה, פונה מידי לרופא ולזרר שיקן של בית חולים וגאגה אריזת התרופה אירך. אל תגרום להקה לאלה הרואה מפרשות מהרופא.
יש להזכיר מחלת עצבן עליון או מחלת מוח ששולט על ידי הרופא.
גם אם יש שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתורופה ללא התיעצויות עם הרופא או הרוקט.
* כל שעה במהלך הטיפול.
* אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית והמינה **בכל פעם** שהן נקבעו על ידי הרופאה או הרוקט.
אם יש לך שאלות נוספת ב绷גועו של שימוש בתורופה, היועץ ברופא או ברוקט.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקלאזילס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמטופלים. אל ת.tableת למלקרא רישיות תופעות הלוואה. יתכן ולא תסבול טען מוחה.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מתחממות גבים, עייפות או חולשה וובברת, ריריה במוחן שמן (דרירות).
תופעות לוואי נוספות: כאב בטן, כאב שריר, כאב מפשעת או כאב מוחה.
אם אתה מתבונן בלוווי מוחה, עילך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התורופה?

* גרען והרעלת התורופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקומות סגור מחוץ להשג ידים של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנעו הרעלת.
* אין להשתמש בתרופה אחר תאריך התוקפה (date) המופיע על גב התוויתת תאריך התוקפה ומתייחס ליום האחרון של אותו תאריך.
* תגיאי אחסון: אחסון בסטריאורה המכונה מ- 25°C. חזי מודר לאחר פתיחה - חושן ימי.

6. מידע נוסף

* מנגנון הורעלת התורופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקומות סגור מחוץ להשג ידים של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנעו הרעלת לבנות.
* אין להריעם, הריצין וכותבונו: סמ-אורם, ריח' והגבונה, בט-ים.
* עלון זה נבדק ואנשר ע"י משרד הבריאות בתאריך: אוגוסט 2014.
* מס' מרפר ורשום התורופה בפנקס התרופות הסטטוטרי במשרד הבריאות:
0462923142
* לשם הפשרות ולתקלת הקראיה, עלון זה נסמך בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מוגנת לבני שני המינים.

עלון לצרכן לפחות תקנות התקנים (תקנישרים) התשמ"ז – 1986
התורופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

קלציילס טబליות

חומרים פעילים:

כל טבילה מכילה:

דיביסילק סodium phosphate 285 mg

טונגיביסילק פוסטיטים פוספט 260 mg

טומובייסילק פוסטיטים פוספט 262 mg

חומרם בלתי פעילים ברכישר - ראה טעף 6.

קרא בעין את העלון עד סופו בסוטם תשאלות בתורופה. לעון זה סכלי מודיע ממציאות על ההרופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרוקט.

תרופה זו רישומה בעורן. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להיקלח פהילו ואם ברואה לך כי מרכיב רפואי דומה.

1. למה מייעצת התורופה?

טיפול ווניבוא אביגילטס בבליה.

קובזואה תרפואית: תכשיר על בסיס מינרלים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- * אראה ונגש (אלרגיה) למורמים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הקיימים אשר מכילה התורופה.
- * הגן סובל מליקוי חמור בתפקיד הכליה, מהיופרואספסטיה, מחמצת דרכי השתן.

3. אזהרות מיוחדות הנבעות לשימוש בתרופה:
* אם אתה ברישן או מוקשן ומן לשחו או לתרופה בלבד, עילך להודיע על

כך להרפה לטפי סוליל התורופה. ||| * בתיקופת הטיפול בתרופה זו יש לעורן בדיקות תפקוד הכליות, רמות סיכון ורשותם. בدم.

B לפני הטיפול בקלאזילס ספר לרופא אם:

- * גרען בהריען או סמיקה.
- * גרען סוליל או סבלת בעבר מליקוי בתפקודו: הלב / או כל הרם, הכליה, הכליל/or/ מפרעת השתן, בלוטות הרורים (טירואיד), מחלת נתן בגובה בדם, הפרעות שריריים, ריריה במוחן שמן (דרירות), בלבוטות יותרת הכליה, כוויות קשות ואלהות השבשנות כמושה, ועוד. גרען בדיאזוט דלת ו/or חרמת נתן.

B אם אתה לא רפואי, או אם לך לתקחת לארכונגה, תרומות אחרות כולל תרופות שלא רפואי וטנספי תיזונה, ספר עילך לרופא או לרוקט.

במיוחד שי לידע את הרופא או הרוקט אם אתה לא רפואי:

- * אספיזון וולדיזיליטים
 - * תכשירים טטיללים אשגן ותולפי מלחה
 - * תכשירים אנטיס ולקטטים שאוראים אינטראקציות
 - * קורטיזוקוסטורואידים
 - * ציקלוסטטוקסיז (לשתות)
 - * דיזוגסטון (ללב)
 - * תרופות מוכילות נתן או פוספט, מלחים של סידן, אלומיניום ווגאנטים כגון סורקי וומבה
 - * הפרין
- B הרין ונגקה אם הגן בהרין או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופות.**
- C התכשיר מכיל נתן, כל טבילה מכילה כ- 96 מ"ג נתן.**