

Amoxykel 70 • 70

Soluble Powder - Veterinary • וטרינרי • חבוקסיקל 70

לישמוש במי השתייה

הרכב: כל 1 גרם מכיל 70 מ"ג אמוקסיצילין (כטריהידראט)

חומרים בלתי פעילים: Sodium Carbonate monohydrate, Silica Colloidal Anhydrous, Lactose Monohydrate

פעילות רפואית:

אמוקסיקל 70 אבקה מסיסה וטרינרי, מותווה לטיפול אנטיביוטי בזהומים הרגישים לאמוקסיצילין בתרנגולות כסם ובחזירים.

אמוקסיקל 70 הינה אבקה המכילה אמוקסיצילין שהוא מפיצילין סמי סינטי בעל טווח פעולה רחב. מוצר זה פותח בפרומולציה מיוחדת מסיסה במים למתן לתרנגולות כסם ולחזירים. המסת המוצר מהירה ושלמה.

קבוצה תרפויטית:

אנטיביוטיקה ממשפחת הבטא-לקטם.

מינון וצורת מתן:

בהתאם להוראות הרופא הוטרינר. המינון המקובל:

לתרנגולות כסם - במי השתייה, ריכוז סופי של אמוקסיצילין 14 מ"ג לכל ק"ג משקל, למשך 5 ימים במי שתייה.
לחזירים - ריכוז סופי של אמוקסיצילין 20-10 מ"ג לכל ק"ג משקל, למשך 4-5 ימים במי שתייה או במוזן.

אזהרות:

באם ידוע כי על גישותו יתר לפניצילין, יש להימנע מטיפול בחומר זה. יש לנקות היטב את מיכלי מי השתייה במר הטיפול, יש להכין תמיסה טרייה כל 12 שעות. בזמן הכנת התמיסה יש להימנע משאיפת האבקה ומגע של התרופה עם העור או העיניים. יש להשתמש במסכה ובכפפות. אין לעשן או לאכול בזמן ההכנה. כשיקם יש לשטוף יד העור החשוף. יש להשתמש בכפפות בעת מתן התמיסה. במקרה של מגע בעיניים או בעור יש לשטוף את העיניים היטב.

אזהרות למטפל:

כלל יתר המפיצילינים, אמוקסיצילין עלול לגרום לתופעות של גישות יתר ולכן אין לגעת בתכשיר אם ידוע כי אתה רגיש לפניצילינים (או לאצלוספרוינים). יש להתקשר מיידית לרופא במקרה של נפיחות בכפים, שפמים או עיניים, קשיי נשימה או נזירי בעור.

התוויות נגד:

השימוש בתכשיר זה אסור בחיות בעלי עבר של תגובה אלרגית ל- מפיצילין, אין להשתמש כנגד מיקרואורגניזמים בעלי פעילות בטא-לקטאמאז. אם מתפתחים ירידומים משניים כגון כטריות יש לשנות את הטיפול. לא לשימוש במטילות לזריחת אדם.

תופעות לוואי:

תופעות אלרגיות יכולות להיפתח, המרעות במערכת העיכול עלולות לקרות.

תגובות בין - תרופתיות:

אין להשתמש יחד עם חומרים אנטיביוטיים בקטרוסטטיים נוספים כגון: טטראציקלינים, מקרולידיים.

הוראות אחסון ושימוש:

- יש לאחסן בכמפריטורה שאינה עולה על 25°C במקום מוגן מאור.
- חיי מדף לאחר פתיחה שאינה 28 ימים.
- תקופת המזנה לפני שחיטה 1 ימים בתרנגולות ו- 2 ימים בחזירים.
- בתרנגולות, מומלץ להשתמש באמוקסיקל 70 כשיטת ההצמאה כדהלן: יש להצמיא את התרנגולות למשך כשעה עד שתיים לפני תחילת הטיפול. יש להחליף את המים המושבת של התרופה כ- 10 לטר מי שתייה. את התמיסה יש להוסיף לכמות מי שתייה הנצרכת בתרנגולות למשך שתיים וזן בחזירים למשך 12 שעות. בירתת היממה הנעק מי שתייה ללא התרופה.
- מגני שיר עם התרופה יכול לגרום ל- דרמטיטיס בעור. לבש כפפות וביגוד מנ.
- אין להשתמש בתמיסה היבוקה לאחר שעברו 12 שעות מהכנתה.
- במקרה של מגע של לטטוף במים עם סכונ.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- חייב מרשם רופא וטרינרי.

אריזה: אמוקסיקל 70 אבקה מסיסה וטרינרי, משווק באריזות של 1,000 גרם.

שם היצרן: קאלה, Hoogsterten, בלגיה.

בעל הרישום: אמ.פי.וט. בע"מ, רחוב המגשימים 20,

קריית מטרון, מתח תקווה.

היבואן: אליעזר לינבץ בע"מ, בית מסחר לתרופות,

אבן אוהד ת.ד. 2920.

מספר רישום התרופה: 140-94-92422

י"פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידי

לישמוש וטרינרי בלבד!

חייב מרשם רופא
 ملزم بوصفة طبيب
 PRESCRIPTION ONLY MEDICINE

מכיל: 1 ק"ג

AMOXKLBL 200515



Manufactured by/Fabrication:
 KELA N.V. - Sint-Lenaartseweg 48
 2320 Hoogstraten - Belgium



For veterinary use only
 A usage vétérinaire
 للاستعمال البيطري فقط