

לשימוש וטרינרי בלבד
א.ס.י.פי 47 וטרינרי
S.C.P. 47 Veterinary

אבקה מסיסה למתן במי שתיה

הרכב:

כל 1 גרם מכיל:

Sulfachloropyrazine

sodium monohydrate 470 mg

התוויות:

מניעה וטיפול בקוקסידיוזיס וכן מחלות זיהומיות הנגרמות ע"י חיידקי סלמונלה ופסטרה בתרנגולות.

מינון והגשה:

בהתאם להוראות הרופא הוטרינר.

64 גר' לכל 100 ליטר מי שתייה במשך 3 ימים רצופים. במקרים קשים אפשר להמשיך בטיפול, בהתייעצות

עם הרופא הוטרינר, במשך 3 ימים נוספים במחצית המינון. מומלץ לחזור על הטיפול לאחר הפסקה של 2-3

ימים במשך יומיים נוספים.

יש להכין מי שתייה טריים כל יום.

אזהרות:

אין להגיש ללהקות רביה או למטילות.

זמן המתנה:

יש להפסיק את הטיפול 4 ימים לפני שחיטה.

תופעות לוואי:

לעיתים עלולות להופיע תופעות של רגישות יתר.

אחסנה:

מתחת ל-25°C . Store below 25°C



מספר פריט:

מס' אצווה:

משקל אריזה: 320 גרם

ת. תפוגה:

היצרן ובעל הרישום: אביק תוצרים וטרינרים בע"מ, ת"ד 489, אזור התעשייה בית שמש

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר