

سوبرامول «م»

فتائل للأطفال

التركيز

تحتوي كلليلة على: ١٥ مل (Paracetamol)

باراسيتامول، الماء الماء غير الماء في المستحضر انظر الفقرة ١

- معلومات إضافية.

إقرأ الشارة ينبع حتى نهايتها قبل استعمالك

للدواء، تجنب هذه النشرة على معلومات موجزة

عن الدواء، إذا توفرت لديك استلهل إضافية، راجح

الطبيب أو الصيدلي.

يمكنك هذا الدواء بدون حاجة لوصفة طبيب وهو

مخصل للأطفال من عمر ٣ سنوات حتى ٦ سنوات

لتحفيض السخونة وتسهيل الألام، على مراجعة

الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من أيام أو أيام

أعراض خلاص أيام رغم استعمالك

يجب إعطاء الدواء بالشكل الصحيح، استشر الصيدلي

إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

(١) أي غرض مخصوص الدواء؟

الدواء مخصوص لتسكين الآلام وتحفيض السخونة.

القضية العلاجية: سكك الآلام وخفيف السخونة

قبل استعمال الدواء

[٤] لا يوجد لاستخدام هذا الدواء:

إذا يوجد حساسية لباراسيتامول أو أحد مركبات

الدواء الأخرى.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

إذا تطورت في المرضى لدى الطفل عراض

جامحة جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي

باراسيتامول، فلا يوجد إعطاء الطفل المستحضرات

التي تحتوي باراسيتامول، كي لا تحدث ذاتية أعراض

جلدية خطيرة.

يمكنك المستحضر على باراسيتامول الذي قد يسبب

ضرر في الكبد عندما

يعطي بقداره دوائة أعلى من الموصى بها أو لفترة

مملوءة.

عندما يتم شرب المشروبات الكحولية خلال فترة

الملاجئ.

عند تناول أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.

لا يوجد لاعادة هذا الدواء في أوقات مقاومة، بدون

استشارة الطبيب.

• لا يوجد تناول أدوية إضافية لتحفيض السخونة

أو سيدني وذلك لمنع حدوث فرط المقدار الدوائي

أو التسمم بباراسيتامول.

• لا يجوز تناول مستحضرات إضافية تحتوي

باراسيتامول.

• يجب انتظار عن تناول مقدار دوائي علي (وذلك

ضمن المدد الموصى بها) من هذا الدواء لثانية

الصوم.

• إذا كان الطفل حساساً لـ طعام أو لـ دواء، عليه

إبلاغ الطبيب بذلك قبل إعطاء الدواء.

• يجب انتظار ساعتين على الأقل قبل إعطاء مقدار

نوافل إضافي.

• على راجحة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر

من أيام أو إذا لم تزول الأعراض خلال أيام رغم

استعمال الكحول.

• إنما يمكنه أو خلا في وظائف الكبد

• يرجى تجاهز المقادير الدوائية الموصى بها.

• لا يوجد تناول المقادير الكافية قرابة الـ

استشارة الطبيب قبل مدة مصالحة، يجب

إذا كنت في حالة الحمى أو الرشوة.

طريقة الاستعمال

إذا كنت تتناولوا أو إذا تناولت مؤخرآً أدوية أخرى

بابي في الحالات التي يرتكبها بالتجزءين في اليراد ٣٠ دقيقة

تقرباً، أو يوضئها تحت ثياب من الماء البارد قبل نزع

الغلاف.

(١) كمية إدخال الفنتنة، أو، إغسل بيدك جيداً.

(٢) اغسل فتحة واحدة عن طريق الفتحة لنزع الغلاف،

و يجب غسل الناسن في الجانب المصطنع للغلاف.

(٣) ضع الملف على جاه، وادرأه المحتلة بلطف بواسطة

العصبي بفتحة داخل قمة الشرج.

(٤) إغسل بيدك جيداً بعد إدخال الفنتنة.

إن انتشار مقدار أو أقل مفترضاً فإذا بقي بداخله من

الدواء، يجب إزالته إلى الماء حتى لا يحيط بغيره الطوارئ

في المستشفى، وأحرض عليه الدواء، لا تسبب التقى

كلورامينوكسيفين، كاراملينين.

• مينوكسيدين، دوبيريدون (العلبة المثقبة).

• التقى، وساكي، ضمضة أخرى ().

• كلورامينوكسيفين (مضاد حيوى).

• بودينيس (الماء المنقى)، كاراملينين.

١. استعمال الباراسيتامول واستسلام الكحول

لا يوجد إسلام الكحول أثناء العلاج بباراسيتامول

يسبي زيارة الطوارئ لإدخال شرارة الكبد.

٢. العمل والرضاخ

إذا كنت في فترة الحمى أو مرحلة يرجح تشخيص طابع الداء

قبل بدء استعمال هذا الداء.

٣. الاستعمال لدى الأطفال

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل الأعراض الجانبي

كما يذكر دواء، إن استعمال ثالث سوبرامول «م» قد يسبب

أعراض جانبية مثل احمرار أو ألم في منطقة فتحة الشرج

عند بعض المستعملين، لا تذهب من قائمة الأعراض

الجانبية من العاجز أحادي أي منها.

أعراض جانبية خطرة.

٤. كيفية استعمال الداء؟

على الإستسپاح من الطبيب أو الصيدلي إذا تم

والآن.

• في حال ظور داء فعل تحسسية شديدة مثل مظاهر حكة، انتفاخ الرأس، الشفتين، اللسان المغمورة / أو الأطراف، والتي قد تسبب عصوبات في النفق أو في

البلع.

• الباراسيتامول قد يسبب في حالات نادرة، ظهور أمراض جلدية شديدة التي يمكن أن تكون إلجرار، حموض، حموض، ضرر جلدي واسع،

أعراض جانبية جلدية شديدة قد تظهر حتى ولو

نراوات في الماء، مستحضرات تجويي الماء العالمة باراسيتامول دون مشكل.

إذا ظهرت أمراض جانبية جلدية، يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري.

• في حال ظور علامات تقرارات في جهاز الدم مثل: آرث، دمات، نزف، تغيرات طبيعية في جهاز الدم مثل:

إنما ظهرت أحدها أمراض جانبية جلدية، أو إذا كانت متزامنة مع

عرض جانبية لم يذكر في هذه النشرة، عليه استشارة

الطبيب حالاً.

٥

كيفية تخزين الداء؟

تجنب التسمم، يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان

مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال / أو الرضع، وذلك

لتقليل اصطيدامات التسمم، لا تسبب التقى بين تقطيبات

صربية من الطبيب.

لا يوجد لاستعمال الداء بعد انتصاف تاريخ الصلاحية (exp. date)، يجب إيقاف العلاج على غرار العادة.

الصلبة إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزين دون درجة حرارة (درجة حرارة الغرفة).

٦

معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً Witepsol E76، Witepsol H15

كيف يبدو الدواء وهو محتوى العلبة.

تحتوي كل علبة على فتائل بياضوية بلون أبيض حلبي.

المنتج وصاحب الإنتاج:

اسم: أون، س، شارع معاشو، بابا، ٢٥

بطاقة، تلوك، وظيفة، رقم:

أقوت ووزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحظوظ مخصوص

وزخص في تاريخ ٢٤-١٤.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة

الصحة: ٢٥٢٢٣٨.

من أجل سوء وغلوتين القراءة تعتد صياغة هذه النشرة

بصيغة المذكر، على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصوص

لكل الجنسين.