

يسوق الدواء بدون وصفة طبية

أوپتیکروم قطرة للعينين

SANOFI

المادة الفعالة وتركيزها:

Kromoglykates sodium 2.0% w/v
Sodium cromoglycate 2.0% w/v

المواد غير الفعالة - أنظر الفقرة ٦.

اقرأ النشرة تمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلحة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

يعطي هذا الدواء بدون حاجة إلى وصفة طبية. عليك استعماله على الشكل الصحيح. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

على الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو إذا لم تتحسن بعد يومين.

احظ هذه النشرة. من الجائز أن تحتاج لقرائتها ثانية. إذا تفاقم أي عرض جانبي أو إذا ظهر عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة الرجاء مراجعة الطبيب أو الصيدلي.

(١) لأي غرض مخصص للعلاج الوقائي لكافية أنواع التهابات الملتحمة التحسسية.

الفصيلة العلاجية: تنتهي المادة الفعالة إلى فصيلة مضادات الحساسية.

٢) قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء واحد للطبيب أو الصيدلي إذا: لديك حساسية للمادة الفعالة بالدواء (كروموجليكات الصوديوم)، أو لمكونات الدواء (أنظر الفقرة ٦).

علامات رد الفعل التحسسي تتضمن: طفح، مشاكل في البلع أو في التنفس، إنفاس الشفتين، الوجه، الحنجرة، اللسان ونفاس الإحرار، الحكة أو تفاقم إنفاس العين أو الجفن.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج عليك أن تكون واثقاً من أن تبيح العينين لديك هو نتيجة التحسس. إذا لم تكون واثقاً من ذلك، عليك مراجعة الطبيب قبل بدء العلاج.

لا يجوز وضع العدسات اللاصقة الرخوة أثناء العلاج بـ أوپتیکروم قطرات للعينين. إذا لم تكون واثقاً من ذلك، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل بدء استعمال أوپتیکروم قطرات للعينين.

٣) الحال والارتفاع

إذا كنت حامل، من الجائز أن تصبحي حامل أو تعتقددين أنه يمكن أن تكوني حامل، أو إذا كنت مريضة أو تخططين للارتفاع، فلا يجوز استعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج.

٤) السياقة واستعمال الماكينات

من الجائز أن يحدث تشوش في الرؤية وتبيح موضع في العين حالاً بعد استعمال الدواء في هذه الحالة، لا يجوز السياقة أو تشغيل ماكينات خطرة حتى تختفي الرؤية.

٥) معلومات هامة عن بعض مركيبات الدواء

أوپتیکروم قطرات للعينين تحتوي على بنزـالكـونـومـوكـورـاـيدـ. هذه المادة قد تسبب تبيح العينين وتؤدي لتغيير لون العدسات اللاصقة.

٦) كيفية استعمال الدواء؟

عليك الاستفاض من على الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون واثقاً. المقدار الدوائي الأعتيادي هو عادة: قطرة - قطرتين في كل عين، ٤ مرات في اليوم بفواصل محددة أو حسب توصيات الطبيب.

يجب استعمال أوپتیکروم قطرات للعينين بشكل منتظم لتامين العلاج الأفضل بأعراض الاتهاب التحسسي.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به. لا يجوز البلع. لـاستـعـالـمـالـخـارـجـيـ فقطـ.

طريقة استعمال المستحضر - تعليمات عامة: (أ) لتجنب حدوث تلوث، لا يجوز أن يلامس طرف القبضة بأي مسطح (بما في ذلك العين ذاتها). يجب حفظ القبضة مغلقة بآحكام.

(ب) من الجائز الاتكـونـالـتـكـونـةـ مـلـيـةـ: خـصـصـهـاـ الـأـمـرـ لـتـمـكـنـ السـيـطـرـةـ على وـتـيـرـةـ التـقـيـقـ بشـكـلـ أـفـضـلـ.

(ج) كيفية استعمال قطرات: ١- إغسل يديك جيداً.

٢- إستعمل المرأة لتساعدك على رؤية ما تفعله.

٣- جفف عينيك بجدر بواسطة منديل وانزع غطاء القبضة.

٤- أبعد قليلاً الجفن السفلي عن العين بواسطة السبابية. قم بتنقيط قطرة - قطرتين لداخل الفجوة المتشكلة

بـجـدـرـ إـحـرـصـ عـلـىـ الـأـلـامـسـ بـوـهـةـ القـبـنـيـةـ العـيـنـ.

٥- حـرـ الجـفـنـ السـفـلـيـ وـقـمـ بـوـمـضـ عـيـنـكـ عـدـةـ مـرـاتـ لـتـامـيـنـ تـوزـيـعـ كـامـلـ السـاسـالـ فـيـ العـيـنـ.

٦- يـحـ مـعاـوـدـهـ الـحـطـوـاتـ ٤ـ وـ ٥ـ فـيـ العـيـنـ الثـانـيـةـ أـيـضـاـ،ـ إـذـ دـعـتـ الـحـاجـةـ.

٧- لـتـجـبـ تـلـوـثـ المـحـلـولـ إـحـرـصـ عـلـىـ الـأـلـامـسـ طـرـفـ القـبـنـيـةـ بـأـيـ مـسـطـحـ،ـ بـمـاـ فـيـ ذـلـكـ الإـصـبـعـ أـوـ العـيـنـ،ـ وـأـلـقـ القـبـنـيـةـ بـآـحـكـامـ.



د. بعد إستعمال الدواء، إغسل يديك جيداً لتنظيفها من بقايا الدواء.

هـ. لمن تشتري التلوث، لا يجوز إستعمال نفس القنبلة من الدواء لأكثر من شخص واحد.

فتنة العلاج:

إذا تفاصم وضع عينك أو لم يتحسن بعد يومين من إستعمال قطرات العينين، الرجاء مراجعة الطبيب أو الصيدلي.

لا يجوز إستعمال أوتيكيروم قطرات للعينين أكثر من ثلاثة أشهر متالية بدون استشارة طبيب.

إذا كان الدواء يستعمل بتعليمات من طبيب، عليك إنتمال العلاج كما أوصيتك قبله.

لا يجوز إستعمال المستحضر لأكثر من ٤ أسابيع بعد فتح القنبلة.

إذا إستعملت أوتيكيروم قطرات للعينين أكثر مما كنت بحاجته: راجع الطبيب إذا إستعملت قطرات العينين بوترة أكبر من الموصى به أو لفتره أطول من ثلاثة أشهر.

إذا دفع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت إستعمال هذا الدواء في الوقت المحدد، إستعمل قطرات حال تذكرك، ولكن، إذا تذكرت قريباً من وقت إستعمال المقدار الدوائي القاًد، فوت المقدار المنسي.

لا يجوز إستعمال مقدار مضاعف للتعويض عن المقدار المنسي.

في حال توقفك عن إستعمال الدواء:

حتى ولو طرأ تحسن على علامات المرض، يجب مواصلة إستعمال هذه قطرات إذا كنت لا تزال مازل موجود قريباً من العوامل الحساس لها.

أوتيكيروم قطرات للعينين قد تمنع حدوث رد فعل تحسسي، حيث أنه قد تزعد علامات الحساسية في حال توقفك عن العلاج.

لا يجوز تناول الأدوية في العقمة! يجب تخصيص طابع الدواء والتاكيد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا ألم ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أوتيكيروم قطرات للعينين قد يسبب أمراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية من الجائز إلا انتقامياً أي منها.

يجب توقف عن العلاج الوخز، الإحمرار أو الانتفاخ. من الجائز أنك حساساً للمستحضر.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا تفاقمت الأعراض الجانبية التالية أو إذا استمرت لأكثر من عدة أيام، أو إذا كنت تلاحظ عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة:

• وخز وحرقة في العينين أو تشوش الرؤية. هذه الأعراض من المفترض أن تستمر لفترة قصيرة فقط وأن تظهر حالاً بعد إستعمال القرطاء.

• تبيج خفيف في العينين.

٥) كافية تخزين الدواهء؟

تحجب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب القنبلة بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين بدرجة حرارة تقل عن ٣٠ درجة مئوية.

يجب التخزين في العلبة الأصلية لحمايتها من الضوء.

لا يجوز إستعمال المستحضر لأكثر من ٤ أسابيع بعد فتح القنبلة للمرة الأولى.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العلبة.

٦) معلومات إضافية

• يحتوى الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً: Benzalkonium Chloride, Disodium Edetate, Water for injection.

• كيف يبدو الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً: شفاف عديم اللون أو بدون لون فاتح جداً ضمن قنبلة ذات قطارة.

• أصحاب الإهتمام وعنوانه: سانوفي - إفتنيس إسرائيل، ٤٢٥٤٩٩٦، نتانيا، ص.ب. ٨٠٩٠.

• اسم المنتج وعنوانه: سانوفي ويتروب للصناعات، فرنسا.

• أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتها فحص ورُخص في تاريخ: تموز ٢٠١٢.

• هذه النشرة لا تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمستحضر. إذا خطر في يالك أي سؤال أو في حال عدم تمالكك من شيء ما، الرجاء مراجعة الطبيب.

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٣٤٩٢٤٦٨.

• من أجل سهولة وتبصير القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.