



520379 530376



Opticrom

חומרים בלתי פעילים - ראה טעף 6.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.**  
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. איש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא אם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר יומיים. שמור על העלון, ייתכן ותצטרך לקרוא בו שוב. אם תופעת לוואי כלשהי מחמירה או אם הפגיעה תופעת לוואי שלא מצוינת בעלון זה אנו פנה לרופא או לרוקח.

**1. למה מיועדת התרופה?**

התרופה מיועדת לטיפול מונע לכל סוגי הדלקות האלרגיות של החלמית. קבוצה תרפויטית: החומר הפעיל שייך לקבוצת נוגדי אלרגיה.

**2. לפני שימוש בתרופה:**

**❗ אין להשתמש בתרופה וספר לרופא או לרוקח אם:**  
ידועה גישות לחומר הפעיל בתרופה (סודיום כרומוגליקאט), או למרכיבי התרופה (ראה טעף 6).  
סימנים של תגובה אלרגית כוללים: פריחה, בעיות בבלעיה או בנשימה, התנפחות השפתיים, הפנים, הגרון, הלשון והחמרה של האודם, הגרד או הנפיחות של העין או העפעף.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

לפני תחילת הטיפול עליך להיות בטוח שהגירוי בעיניך הוא תוצאה מאלרגיה. אם אינך בטוח בכך, עליך לפנות לרופא לפני תחילת הטיפול.  
אין להרכיב עדשות מגע בטרם תיבדק על ידי רופא או אופטיקרום טיפות עיניים.  
אם אינך בטוח, היוועץ ברופא או ברוקח לפני התחלת השימוש באופטיקרום טיפות עיניים.

**הריון והנקה**

אין להשתמש בתרופה מבלי היוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך בהריון, ייתכן ותהי' בהריון או חושבת שאולי הנך בהריון, או אם הנך מניקה או מתכננת הנקה.

**נהיגה ושימוש במכונות**

ייתכן שטטוש ראייה וגירוי מקומי בעין מיד אחרי שימוש בתרופה. במקרה זה, אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות עד התבהרות הראייה.

**מידע חשוב על חלק הממלכתי של התרופה**

אופטיקרום טיפות עיניים מכיל בנזלוקוניום כלוריד. חומר זה עלול לגרום לגירוי בעיניים ולשינוי בצבע עדשות המגע.

**3. כיצד תשתמש בתרופה?**

עליך לבדוק עד הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. **תמינון המקובל בדרך כלל הוא:** 1-2 טיפות בכל עין, 4 פעמים ביום במרווחים קצובים או לפי מה שהורה לך הרופא. יש להשתמש באופטיקרום טיפות עיניים באופן סדיר בכדי להבטיח טיפול אופטימלי בתסמיני הדלקת האלרגית.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

אין לבלוע, לשימוש חיצוני בלבד.

**אופן השימוש בתכשיר - הוראות כלליות:**

- א. בכדי להימנע מזיהום, אין ללתת לקצה הבקבוק לגעת במשטח כלשהו (כולל העין עצמה). יש לשמור על הבקבוק סגור היטב.
- ב. ייתכן ובקבוק הטיפות אינו מלא; הדבר נועד לאפשר שליטה טובה יותר על קצב הפטפוץ.
- ג. כיצד להשתמש בטיפות:
  1. רחץ היטב את ידיך.
  2. השתמש במראה שתעזור לך לראות את מעשיך.
  3. ייבש את עיניך בהזירות בעזרת ממתחה והסר את חלק הבקבוק.
  4. בעזרת הצבע הבקבוק מעט את העפעף התחתון מהעין, לותך המרווח שנוצר פטפוץ 1-2 טיפות בהזירות.
  5. הקפד שפייח הבקבוק לא תבוא במגע עם העין.
  6. שחרר את העפעף התחתון וממנץ מספר פעמים בכדי להבטיח פיזור מלא של הנוזל בעין.
  7. יש לחזור על צעדים 4 - 1 ו- 5 עד 5 פעמים במידת הצורך.
  8. למינעית זיהום התמיסה הרוקח שקצה הבקבוק לא יבוא במגע עם משטח כלשהו, כולל הצבע או העין, וסגור את הבקבוק היטב.



ד. לאחר השימוש בתרופה, שטוף היטב את ידיך בכדי לנקות משאריות של תרופה.  
ה. בכדי להימנע מהפצת זיהום, אין להשתמש באותו בקבוק של תרופה ליותר מאדם אחד.

**משך הטיפול:**

אם מצב העיניים מחמיר או לא משתפר לאחר 2 ימי שימוש בטיפות העיניים, אנו פנה לרופא או לרוקח.  
אין להשתמש באופטיקרום טיפות עיניים יותר משלושה חודשים ברציפות ללא התייעצות עם הרופא.  
אם התרופה נלקחת בהוראת רופא, עליך להשלים את הטיפול כפי שהומלץ על-ידי.  
אין להשתמש בתכשיר יותר מ- 4 שבועות לאחר פתיחת הבקבוק.

**אם השתמשת ביותר אופטיקרום טיפות עיניים ממה שהיית צריך:**

פנה לרופא אם השתמשת בטיפות העיניים בתדירות גבוהה מהמומלץ או במשך זמן הארוך משלושה חודשים.  
אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה אתך.

**אם שכחת לטול תרופה זו בזמן הקצוב,** השתמש בטיפות מיד לכשזכרת. אולם, אם הזמן שנזכרת קרוב לזמן בו יש לקחת את המנה הבאה, דלג על המנה שנשכחה. אין לקחת מנה כפולה כפיצוי על המנה שנשכחה.

**אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:**

גם אם חל שיפור בסימני המחלה, יש להמשיך להשתמש בטיפות אלה אם אתה נמצא עדיין בסביבת הגורמים שהנך אלרגי אליהם. אופטיקרום טיפות עיניים עלול למנוע תגובה אלרגית, כך שאם תפסיק את הטיפול, סימני האלרגיה עלולים לחזור.  
אין לטול תרופה בחושך בדיקת תהויות והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.  
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

**4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש באופטיקרום טיפות עיניים עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את הטיפול בתרופה ולפנות לרופא בהקדם האפשרי אם:** העקצוץ, האודם או הנפיחות מחמירים. ייתכן והנך אלרגי לתכשיר.

**יש להיוועץ ברופא או ברוקח אם תופעות הלוואי הבאות מחמירות או נמשכות יותר ממספר ימים, או אם הנך מבחין בתופעת לוואי שאינה מצוינת בעלון זה:**

- עקצוץ וצריבה בעיניים או שטטוש ראייה. תופעות אלו אמורות להימשך רק למשך זמן קצר ולהפיע מיד לאחר השימוש בטיפות.
- גירוי קל בעין.

**5. איך לאחסן את התרופה?**

מנע הרעלה לתופעה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 30°C.

אחסן באריזה המקורית על מנת להגן מאור.

**אין להשתמש בתכשיר יותר מ- 4 שבועות לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה.**

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**6. מידע נוסף**

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Benzalkonium Chloride, Disodium Edetate, Water for injection.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: נוזל שקוף חסר צבע או בצבע צהוב בהיר מאוד בבקבוקון עד טפטפת.
- בעל הרישום וכותביו: סאנופי-אונגטי ישראל בע"מ, ת.ד. 8090, נתניה 4250499.
- שם היצרן ותכולתו: סאנופי ויונתרופ תעשיות, צרפת.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: יולי 2013.
- עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשיר. אם יש לך שאלה כלשהי או אם אינך בטוח בדבר מה, אנו פנה לרופא.
- מספר רישום התרופה בפקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 34922468.
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.