

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו במרץ 2015

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986**

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

**דורהטירס**

משחת סיכה לעיניים  
ללא חומרים משמרים

**הרכב:**  
Anhydrous liquid lanolin 30mg/g  
Mineral oil 30 mg/g  
White petrolatum ad 1g

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה בצורה הנכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (הסימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

**1. למה מיועדת התרופה?**

**פעילות רפואית:** משחת סיכה למניעת יובש בעיניים.  
**קבוצה תרפויטית:** תכשירים לעיניים.

**2. לפני שימוש בתרופה:**

אין להשתמש בתרופה אם:

- ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
- **דורהטירס** מיועד לשימוש בעיניים בלבד.
- אין להרכיב עדשות מגע בזמן השימוש בתכשיר.
- אם הינך מרגיש כאב או גירוי בעיניים, שינוי בראייה או אדמומיות מתמדת בעיניים או אם מצבך מחמיר או נמשך מעל 3 ימים- הפסק הטיפול ופנה לרופא.

**אם אתה לוקח , או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

• במידה ואתה משתמש בתכשירים אחרים המיועדים לעיניים (למשל טיפות) יש להמתין לפחות 5 דקות בין שימוש לשימוש. יש להשתמש במשחת העיניים אחרונה.

**שימוש בתרופה ומזון:**

מזון ושתייה אינם משפיעים על הטיפול.

**הריון והנקה:**

ניתן להשתמש ב**דורהטירס** בתקופת ההריון וההנקה.  
אם הינך בהריון, עומדת להיכנס להריון או אם הינך מניקה, היוועצי ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופות.

**נהיגה ושימוש במכונות:**

אם לאחר השימוש בתכשיר נגרם טשטוש ראייה, עליך לנקוט זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות, וכדומה עד שהראייה שבה ומתבהרת.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה כפי שמפורט בעלון זה, אלא אם כן הרופא הורה אחרת. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

אם הרופא רשם לך **דורהטירס** הוא יורה לך במשך כמה זמן להשתמש בתרופה. **אל תפסיק את הטיפול מוקדם.**

המינון המקובל בדרך כלל הוא מריחת כמות קטנה של משחה בעין או בעיניים, בלילה לפני השינה. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

יש להמתין 5 דקות לפחות בין מתן תרופה זו לבין מתן תכשירים לעיניים אחרים. אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים יש לפנות לרופא. **שים לב:** תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

#### אופן השימוש:


בכדי להימנע מזיהום המשחה, אין לאפשר לקצה השפופרת לבוא במגע עם משטח כלשהו (כולל העין עצמה). לאחר השימוש, יש לנגב את קצה שפופרת המשחה בעזרת ממחטת נייר נקיה ולאחר מכן לסגור היטב את השפופרת.

#### כיצד להשתמש במשחה:

ראשית, רחץ את ידיך. הטה ראשך לאחור ומשוך את העפעף התחתון, ליצירת "כיס" (ראה תמונה 1). יש לשים את התרופה בתוך "כיס" זה.

קרב את קצה השפופרת לעין. יש לוודא כי קצה השפופרת לא נוגע בעין, בעפעף ובסביבתם. לחץ בעדינות על השפופרת עד ליציאת רצועה של משחה אל ה"כיס" (ראה תמונה 2). כמות של 1 ס"מ של משחה הינה בדרך כלל מספיקה, אלא אם קיבלת הוראה אחרת מהרופא או הרוקח.

עצום את עינייך בעדינות למשך כ 1 עד 2 דקות (ראה תמונה 3). לאחר השימוש במשחת העיניים, רחץ את ידיך בכדי לנקותן משאריות של תרופה. בכדי להימנע מהפצת זיהום, אין להשתמש באותו מיכל של תרופה ליותר מאדם אחד.



#### אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

ניתן להשתמש בדורהטירס בהתאם לצורך, אלא אם כן הרופא הורה לך אחרת. אם שמת **בתוך העין** כמות תכשיר גדולה מהנדרש ניתן לשטוף את העין במים פושרים. אל תשים שוב את המשחה בעין עד למועד הנטילה הבאה. אם בטעות **בלעת** את תוכן השפופרת כולה, לא צפויות תופעות לוואי אולם מומלץ לפנות לרופא, רוקח או מרכז הרעלות. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הקצוב**, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד.

**אין ליטול תרופות בחושך!** בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

#### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בדורהטירס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:** אם התפתח גירוי מקומי, דלקת, נפיחות או פריחה במקום הטיפול: פנה מיד לרופא המטפל.

במקרה של כאב בעיניים, שינוי בראיה, ייצור מוגבר של דמעות, אדמומיות או גירוי בעיניים ו/או כאשר תופעת היובש נמשכת יותר מ 72 שעות (נדיר): הפסק הטיפול ופנה לרופא מיד.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

#### 5. כיצד לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן בטווח הטמפרטורות 15°C - 25°C.
- אין להשתמש בתרופה יותר מחודש ימים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה.
- אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

#### 6. מידע נוסף:

נוסף על החומר(ים) הפעיל(ים) התרופה מכילה גם: התרופה לא מכילה חומרים פעילים. התרופה מכילה: Anhydrous liquid lanolin, Mineral oil, White petrolatum

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:  
שפופרת המכילה משחה לבנה עד צהובה בהירה, שקופה למחצה, הומוגנית.

**בעל הרישום וכתובתו:** לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ, רח' השיטה 8, פארק תעשייה קיסריה, 38900.  
**שם יצרן וכתובתו:** Alcon-Couvreur, Puurs, Belgium  
**מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 1093324050

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.