نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) – ١٩٨٦

يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

چلوبين® - أقراص ٥ ملغ

كل قرص يحتوي على٥ ملغ چليبينكلاميد (Glibenclamide)

لقائمة المواد غير الفعّالة - أنظر بند ٦.

إقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية, اسأل الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء وصف للعلاج من أجلك. لا تعطه إلى أخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن وضعهم الصحي مماثل.

هذا الدواء غير مُخصص عادةً للأطفال دون جيل ١٨ سنة.

١. لأي غرض مُخصص الدواء؟

چلوبين هو دواء ضد السكري يعطي عن طريق الفم.

الفصيلة العلاجية: عائلة السولفونيلأوريا (sulfonylurea).

٢. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حامل أو مرضعة.
- كنت حساسًا للمادة الفعالة أو لأي واحد من مركبات الدواء الأخرى أو لدواء آخر من عائلة السولفونوأميدات (أدوية ضد تلوثات بكتيرية) أو السولفونويلأوريا.
- كنت تعاني من سكري متعلق بالأنسولين (سكري من نوع ١), من سكري وخيم أو غير مستقر.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من حماض كيتوني سكري (ketoacidosis). (من مضاعفات السكري التي يمكن أن تتجلى من خلال العلامات التالية: تعب, غثيان, تواتر التبول وتصلب الشرايين), غيبوبة سكرية.
- خضعت لجراحة صعبة, كنت تعاني من مرض تلوثي, حرق شديد, إصابة وخيمة.
- كنت تعاني من ضعف شديد في وظيفة الكبد, الكلى أو قشرة الغدة الكظرية (Adenocortical).
- كنت تتناول بوسينتان (لعلاج فرط ضغط الدم الرئوي).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

قبل العلاج بچلوبين, أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من الحالات التالية. كذلك, إذا حدثت إحدى الحالات التالية خلال العلاج بالدواء, يجب استشارة الطبيب:

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من ضعف في وظيفة: القلب و/أو الأوعية الدموية, الكبد, الكلية/جهاز البول, الغدة الدرقية (Thyroid).
- كنت تعاني من ضعف في أداء الغدة النخامية, قشرة الغدة الكظرية, كنت تعاني من سوء تغذية.
- كنت تعاني من نقص في أنزيم جلوكوز-٦-فوسفات-ديهيدروچيناز (G6PD) [لأنه يمكن حدوث انخفاض في مستويات الهيموجلوبين وتفكك كريات الدم الحمراء (فقر دم انحلالي)] أو لأي سبب جدي آخر.
- أنت مدخن.
- كنت على وشك أن تخضع لإجراء جراحي, يشمل علاج أسنان.
- كنت تتعافى من إصابة, جراحة, تلوث مع سخونة أو حالات ضغط أخرى - قد تكون هناك حاجة لتغيير مؤقت في أوقات العلاج.
- كنت تعاني من حساسية لطعام معين أو لدواء أياً كان.

تحذيرات إضافية:

- يمكن أن يسبب هذا الدواء حساسية خاصة مع التعرض للشمس تتجلى في طفح في الجلد أو بتسفع زائد ولذلك يجب تجنب التعرض للشمس والحرص على وجود حماية ملائمة (ملابس طويلة, قبعة, مراهم حماية والخ).
- استعمال هذا الدواء هو بالإضافة لحمية غذائية حُدد بأنها ملائمة وليس كبديل.
- قد تقل نجاعة الأدوية المخفضة للسكري في تقليل مستويات السكر في الدم مع الوقت, بسبب تقدم المرض أو بسبب انخفاض الاستجابة للدواء. تسمى هذه الظاهرة فشل ثانوي, على العكس من فشل أولي, حيث لا يكون الدواء ناجعًا منذ أن يعطى في المرة الأولى.
- لا يوصى باستعمال هذا الدواء للأطفال دون جيل ١٨ سنة.

عندما تتناول الدواء, قد تعاني من نقص السكر في الدم (مستوى منخفض للسكر في الدم). يمكن للعوامل التالية أن تزيد من خطر حدوث نقص السكر في الدم:

- سوء تغذية, تناول وجبات في أوقات غير ثابتة, تخطي وجبات, تأخر في وقت الوجبة, فترات صوم, تغيرات في التغذية.
- تناول الدواء بجرعة أعلى من المطلوب.
- اضطرابات في وظيفة الكلى, مرض كبد شديد.
- اضطرابات هرمونية (اضطرابات في الغدة الدرقية, الغدة النخامية أو قشرة الغدة الكظرية).
- استهلاك الكحول (خاصة إذا تم تخطي وجبة).
- تناول أدوية معينة (أنظر "إذا كنت تتناول, أو إذا تناولت مؤخرًا, أدوية أخرى").
- استعمال أدوية إضافية لخفض مستويات السكر في الدم.
- زيادة النشاط الجسدي من دون استهلاك الطعام او الكربوهيدرات بشكل كافي.
- كنت مسناً, ضعيفاً, أو لديك فشل في الغدة الكظرية أو النخامية.

تشمل علامات نقص السكر في الدم:

- ألم بطن بسبب الجوع, صداع, غثيان, تقيؤ, ثقل, نعاس, مشاكل في النوم, قلة الراحة, عدائية, صعوبة في التركيز, انخفاض في اليقظة وسرعة الاستجابة, اكتئاب, ارتباك, مشاكل في النطق والرؤية, تلعثم, رجفان, شلل جزئي, دوار, قلة الحيلة (القدرة).
- يمكن أن تحدث العلامات التالية أيضًا: تعرق, جلد رطب وبارد, قلق, وتيرة قلب سريعة أو متزايدة, ضغط دم مرتفع, إدراك (إحساس) دقات القلب, ألم قوي وفجائي في الصدر الذي قد يشع إلى مناطق مجاورة (ذبحة صدرية واضطرابات في نظم القلب). إذا استمرت مستويات السكر في الدم بالانخفاض, قد تعاني من ارتباك ملحوظ (هذيان), تشنجات, اختلاجات, فقدان السيطرة على نفسك, تنفس سطحي ونظم قلب بطيء, حتى فقدان الوعي. يمكن أن تكون العلامات السريرية لانخفاض وخيم في مستويات السكر مشابهة لعلامات السكتة.

قد يكون من الصعب التعرف على علامات نقص السكر في الدم في مرضى يعانون من مرض عصبي أوتونومي, لدى المسنين ومن يتناولون أدوية من عائلة محصرات بيتا او أدوية داحضة للودي (أنظر البند "إذا كنت تتناول, أو إذا تناولت مؤخرًا, أدوية أخرى").

معالجة نقص السكر في الدم

في معظم الحالات, تختفي علامات نقص السكر في الدم بسرعة بعد استهلاك السكر (مثل: مكعبات سكر, عصير محلى, شاي محلى). لذلك, عليك أن تتزود دوماً بمصدر معين للسكر. تذكر أن الحلويات المصنعة ليست ناجعة. يجب التوجه إلى الطبيب أو إلى المستشفى إذا لم يساعد تناول السكر أو إذا عادت الأعراض.

إذا كنت تتناول, أو تناولت في الآونة الأخيرة, أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية, أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

على وجه الخصوص إذا كنت تتناول:

بوسنتان (أنظر البند "لا يجوز استعمال الدواء إذا"), سيكلوسپورين.

يمكن أن تزيد الأدوية التالية من تأثير چلوبين في خفض السكر في الدم. يمكن أن يؤدي هذا إلى اختطار (احتمال الخطر) لحدوث نقص السكر في الدم (مستويات سكر منخفضة في الدم):

- أدوية أخرى لعلاج السكري (مثل انسولين, بيچوينيدات)
- ديزوپيراميد (لعلاج اضطرابات نظم القلب على سبيل المثال)
- أدوية من عائلة مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لعلاج الآلام والالتهابات (أحماض الساليسيليك, فينيلبوتازون, أزوپروبازون أوكسيفينبوتازون)
- أدوية لعلاج تلوثات في مسالك البول (مثل سولفونوأميدات), لعلاج تلوثات بكتيرية وفطرية (تيتراسيكلينات, كلورمفينيكول, فلوكونازول, ميكونازول, كلاريثروميسين, كوينولونات مثل سيپروفلوكسسين)
- أدوية ضد تخثر الدم (مشتقات كومارين مثل وارفارين)
- أدوية تشجع بناء العضل (أدوية ابتنائية-anabolic), علاج بديل لهرمونات الجنس الذكرية
- أدوية لعلاج الاكتئاب (فلوأكسيتين, معيقات MAO)
- أدوية لخفض الكولسترول (فيبرات مثل كلوفيبرات, بيزأفيبرات)
- أدوية لخفض ضغط الدم (معيقات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين- ACE)
- أدوية لعلاج النقرس (بروبينسيد وسولفينپيرازون)
- أدوية لعلاج السرطان (سيكلوفوسفاميد, ايفوسفاميد, تروفوسفاميد)
- أدوية لخفض الوزن (فينفلورامين)
- أدوية لزيادة جريان الدم عندما تعطى بجرعة عالية عن طريق الوريد (پينتوكسيفيلين)
- أدوية لعلاج ثر الأنف التحسسي مثل حمى القش (تريتوكوالين)
- أدوية داحِضة للودي لعلاج ضغط الدم المرتفع, فشل القلب أو مشاكل في البروستات

- يمكن للأدوية التالية أن تقلل من تأثير چلوبين في خفض السكر في الدم, ما قد يؤدي إلى ارتفاع الاختطار لفرط السكر في الدم (مستويات مرتفعة من السكر في الدم):
- أدوية تحتوي على هرمونات جنس أنثوية (أستروجين, پروجيستيرون مثل أقراص منع الحمل)
- مدرات للبول من نوع ثيازيديئات (مثلاً لعلاج فرط ضغط الدم), ومدرات بول أخرى
- هرمونات الغدة الدرقية
- محصرات قنوات الكالسيوم, لعلاج ارتفاع ضغط الدم على سبيل المثال
- أدوية لعلاج حالات تحسس والتهابات (كورتيكوستيروئيدات)
- أدوية لعلاج اضطرابات نفسية (مشتقات فينوثيازين)
- أدوية لزيادة نظم القلب, لعلاج الربو أو احتقان الأنف, سعال وزكام, لتقليل الوزن أو للاستعمال في حالات الطوارئ التي تهدد الحياة (أدرينالين وأدوية محاكية للودي)
- أدوية لخفض الكولسترول (حامض نيكوتيني)
- أدوية لعلاج الإمساك, في استعمال طويل الأمد (مُليّنات)
- أدوية لعلاج الصرع, الاختلاجات (فينيتوئين)
- أدوية لعلاج مشاكل النوم, للتهدئة (باربيتورات)
- أدوية لعلاج فرط ضغط الدم داخل العين
- أسيتازولاميد (لعلاج الچلوكوما على سبيل المثال)
- أدوية لعلاج فرط ضغط الدم, لمستويات سكر منخفضة في الدم (ديازوكسيد)
- أدوية لعلاج التلوثات, سل (ريفامپيسين, إيزونيازيد)
- أدوية لعلاج مستويات سكر منخفضة جدًا في الدم (چلوكاچون)
- كوليسيفيلام

يمكن للأدوية التالية أن تقلل أو تزيد من تأثير چلوبين في خفض السكر في الدم:

- أدوية لعلاج قرحة المعدة مثل سيمتادين أو رنتيدين (مضادات مستقبل H_2)
- أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو فشل القلب, مثل محصرات بيتا, كلونيدين, چوانيثيدين وريسيرپين. يمكن لهذه الأدوية أن تحجب علامات نقص السكر في الدم, لذلك يجب توخي الحذر بشكل خاص عند تناولها.

يمكن لچلوبين ان يزيد أو أن يخفف من تأثير الأدوية التي تعيق تخثر الدم (مشتقات كومارين مثل وارفارين).

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء مباشرة قبل أو مع الوجبة الأولى في النهار (عادة وجبة الصباح). إذا لم تكن تتناول وجبة في الصباح يجب تناول الدواء حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الطبيب. يجب الحرص على عدم تخطي وجبات خلال استعمال الدواء.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول:

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية خلال فترة العلاج بالدواء. الكحول قد يعزز أو يقلل تأثير چلوبين في خفض السكر بشكل غير متوقع.

الحمل والإرضاع:

لا يجوز تناول چلوبين إذا كنت حامل, أخبري الطبيب إذا كنت حامل, قد تكوني حامل أو تخططين الحمل. لا يجوز تناول چلوبين خلال الإرضاع, قد ينتقل چلوبين إلى حليب الأم.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أدوية.

يمكن أن تتأثر القدرة على التركيز أو ردة الفعل إذا انخفضت مستويات السكر لديك (نقص السكر في الدم) أو ترتفع (فرط السكر في الدم) أو إذا كنت تطور مشاكل في الرؤية بسبب هذه الحالات.

قد يمس استعمال هذا الدواء باليقظة لذلك يجب توخي الحذر بشكل خاص عند قيادة مركبة, تشغيل ماكنات خطرة وفي كل نشاط يستلزم اليقظة, لأنك قد تشكل خطرًا على نفسك أو على الآخرين.

استشر الطبيب إذا كنت تعاني من نقص السكر في الدم في أوقات متقاربة أو إذا كانت أحداث نقص السكر في الدم مصحوبة بالقليل من علامات التحذير أو إذا لم تظهر أي علامات تحذير بالمرة.

معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لاكتوز. إذا قيل لك في السابق من قبل الطبيب بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة, توجه إلى الطبيب قبل البدء بالعلاج بهذا الدواء.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائمًا الاستعمال وفقًا لتعليمات الطبيب. عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

الجرعة وطريقة العلاج يُحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا كنت تعاني من ضعف أو إذا كنت مسنًا, الجرعة الابتدائية عادة سوف تكون أقل. قد تكون هناك حاجة لملائمة الجرعة في حال تغير في الوزن, تغير في أسلوب الحياة او إذا كنت تحت ضغط شديد. استشر الطبيب في هذه الحالات.

إذا كنت تشعر أن جرعة چلوبين أقل أو أعلى من اللازم, لا يجوز تغيير الجرعة على عاتقك, إنما التوجه إلى الطبيب.

كيفية الاستعمال: يجب بلع الدواء مع نصف كأس ماء على الأقل. يجب تناول الدواء مع طعام (أنظر بند "استعمال الدواء والطعام").

لا يجوز المضغ/السحق. يجوز الشطر.

فحوصات ومتابعة

خلال فترة العلاج بهذا الدواء وخاصة لدى المسنين, يجب القيام بفحوصات سكر في الدم والبول, مستوى خضاب الدم السكري (HbA1C), وظيفة الكبد والكلى. قد يوجهك الطبيب إلى فحوصات دم لمتابعة مستويات خلايا الدم.

إذا أفرطت في تناول الجرعة هناك اختطار لحدوث نقص سكر في الدم (علامات نقص السكر في الدم مفصلة في البند ٢ تحت "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء"). يجب أن تستهلك على الفور كمية كافية من السكر (مثل مكعبات سكر, عصير محلى, شاي محلى), والتوجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى على الفور!

عند معالجة نقص سكر في الدم الناجم عن استهلاك الدواء بالخطأ من قبل أطفال, يجب مراقبة كميات السكر التي تعطى بدقة لتجنب خطر فرط السكر في الدم (مستويات مرتفعة من السكر في الدم).

لا يجوز إعطاء طعام أو شراب لأشخاص في حالة فقدان الوعي. حالات خطيرة من نقص السكر في الدم, التي يرافقها فقدان للوعي وغيبوبة, هي حالات طوارئ تتطلب علاج طبي فوري والرقود في المستشفى. يجب تبليغ المحيطين بك بضرورة التوجه فورًا إلى الطبيب في هذه الحالات. لأن حالة نقص السكر في الدم قد تستمر لفترة من الزمن, من المهم جدًا متابعة حالة المعالج حتى انقضاء الخطر. قد تكون هناك حاجة للرقود في المستشفى.

إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ, توجه فورًا إلى غرفة الطوارئ في المستشفى, وأحضر علبة الدواء معك. لا تسبب التقيؤ من دون تعليمات صريحة من الطبيب!

يجب استعمال هذا الدواء في الأوقات المحددة حسب قرار الطبيب المعالج. **إذا نسيت تناول الدواء** في الوقت المطلوب, يجب تناول جرعة فور تذكرك; لكن لا يجوز في أي حال من الأحوال تناول جرعتين معًا! إذا لم تكن متأكدًا أو إذا كنت قلقًا, إستشر الطبيب.

يجب المداومة على العلاج كما أوصى الطبيب.

لا يجوز وقف العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول الدواء, لن يتم الحصول على التأثير المرغوب من خفض السكر في الدم أو أن مرضك قد يتفاقم ثانية. يجب الحرص على اتباع الحمية والتوجيهات الأخرى التي أشارك عليك بها الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء, إستشر الطبيب أو الصيدليّ.

٤. الأعراض الجانبيّة:

ككل أيّ دواء, قد يسبب استعمال چلوبين أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبيّة. من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

يجب إيقاف استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب فورًا إذا:

- وظائف كبد غير سليمة يشمل يرقان (اصفرار الجلد والعينين), مشاكل في جريان سوائل المرارة (ركود صفراويّ), التهاب كبد (hepatitis), فشل كبد.
- رد فعل اليرجي الذي قد يتطور سريعًا لرد فعل وخيم مع صعوبات في التنفس, انخفاض في ضغط الدم وفي بعض الأحيان صدمة.

يجب التوجه فورًا للطبيب إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية:

- أرجية (فرط تحسس) في الجلد مثل تهيج, حكة, طفح, احمرار في الجلد, شرى, ارتفاع في الحساسية لضوء الشمس. كذلك آلام في العضل, آلام في المفاصل, التهاب في الأوعية الدموية. يمكن أن تتطور علامات حساسية خفيفة إلى ردود فعل وخيمة مع صعوبات في التنفس والبلع, انتفاخ في منطقة الوجه, الحلق, الشفتين, اللسان, العنق (وذمة وعائية). في حال رد فعل وخيم يجب وقف استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب فورًا.
- بول بلون داكن.
- نقص شديد في السكر في الدم يشمل فقدان الوعي, اختلاجات أو غيبوبة.
- انخفاض في عدد خلايا الدم: صفائح الدم (يزيد من الاختطار لنزيف وكدمات), يمكن أن يظهر على شكل طفح في الجلد ينبع من نزيف من أوعية دموية صغيرة, خلايا الدم البيضاء (يزيد من خطر التلوثات), خلال الدم الحمراء (يسبب علامات مثل شحوب, ضعف, ضيق تنفس)- نادر. عادة ما تتحسن هذه الأعراض بعد وقف استعمال چلوبين.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة- أعراض جانبية تظهر لدى ١-١٠ مستخدمين من بين ١٠٠:

إضطرابات في الجهاز الهضمي مثل غثيان, تقيؤ, شعور بالامتلاء في أعلى البطن, ألم بطن, حرقة, إسهال. عادة ما تكون هذه الأعراض متعلقة بالجرعة وقد تختفي مع تقليل الجرعة.

أعراض جانبية نادرة- أعراض تظهر لدى ١-١٠ مستخدمين من بين ١٠,٠٠٠:

مستويات سكر في الدم أقل من المعتاد (نقص السكر في الدم) (أنظر البند ٢- "قبل استعمال الدواء").

أعراض جانبية نادرة جدًا- أعراض تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من بين ١٠,٠٠٠:

- رد فعل أليرجي, وظائف كبد غير سليمة- أنظر التفصيل في البند "يجب التوجه إلى الطبيب فورًا".
- انخفاض في مستوى الصوديوم في الدم (يمكن اكتشاف ذلك في فحوصات الدم). هنالك احتمال لحالات نقص الصوديوم في الدم (مستويات منخفضة من الصوديوم في الدم) الذي يتجلى من خلال أعراض مثل: تقيؤ, ضبابية الوعي, اختلاجات.
- رد فعل يشبه ثنائي السيلفرام عند شرب الكحول, يمكن أن يتجلى من خلال أعراض مثل صداع نابض, تورد, غثيان, تقيؤ, تعرق, صعوبات في التنفس, ارتباك, نبض سريع, انخفاض ضغط الدم, دوار.

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (أعراض لم يحدد شيوعها بعد):

- مشاكل في الرؤية, مثل تشوش الرؤية, تغيرات في تركيز الرؤية, على ما يبدو بسبب تغيرات في مستويات السكر في الدم.
- ارتفاع في انزيمات الكبد
- فرفرية (تتجلى في حويصلات في الجلد), فقر دم انحلالي (تلف سريع لخلايا الدم الحمراء), فقر دم اللاتنسجي (انخفاض ملحوظ في كافة أنواع خلايا الدم, قد يتجلى بأعراض مثل شحوب, ضعف, تعب, نزيف وتلوثات), قلة خلايا الدم (انخفاض في عدد من خلايا الدم بشكل متزامن).

إذا ظهر عرض جانبي, أو إذا تفاقم أي واحد من الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبيّ لم يُذكر في النشرة, عليك استشارة الطبيب.

٥. كيفيّة تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على العلبة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية. خزن في العلبة الأصلية.

في أيّة حالة شك, عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العلبة.

٦. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعّالة, يحتوي الدواء أيضًا على:
Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Carmellose sodium, Magnesium stearate, Silica colloidal anhydrous.

يحتوي كل قرص على ما يقارب ١٢٦ ملغ لكتوز.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أقراص بيضاء محدبة من كلا الطرفين مع خط شطر من ناحية واحدة.

أحجام العلبة المصادق عليها: ١٠, ٢٨, ٣٠, ٥٠, ١٠٠, ١٠٠٠ قرص. قد لا تكون جميع أحجام العلب مُسوقة.

فُحصت هذه النشرة وتمّ المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: ٢٠١٥/٠٤.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٠٠ ٢٠٨١٤ ٠٨ ٠٤٠

للتبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك, الدواء مُخصص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض.
شارع دكسل ١, أور-عكيڤا ٣٠٦٠٠٠٠, إسرائيل