

إينسيبيالميد

أقراص ملبوسة ذات تغليف معوي لتنظيم إضطرابات هضمية

المواد الفعالة في كل قرص ملبس:

Pancreatin (contains Lactose) 72 mg
Ox bile extract 35 mg
خلاصة صفراء الثور

المواد غير الفعالة في المستحضر - انظر الفقرة ٦ «معلومات إضافية».

إنّ النشرة يتعمّن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. عليك تناول الدواء بشكل صحيح.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لتنظيم إضطرابات الهضم.

الفصيلة العلاجية: خمائر هضمية وأملاح صفراوية.

٢) قبل إستعمال الدواء

☒ لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (أيليري) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء أو لبروتينات من الحيوان.
- في حالة وجود آلام البطن، غثيان، تقيؤات أو علامات أخرى لإلتهاب الزائدة الدودية.
- في حالة إلتهاب شديد في البنكرياس.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- يتوجب على المرضى الذين يتبعون حمية غذائية فقيرة بالملح، إستشارة الطبيب قبل إستعمال هذا الدواء.
- لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة أو لفترة زمنية طويلة بدون إستشارة الطبيب.
- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.
- يجب ترك فاصل زمني قدره ساعتين على الأقل بين تناول هذا الدواء وبين تناول مضادات الحموضة.
- إذا استمرت إضطرابات الهضم بالرغم من تناول الدواء، عليك إستشارة الطبيب.

٣) قبل العلاج بـإينسيبيالميد إحك للطبيب إذا:

- كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد (يرقان شديد)، الجهاز الهضمي (مثل قرحة)، إنسداد صفراوي كامل.
- كنت بحاجة لجرعة دوائية مرتفعة من إينسيبيالميد و كنت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أو من خلل في وظيفة الكلى.
- إذا كنت تعاني من مرض معيدي إلتهابي مثل: مرض كرون أو إلتهاب القولون التقرحي (Ulcerative Colitis)، إنسداد في الأمعاء.
- إذا كنت تعاني من التليف الكيسي.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول: مستحضرات تحتوي على الحديد ومستحضرات مضادة للحموضة التي تحتوي على المغنيزيوم وكربونات الكالسيوم.

٤) إستعمال الدواء والطعام

تجنب تناول الدواء مع أو قبل وجبة الطعام.

٥) الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، يجب إستشارة الطبيب قبل بدء الإستعمال.

٦) معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي المستحضر على لكتوز، سكروز وصوديوم.

٧) كيفية إستعمال الدواء

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بالنسبة للإستعمال.

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي:

- الكبار: ٤-٢ أقراص ملبيسة ٣ مرات في اليوم مع أو قبل وجبات الطعام.
- الأطفال: ٢-١ أقراص ملبيسة ٢ مرات في اليوم مع أو قبل وجبات الطعام.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

نظراً لأن القرص الملبيس مطلي فممنوع سحبه / شطره / مضغه!
يجب بلع الدواء مع الماء.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، فتوجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

كيف تستطيع المساعدة في نجاح العلاج؟

أثناء العلاج يجب المحافظة على تغذية متوازنة من البروتينات، الدهنيات والنشويات حسب إرشادات الطبيب أو خبيرة حمية مؤهلة.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إينسيبيالميد قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز إلا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالاً إذا تطورت الأعراض التالية: أعراض حساسية (مثل: طفح، حكة، صعوبات في التنفس، ضغط في الصدر، إنتفاخ الفم، الشفتين، الوجه، اللسان).

يجب مراجعة الطبيب إذا لم تزول و / أو كانت الأعراض التالية (شائعة جداً) مزعجة: إمساك، إسهال.

أعراض جانبية إضافية شيوها غير معروفة: دوار.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر اللوبيحة (بليستر) والعلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- يجب تخزين الدواء في مكان بارد وجاف، دون ٢٥ درجة مئوية.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً:

Sucrose, purified talc, charcoal, povidone, frangula bark powder, rhubarb powder, starch, sodium bicarbonate, stearic acid, yellow red and black iron oxide, magnesium stearate, castor oil, carnauba wax, white beeswax, silica, methacrylic acid copolymer, sodium lauryl sulphate, polyethylene glycol, talc, shellac, purified water, sodium benzoate, propyl parahydroxybenzoate, methyl parahydroxybenzoate.

يحتوي كل قرص ملبيس على ما يقارب ١٤٢ ملغم سكروز و ٢,٦ ملغم صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

تحتوي كل علبة على ٤٠ أو ٦٠ قرص ملبيس مستدير بلون بني.

المنتج وصاحب الإمتياز: تريما، منتجات طبية إسرائيلية معبروت م.ض.،
كيبوت معتبروت ٤٠٢٣٠٠ إسرائيل.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتها فحص ورخص في تاريخ:
٢٠١٥ أيار

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
٠٣٣٢٤٢٢-٦٦-٢٧

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

٥٧ معبروت ٤٠٢٣٠٠

٥٥ منتجات طبية إسرائيلية،

معبروت م.ض..