

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו במרץ 2011
לשימוש וטרינרי בלבד
חייב מרשם רופא וטרינרי

Pen & Strep Veterinary

פן וסטרפ וטרינרי

תרחיף מימי סטרילי בצבע לבן-בז' למתן פרנטרלי
כל מ"ל מכיל חומרים פעילים:

Procaine Penicillin	200 mg
Dihydrostreptomycin Sulphate	250 mg

קבוצה תרפויטית:

פרוקאין פניצילין – אנטיביוטיקה ממשפחת הפניצילינים בשילוב עם מאלחש מקומי
דהידרוסטרפטומיצין – אנטיביוטיקה ממשפחת האמינוגליקוזידים

פעילות רפואית:

לשימוש בזיהומים סיסטמיים בבקר, סוסים, כבשים וחזירים הנגרמים ע"י או קשורים לאורגניזמים רגישים לפניצילין ו/או סטרפטומיצין.

התוויות נגד:

לא לשימוש במקרים ידועים של רגישות יתר לפניצילינים
לא להשתמש ביחד עם אנטיביוטיקות אחרות כמו סטרציקלינים ואמינוגליקוזידים אחרים.

תופעות לוואי:

לעיתים בחזירים יונקים ולפיתום התכשיר עלול לגרום לחום חולף, הקאות, רעידות, אדישות וחוסר קואורדינציה.
תגרבה מקומית חולפת עלולה להופיע באתר הזריקה בסוסים.
בחזירים דווח על הפרשה וגינלית שעלולה להיות קשורה להפלה.

אזהרות:

לא לעבור את המנה המומלצת.
לנער לפני השימוש
להשתמש בזהירות בחיות עם מחלות כליה או פגם כליתי.

מתן:

מתן תוך-שרירי עמוק IM
המינון המומלץ הוא:
8 מ"ג/ק"ג משקל גוף פרוקאין פניצילין 10 מ"ג/ק"ג משקל גוף דהידרוסטרפטומיצין סולפט אקוויוולנטי ל:
1 מ"ל/25 ק"ג משקל גוף
הטיפול פעם ביום במשך עד 3 ימים רצופים
הכמות המקסימלית למתן באתר הזריקה אחד:
עד 15 מ"ל בסוסים ובקר
עד 10 מ"ל בחזירים וכבשים

תקופת המתנה

לא לשימוש בכבשים המפיקות חלב לצריכת אדם.
לא לשימוש בסוסים המיועדים לצריכת אדם.
אין להשתמש בחלב לצריכת אדם במשך הטיפול ובמשך 48 שעות מהטיפול האחרון.
אין לשחוט חיות למאכל אדם במשך הטיפול ובמשך 14 ימים מהטיפול האחרון.

אזהרות לנותן התכשיר:

פניצילינים וצפלוספורינים עלולים לגרום לרגישות בעקבות הזריקה, שאיפה, בליעה או מגע בעור.
רגישות לפניצילינים עלולה לגרום לרגישות גם לצפלוספורינים ולהיפך. תגובות אלרגיות לחומרים אלה עלולות להיות חמורות.
1. אל תטפל בתכשיר זה אם ידוע לך על רגישותך לחומרים.
2. יש לנהוג בזהירות במתן התכשיר כדי למנוע חשיפה. נקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים.
3. אם הבחנת בסימפטומים בעקבות חשיפה, כמו: פריחה בעור, פנה לרופא והראה לו אזהרה זו.
התנפחות הפנים, השפתיים או העיניים או קשיי נשימה הם סימפטומים חריפים יותר ודורשים התערבות רפואית דחופה.

חומרים בלתי פעילים:

Povidone
Polysorbate 80
Lecithin
Sodium Citrate

Disodium Edetate
Procaine Hydrochloride
Sodium Formaldehyde Sulphoxylate
Cetrimide
Nipasept Sodium
Potassium Chloride
Citric Acid
Water for Injections

הוראות לאחסון:

אחסן בקירור (2°C-8°C).

הגן מאור

הרחק מילדים

השתמש תוך 28 יום לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק. השמד שאריות חומר.

יצרן וכתובתו:

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP, Northern Ireland, UK

בעל רישום וכתובתו:

קומקס בע"מ, דרך שכם 1, ת.ד. 19943 ירושלים 97200

מספר הרישום:

081-64-92222-00

