



بيبانتن ٥٪

مرهم

التركيب:

Dexpanthenol 50 mg

كل غرام يحتوي: ديكسبانتنيل ٥٠ ملغم

لقالمة المواد غير الفعالة - الرجاء أنظر الفقرة ٦

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

لمنع ومعالجة طفح الحفاضات لدى الرضع.

لمنع ومعالجة تشقق أو الم الحلمتين لدى النساء المرضعات.

لمنع ومعالجة احتكاك، تشدق أو إنشطار الجلد.

لمعالجة الجروح الخفيفة في الجلد والجلد الجاف.

الفصيلة العلاجية: بروفيتامين B5

٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (اليرجي) لديكسبانتنيل أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

• قبل العلاج بـ بيبانتن ألاك للطبيب إذا: كنت حساساً لأي مادة أو لا يدواء.

• يجب تجنب تماس المستحضر مع العينين.

• في حال إستعمال بيبانتن في منطقة الأعضاء التناسلية، فإن نجاعة وسيلة منع الحمل من نوع كوندوم، المصنوعة من اللاتكس، قد تتضرر.

٣) إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، ألاك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

٤) الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل العلاج بـ بيبانتن.

٥) معلومات هامة عن بعض مركبات بيبانتن:

يحتوي هذا الدواء على ستييل الكحول، ستييريل الكحول ولانولين، حيث قد تسبب رد فعل جلدي موضعي (مثل التهاب الجلد التأتبي - فرط الحساسية).

٦) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستياضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً من كيفية إستعمال بيبانتن.

المقارن الدوائي الاعتيادي عادة هو:

طفح الحفاضات - يجب دهن طبقة رقيقة على مؤخرة الرضيع قبل كل عملية تحفيض.

الحلمتين - يجب دهن طبقة رقيقة على الحلمتين بعد كل عملية إرضاع. يجب شطف الحلمتين جيداً قبل عملية الإرضاع التالية.

جلد جاف / منشطر أو جروح طفيفة وكشوط في الجلد - يجب الدهن على المناطق الجافة و/أو على مكان الجرح حتى ٣ مرات في اليوم.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

إذا إستعملت مقدار دوائي مفرط أو إذا بلع طفلاً بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك.

لا تتناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إسأل الطبيب أو الصيدلي.

٧) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال بيبانتن قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدشن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالاً في حال ظهور:

رد فعل تحسسي و/أو رد فعل تحسسي للجلد مثل: التهاب الجلد التأتبي، التهاب تحسسي للجلد، حكة، إحمرار، طفح، إكزema، شرى (urticaria)، تهيج موضعي أو حويصلات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٨) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وذلك لتقادري إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

شروط التخزين: يجب تخزين درجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية.

يجب تخزين في العلبة الأصلية.

يمكن إستعمال بيبانتن حتى ٣ شهور من يوم فتح العلبة للمرة الأولى. لا يجوز إستعمال بيبانتن بعد هذه الفترة.

يوصى بتدوين تاريخ الفتح على العلبة.

٩) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً:

Wool fat (lanoline), Purified water, Paraffin liquid, White soft paraffin, Refined almond oil, Protagen X, White beeswax, Cetyl alcohol, Stearyl alcohol.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

مرهم بلون الكريما حتى الأبيض.

أحجام مرخصة للعلبة: ٢،٥، ٥٠، ٣٠، ٢٠ غرام. من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلبة.

صاحب الإمتياز: باير إسرائيل م.ض.، شارع هاحاراش ٣٦، هود هاشaron ٤٥٢٤٠.

المنتج: GP چرينز بروديكتشنز، إيليل بزل ٧، D-٧٩٦٣٩، چرينز فالن، ألمانيا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتها مُخصّص ورُخص في تاريخ: نيسان ٢٠١٥

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١٢٧ ٧٦ ٢٢٦٦٣ ٠١

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.