

בוואקלוקס וטרינרי Bovaclox DC Veterinary

Strerile Intramammary suspension

תרחיף סטרילי לשימוש בעיניים

הרכב:

Cloxacillin (as benzathine) 11.11 % w/w (500 mg / 4.5 g syringe)
Ampicillin (as trihydrate) 5.55 % w/w (250 mg / 4.5 g syringe)

אריזה מכילה 24 מזרקים. כל מזרק מכיל 4.5 גרם חומר.

קבוצה תרפויטית:

קלוקסצילין – אנטיביוטיקה סמי-סינטטית ממשפחת הפניצילינים.

אמפיצילין – אנטיביוטיקה ממשפחת הפניצילינים.

פעילות רפואית: לשימוש בפרות חולבות (כולל עגלות) בתקופת הייבוש, לאחר החליבה האחרונה, לצורך טיפול בדלקת עיניים קיימת ולהגנה מזיהומים נוספים בתקופת הייבוש.

עוזר בהפחתת תכיפות דלקת עיניים קיצית בפרות יבשות בסיכון.

פעיל נגד חיידקים גרם-חיובים וגרם-שליליים הקשורים לדלקת עיניים ויעיל נגד streptococcus agalactiae וסוגי סטרפטוקוק אחרים, סטפילוקוק רגיש ועמיד לפניצילין, סוגי E. Coli, Corynebacterium וסוגי חיידקים גרם-שלילים רגישים אחרים. התכשיר שומר על רמות אנטיביוטיקה יעילות בעטין הפרה היבשה למשך כארבעה שבועות ואינו יוצר גירוי בעטין.

מינון ושימוש:

טיפול בתקופת הייבוש: אחרי החליבה הסופית שלפני ההמלטה, יש לנקות ולחטא את העטין ולהחדיר תכולת שפופרת אחת לכל רבע דרך תעלת העטין.

התוויות נגד ואזהרות:

לא לשימוש בפרות מיניקות (חולבות כשמניבות חלב). לא לשימוש בפרות עם תקופת ייבוש קצרה מאד. לא לשימוש במשך 45 יום מההמלטה. בעגלות חשוב שפיית השפופרת לא תוכנס לתוך העטין.

הטיפול הוא כדלקמן: יש לרסן את החיה, לנקות ולחטא את העטין, להשעין את פיית השפופרת כנגד פתח העטין אך לא להחדירה. כשלוחצים על המזרק התכשיר מוחדר לעטין.

אזהרות למטפלים: פניצילינים וצפלוספורינים עלולים לגרום לאלרגיה בעקבות הזרקה, שאיפה, בליעה או מגע בעור. התגובות האלרגיות עלולות לעיתים להיות חמורות. רגישות לפניצילין עלולה לגרום לרגישות לצפלוספורינים ולהיפך.

- אין לעבוד עם התכשיר כשהמטפל רגיש או שהומלץ לו לא לעבוד עם הכנות מסוג זה.

- יש לעבוד בזהירות רבה ולהימנע ממגע.

- במקרה של סימפטומים הנובעים מחשיפה (כמו פריחה בעור) יש לפנות לעזרה רפואית ולהראות לרופא אזהרה זו.

אנשים רגישים – עליהם לעבוד עם כפפות. התנפחות של הפנים, השפתיים או העיניים או קשיי נשימה הם סימפטומים חמורים יותר ומחייבים עזרה רפואית דחופה. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.

כל שפופרת מיועדת לשימוש חד-פעמי. יש להשמיד שאריות חומר שלא נוצלו בשפופרת שנפתחה. להרחיק מילדים.

רשימה של חומרים בלתי פעילים: Aluminium Stearate, Liquid Paraffin

אחסון: לאחסן מתחת ל - 25°C.

זמן המתנה: חלב: 120 שעות אחרי ההמלטה. אם הפרה ממליטה מוקדם יותר מ- 45 יום אחרי הטיפול, יש להשתמש בחלב אחרי 45 יום + 120 שעות אחרי הטיפול. במקרה של שימוש בפרות מיניקות יש להשמיד את החלב במשך 30 יום, ואחרי תקופה זו יש לבדוק את החלב עד שלא ניתן לגלות יותר אנטיביוטיקה.

בפרות הסובלות מהיפוקלצמיה, יש לבדוק את החלב לניקיון מאנטיביוטיקה לפני שניתן יהיה להשתמש בו לצריכת אדם.

בשר: 28 יום מהטיפול האחרון.

יצרן וכתובת: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP, Northern Ireland, UK

בעל רישום וכתובת: קומקס בע"מ, דרך שכם 1, ת.ד. 19943 ירושלים 97200

מספר הרישום: 083-60-92376-00

