

يُسوق الدواء بدون وصفة طبيب  
كل حبولة تحتوي على:

باراستامول ٥٠٠ مل.

بيسوافورين هيدروكلوريد ٥٥ مل.

Paracetamol 500 mg

Pseudoephedrine HCl 25 mg

انقى الماء غير الفعالة في المستحضر -

أنظر بذ.

اقرأ النشرة يامعنى حتى نهائتها قبل أن

تستعمل الدواء مخافة عن الداء، إذا كانت لديك

أدلة إضافية، أسل الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء يعطى دون حاجة لوصفة طبيب

ومخصوص للأدوية والاطفال فوق قيل ٧

فقط، حتى هذا الجبل يجب التوجه إلى

الطبيب، عليك استعماله بشكل صحيح:

لمعلومات إضافية، اذك الصيدلي إذا كنت بحاجة

إلى معرفة الطبيب إلى الطبيب إذا استمرت

السخونة أكثر من ٣ أيام أو إذا تحسنت بعد ٣ أيام

أعراض المرض أو لا تتحسن بعد كل يوم،

بالرغم من استعمال الدواء أو في كل وضع،

نظيره باغراض جديدة.

## ١. لأى غرض مخصوص الدواء

لتحفيز اعراض نزلات البرد والاحتقان في الألف المصحوب بسعونة والألام - للعلاج في النهار.

### الفصيلة العلاجية:

- باراستامول: مسكن الالم وخافض

للحرارة.

- بيسوافورين هيدروكلوريد: أمين مقلد

لأعصاب الذهنية يعمل على تنفس الرشح، احتقان في الأنف والاذنين،

المصحوب بنزلات برد وألم التهاب

## ٢. قيل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كنت حامل أو مرضعة.

• كنت حساس للماء الفعالة (باراستامول أو بيسوافورين)، أو مضادات احتقان

آخر أو لأحد مركيات الماء الأخرى.

• كنت معللاً في نفس الوقت بأدوية من

المجموعة الثالثة: مضادات موتوامين اوكتاسياد (مايل) لاحم

ـ جيل ٦ فقط، أنت بذ.

ـ "تكاميول" ، وأو مستحضرات على الودين إيلاغ الملين المعالج عن كل

ـ قراءة قائمة الأعراض الجانبيه وكل دواء أضافي يعطى

ـ إن لا تصالب بها واحدة منها.

ـ الاصغر أعراض الجانبيه قد تكون وخيمة أكثر

ـ لدى المرضى التي تتكون على باراستامول

ـ لنفس الوقت مع مستحضرات أخرى كال :

ـ القلب أو فرج خط مستحضرات

ـ لاجوز استعمال هذا المستحضر في

ـ الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية

ـ إذا كنت تتناول أو تناولت في الأونة

ـ المتصورة يجب أعلام الطبيب أو الصيدلي

ـ إذا كنت متأكداً بأن الدواء الذي تتناوله يحتوى على باراستامول، إبشر الطبيب أو

ـ الصيدلي).

ـ كل حبولة تحتوي على:

ـ باراستامول

ـ بيسوافورين هيدروكلوريد ٥٥ مل.

ـ Paracetamol 500 mg

ـ Pseudoephedrine HCl 25 mg

ـ انقى الماء غير الفعالة في المستحضر -

ـ انظر بذ.

ـ بدون وصفة طبيب وأضافات غذائية، آخر الطبيب أو الصيدلي بذلك، على وجه الأعتادية هي:

ـ بالغين واطفال فوق جيل ٦ سنة: ١ جيل حبوات كل ٤-٦ ساعات، حتى ٤ مرات في اليوم.

ـ ادوية منها منها لالهار العصبي المركزي

ـ مستحضرات ملحنة الشفاف

ـ مستحضرات علاج الربو، ادوية ضد الاكتئاب مثل: من قسمة ثالثة الحلقة

ـ ادوية ضد تحفيز المثل: (مثل: اغفارين)

ـ ضغط مخيم، ادوية أخرى ضد احتقان المثل: اصادف جدية واسعه

ـ ادوية ضد تحفيز ملوك (مثل: ابراقرين)

ـ المم ونلعام مشاك قلب (مثل:

ـ مصادرات الماء، (موكسيكين)، ادوية ضد

ـ جربة من مكاثل، نسب سلس للدموع في العيون

ـ باربيتورات، فينيتين أو كاربايزول من مكاثل

ـ المشاكل، تعيين ديثيل لضرر العين

ـ للشتات، مضادات حيوية باستعمال الماء

ـ ريفاميكوكول، بروبيتيل (العلاج الفقير)

ـ سبيرون أو ساليبلات اخرى (مثل كافامول،

ـ العسال ونزلات البرد (مثل: اليول، الغدة الدرقية)

ـ ضد احتقان)، باغراندي، ادوية ضد

ـ لتنفس اللازم لا تخفيف سخونة، وأيضا

ـ قيل الطبيب أو الصيدلي.

ـ يجب بلع الدواء مع الماء. يجوز الشراء أو السحق.

ـ لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها من

ـ قيل الطبيب أو الصيدلي.

ـ يجب بلع الدواء على الانف (العلاج

ـ Ergot alkaloids)، ( Ergot alkaloids)، على

ـ الكوكسترون، (التحفيز المائي)

ـ إذا افترط بالبطان في تناول الماء أو إذا

ـ بلغ طفل من الداء عن طريق الخطأ

ـ توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة

ـ الطوارئ في المستشفى، وحضر عبوة

ـ الماء معاً لا تنسى النتيجة دون عينات

ـ مع مستحضرات أخرى مثل وصافل

ـ باراستامول، ادوية مثل بوكوكول،

ـ قد تختلف اعراضه انتفاخ في الظهر،

ـ أدوية مثل بوكوكول،

ـ تزيد التهاب حاد في اللكبر، الماء أو

ـ شنخات، اهباب، ألام بطن، اتفاق، الماء أو

ـ صريحة من الطبيب حتى إذا كان شعورك

ـ جيد، علاج فوري هو صرورى، يسبب

ـ قيل استعمال باراستامول، ادوية مثل بوكوكول،

ـ قد تختلف اعراضه انتفاخ في الماء،

ـ قيقيات، اخفاض ضغط اثنان مثل: اسهال،

ـ اعراض جالية جدية والعين،

ـ الماء على الماء، اتفاق، الماء أو

ـ شفاف، اهباب، انتفاخ، الماء أو

ـ يحيى نزلات البرد والاحتقان،

ـ ادوية مثل بوكوكول،

ـ ادوية مثل بوكوكول،

ـ ادوية مثل بوكوكول،

ـ إذا كنت تتناول أو تناولت في الأونة

ـ الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية

### ٤. الأعراض الجانبية:

ـ كل ادواء قد يسبب استعمال باراستامول

ـ سينوس للعلاج في النهار اعراضه الذئنية في كل مرة

ـ تناول فيها دواء، مع النظارات الطبية إذا

ـ كنت بحاجة إليها.

### ٥. كيفية تخزين الدواء؟

ـ تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل

ـ ادوية اطفال، وأو الرغوة ونظم

ـ وبنوك تمنع التسمم، لا تسبب التقوير دون

ـ لابلاج الصلاحية، على ما يذكر في الصنف

ـ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر

ـ على العبوة.

ـ إذا كنت تتناول أو تناولت في الأونة

ـ الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية

### ٦. كيف تستعمل الدواء؟

ـ عليك أن تتحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا

ـ لم تكن متأكداً.