

בריאור, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח, גם אם הרשות בחשופי ברוק החוות והמנה בכל פעם שיהר נוסל את או לישול תרופות בחושן. ברוק החוות והמנה בכל פעם שיהר נוסל את התרופה.
הרכיב משקפיים אם הנין זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוחק.

4| תופעות לוואי:

כמו לכל תרופה, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים, אל תיבהלי לסקרןא רשימת תופעות הלוואי.
יתכן ולא תסבלי מסך את אחת מהן.

תופעות לוואי נדירות מאד נפוצות (משפיעות על יותר מ-1 מתוך 10 מטופלים):

- כאב ראש
- גלי חום
- פריחה בעור
- קשיין או כאב בפרקים
- דלקת פרקים (ארטריטיס)
- חולשה
- אובדן עצם (אוסטאופורוזיס)
- תופעות לוואי נפוצות (משפיעות על 1 עד 10 מתוך 100 מטופלים):
 - אנורקסיה (חוסר תיאבון)
 - מולסטוריה בבנה (רמות גולוח או גבוהות של חומרים שוממיים בדם המכונים ליפידים)
 - נמנום
 - מתחל (Carpal Tunnel) (כאב, דיקור, קור, חולשה באזורים של היד)
 - תחושת גודגוד, קעקוע או חוסר תחושה של העור, ירידה/איבוד בחוש הטעם
 - שלשול
 - הקאה
 - שינויים בדיקיות דם של חפקוד הכבד עלולים להתרחש עם השימוש באנטסטוזול
 - דילול שיער
 - תגובה אלרגית התנפחת פנים שפמיים ולשון
 - כאבים בעצמות
 - יושב בברתניק
 - דיקום ויגילי (בדרך כלל בשכונות הראשונים של הטיפול, אם הדיקום ממשיך יש לפנות לרופא).
 - כאבי שרירים

תופעות לוואי לא נפוצות (משפיעות על 1-10 מתוך 1,000 מטופלים):

סימנים לפגיעה בכבד / דלקת כבד: סימנים הכוללים הרגשה כללית לא טובה, עם או בלי צהבת (שור צהוב ו/או צהובות)
כאב בכבד או תנפחות הבדב, שחן כהה, אובדן תיאבון.
פני לתופעה מיד.

תופעות אלרגיות כגון סרפדס או חרלת (פריחה מגדדת בעור) כולל דלקת בכלי הדם הקטנים בעור (נימי דם) הגורמים לפריחת בעור.

אצבע הזיק (Trigger Finger) - פגם ביכולת לישר אגודל או אצבע עלולה ברמות הסיזן בדם. אם יש לך בחילות, הקאות ותחושת צמא עליו לידע את הרופא.
אזי יכלים להיות סימנים של עליה ברמת הסיזן בדם.

הרופא ישקול לצמצם בדיקות דם על מנת לבדוק זאת.

• התרופה מכילה גם את החומרים הבלתי פעילים הבאים: Titanium Dioxide, Sodium Lactate או Lactose Monohydrate, אשר עלולים לגרום לתגובה במספר קטן של אנשים הרגישים לחומרים אלו
אם נאמר לך "י" הרופא כי הנין סובלת מרגשות לסוכרים מסויים - היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.
התרופה מכילה לטוסול - אין להפסיק הטיפול בתרופה אחת לפי הוראות הרופא בלבד. במקרה של הגעה לבית חולים עליו לידע את הצוות הרפואי שהנין נטלה אנטסטוזול.

אנטסטוזול מפתח את רמת ההורמונים הנשיים, דבר העלול לגרום לאובדן התכולה המינרלית של התצמות והפתות חוזקו (ראי פרק 4 - "תופעות לוואי"). במידה והנין סובלת מאוסטאופורוזיס או בסיכון ללך מומלץ להייעץ עם הרופא לפני החילת הטיפול וכן בנוגע למעקב הדרוש בזמן הטיפול.

אם את לוקחת, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי חזונה, ספרי על כך לרופא או לרוחק. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם את לוקחת אחת או יותר מהתרופות הבאות:

- טמוקסיין ו/או תרופות אחרות המכילות אסטרוגן
- תרופות השייכות לקבוצת LHRH (LHRH analogue), למשל בוסרילן (buserelin), בוסרילן (Goserelin) לויפרולין (Leuprorelin), טריפטולין (Triptorelin), תרופות אלו משמשות לטיפול בדרטן השך, מצבים גינקולוגים מסויים ובעיות פריות.

שימוש בתרופה ומזון: יש לטויל את התרופה בשלמותה עם מיץ, ללא תלת בזמני הארוחת. אין זה משנה אם נטלים את התרופה עם או בלי מזון.

שימוש בילדים: תרופה זו איננה מועדת לילדים ומתנגרים.

שימוש בתרופה בזמן הריון או הנקה, אם הנין בהריון או מניקה, אין להשתמש בתרופה מזכיל להיוועץ ברופא.

נהיגה ושימוש במכונית: תרופה זו אינה אמורה לפגום בנהיגה ברכב או בהפעלת מכונות. אולם ישנן חולות, אשר לעיתים עלולות להרגיש חולשה או נמנום אם הדבר מתרחש, יש להיוועץ בחופא.

3| כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליו לבדוק עם הרופא או הרוקח המינין ואופן הטיפול 'יקבעו ע"י הרופא בלבד. המינון המקובל למבוגרים בדרך כלל הוא טבליה אחת ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת. תרופה זו אינה מועדת לילדים ומתנגרים.

אופן השימוש: אין ללעוס את הטבליות! אין לחצות את הטבליות בהערך קו חצייה. יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מיץ, ללא תלות בזמני הארוחת. אין זה משנה אם נטלים את התרופה עם או בלי מזון.

חולים המתקשים בליעת התרופה - יש להוועץ ברופא.
בדיקות ומעקב: במידה והנין סובלת מאוסטאופורוזיס או בסיכון ללך, מומלץ להיעיץ עם הרופא לפני החילת הטיפול וכן בנוגע למעקב הדרוש בזמן הטיפול.

אם נשחת לישול תרופה זו בזמן הדרוש, אין לישול מנה כפולה. קחי את המנה הבאה בזמן הריגל והיוועץ ברופא. אין לישול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה. אם נטלה כטעות מנה כפולה, התקשרי לרופא או לרוחק מיד.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב

עליו לצרוב לפי תדירות הרקחים (מכשירים) התשמ"ז-1986

לחומרה משוקת על-פי מרשם רופא בלבד

אנטסטוזול אינוכמד 1 מ"ג טבליות מצופות

1| **שם התרופה, צורתה והחומר:**

שם התרופה: אנטסטוזול אינוכמד 1 מ"ג
צורה: טבליות מצופות
החומר הפעיל: מזכיל טבליה.

כל טבליה מכופה מכילה 1mg Anastrozole
3-מ-3 כל טבליה מכילה בנוסף גם: 99 מ"ג לקטוז. כל טבליה מכילה פחות מ-3 מ"ג נתרן.

לרשימת מועדים הבלתי פעילים ואלרגיים בתרופה - ראה טעיף 6.
קרא בניון את הבליון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה.

עליו זה מכלי מיצד המצייני על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פני אל הרופא או אל הרוחק.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעבירי אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

התרופה אינה מועדת לילדים ומתנגרים.

תמצית מועדת הרוגי על התרופה:

התרופה מועדת לטיפול בדרטן השך אצל נשים לאחר תקופת הבלות. התרופה אינה מועדת לילדים ומתנגרים.

המיון המקובל למבוגרים הוא טבליה אחת ביום.

יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מיץ, ללא תלות בזמני הארוחת.

למה מועדת התרופה? התרופה מועדת לטיפול בדרטן השך אצל נשים לאחר תקופת הבלות.

קבוצה תרופוטי: מעכבי אנזים ארומטאז.

2| לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה:

• אם את רגישה (אלרגית) לחומר הפעיל או לכל אחד מהרכיבים התוספים
• אם הנין מכליה התרופה, החומר הפעיל מופיע בסעיף 1 והמרכיבים התוספים מפורטים בסעיף 6

• כאשר הנין לפני גיל הבלות, בהריון או מניקה.

• אם הנין סובלת מליקויים או ממחלת מסוימות המשפיעות על הכבד או הכליות.

• אם הנין נוטלה, כגון טפול הרומנלי, חילפי, חושש להפחתה בהשפעה של אנטסטוזול.

אין להשתמש בתרופה מזכיל להיוועץ ברופא לפני החלת הטיפול אם:

- אם הנין לפני גיל הבלות, בהריון או מניקה.
- אם הנין סובלת או סובלת בגבר לשלוח המשפיע על חוזק העצמות (ראי פרק 4 - "תופעות לוואי").
- אם הנין נוטלה תרופות מסוימות המשפיעות בהמשך פרק זה ("תגמות בין-תרופות").

אם סבלת מבער מליקויים או ממחלות המשפיעים על הכבד או הכליות.

אזהרות מיוחדות המנוגעות בשימוש בתרופה:

• אם הנין רגישה למוזן כלשהו או לתרופה לשהי, עליו להודיע על כך

לרופא לפני נטילת התרופה.