

نشرة طبية للمستهلِك بموجب أنظمة الصيدلة لمستحضراتحدا1٩٨١

إقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحوص وحرص من قبلها في كانون الأول ٢٠١١

# بيكالوتاميد اينوقاميد ٥٠ ملغم أقراص مطلية

التركيبالحج

كل قرص مطلي يحتوي على ٥٠ mg Bicalutamide

كل قرص يحتوي أيضًا على حوالي ١١ ملغم ككتوز مونوهيدراتيم

**المركبات الغير فعالةالحج**
Lactose Monohydrate, Povidone (K-29/32), Crospovidone, Sodium Lauryl Sulfate, Magnesium Stearate, Purified Water, Hypromellose, Titanium Dioxide (E17١), Macrogol (PEG 4000).

**المجموعة الصيدلانيةالحج**

مستحضر مضاد لمنشطات الذكورة يتدخل في قسم من التأثيرات الهرمونية المنشطة للذكورة داخل الجسميم

**الفعالية الطبيةالحج**

لمعالجة سرطان البروستاتيم

**متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟**

<p>لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباتهيم</p> <p>هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى النساء، بما في ذلك الحوامل والمرعاتيم</p> <p>لا يجوز إعطاء هذا الدواء للأطفاليم</p> <p>لا يجوز استعمال هذا الدواء بشكل متزامن مع ترينيتارين، استيميزول أو سيرابريديم</p>
---

**لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدمالحج**

إذا كنت تعاني من خلل في وظيفة الكبديم، إذا كنت تعاني من السكري وتعاطي أدويةتحت LHRHتحتل جوزلين، يوزلين، ليونولين،ذنبونوبوليدل وترينيتارينيم

**تحذيراتالحج**

يجب الأخ بعين الاعتبار إجراء الفحوص الطبية الدورية أثناء فترة تناول هذا الدواء لوظائف الكبديم

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواءيم

يحتوي المستحضر على ككتوز لخدلى بشكل ككتوز مونوهيدراتيد وتيتانيوم ديوكسيد، الذين قد يسببان الحساسية لدى الأشخاص الحساسين لهذه المركباتيم

**كيف يؤثر الدواء على حياتك اليومية؟**

قد يسبب استعمال الدواء بعض الأحيان إلى العاس، لذلك يجب التصرف بحذر شديد عند قيادة المركبة، عند تشغيل الماكينات الخطرة وفي كل فعالية تتطلب اليقظةيم

**التفاعلات بين الأدويةالحج**

إذا كنت تتعاطى دواءً إضافيًا، بما في ذلك أدوية تصرف بدون وصفة بية وإضافات غذائية، أو إذا نهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب وعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم التفاعلة الناتجة عن التفاعلة بين العقاقير. خاصة الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية:مضاداتخثر الدم،المعطاةمن طريق الفم، مستحضرات مضادة للهرماتمين،ذنبونارين،واستيميزول،حد سيرابريد،التيستوليم في علاج حالاتهعبية،منعسرالهضم،حد سيبكوسيم،يوزلين،ذنبونين،جهازا،المناعة،حدعقاقيرتاناتا،الكسل لخدلى،مضغوطالعالي،وحداتمن أمراض القلب،حد كيتوكوزانول و سيمتيد،ينارينيم

**الأعراض الجانبيةالحج**

إضافة إلى الفعالية المرغوبة للدواء، قد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية، مثلالحج

أعراض جانبية شائعة جدًا الذنوت،على أكثرمن ١٠ من ضمن ١٠٠، معالجين،الحج،وجعة،إمساك،غثبان،حساسية أو تضخم اللدين، موجاتمن

الحرارة، شعور بضعف، انتفاخ، فم قد لحقد بسبب الشحوب والتعب،الحج

أعراض جانبية شائعة لذنوت،على أقل من ١٠ من ضمن ١٠٠، معالجين،الحج،الجلد، أو بياض العينين،أخضر،الحج،قد تكون هذه علامات لمشاكل في أداءالكبد،أو في حالات نادرة،فشل كبديم،قدفقدان الشهية،للطعام، انخفاض الشهوة،الجسدية، اكتئاب، شعوربعاس، مشاكل في الهضم، انتفاخ، غازات في البطن، تساقط شعر، نمو شعر من جديد أو نمو شعر إضافي، حكة، جلد جاف، طفح جلدي، عجز جنسي، زيادة وزن الأم في الصدر، انخفاض في أداء القلب، توية قلبية،يم

قد يسبب الدواء أحيانًا تغيرات في الدم، الأمر الذي يُكِّم طبيبك بأن يقوم بفحوص دم معيَّنة،يم

**الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتمامًا خاصالحج**

أعراض جانبية شائعة جدًا الذنوت،على أكثرمن ١٠ من ضمن ١٠٠ معالجين،الحج،الأفم في البول،أخضر،الحج،البرص، دم في البول،أخضر،الحج،الرجع،الطبيب فورًايم

صعوبات خطيرة في التنفس، أو تفاقم فجائيم في صعوبات التنفس، التي قد يرافقها سعال أو صدوقينيم،قد يتطور لدى بعض المرضى الذين يتعالجون بالدواء، التهاب رئتي يستمر بين تسبجي أخغير شائع،الحج، راجع الطبيب فورًايم

أعراض جانبية شائعة لذنوت،على أقل من ١٠ من ضمن ١٠٠ معالجين،الحج،اصفرار الجلد،والقسم الأبيض للعين،تم،قدتكون علامات لمشاكل في الكبد، وفي حالات نادرة علامة لفشل كبدي،حد، راجع الطبيب فورًايم، أفم في البطن، تم في البول،حد، راجع الطبيب فورًايم

أعراض جانبية غير شائعة،قدتفاعل،حسئسي،يم،قدتشمل الأعراض،إيداع،جائيل،حد،كعة،شديدة،في الجلد،كع،كل،بار،أداء،أو،انتفاخ،الوجه، الشفتين، اللسان، الحلق، أو أجزاء أخرى في الجسم، ضيق نفس، فبر أو صعوبات في التنفس، تم راجع الطبيب فورًايم

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالًا،يم

**الجرعة الوائيهالحج**

حسب تعليمات الطبيب فقطيم

في حال عدم وجود تعليمات أخرى للطبيب، فالجرعة الوائية الاعتيادية للكبار هي قرص واحد في اليوميم

لا تتجاوز الجرعة الموصى بهايم

إذا نسبت تناول الدواء في الزمن المحدد، فلا يجوز تناول جرعة وائيه إضافية، وإنما الاستمرار في البرنامج لتناول الدواءيم

**إرشادات الاستعمالالحج**

لا يجوز سحق، مضغ، أو شطر القرص الى نصفين،حد، يجب بلع القرص كاملًا مع المائيم

يجب تناول القرص يوميًا في نفس الوقتيم

**كيف تستطيع أن تساهم في نجاح العلاج؟**

يجب إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيبيم

لا تتوقف عن استعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحيةيم

**تجنب التسميمحج**

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال ونساء الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسميميم

إذا أقرطت في تناول الجرعة الوائية أو إذا بلع الطفل،حد، خطأ من هذا الدواء عليك التوجه الى المستشفى حالًا مصطحبًا عبوة الدواءيم

لا تسبب القيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب،حد

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمرضى أخريم لا تعط من الدواء الى أقاربك، جيرانك أو معارفك،يم

لا تتناول الدواء في العتمة،حد، يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الوائية في كل مرة تتناول فيها دواءيم، ضع النظارات الطبية، إذا لزم الأمر، ذلك،يم

**الخيرينالحج**

يجب حفظ هذا الدواء في مكان بارد، لحدون ٢٥ درجة مئوية،حد، في عبئته الأصلية،يم

نقى الأدوية صالحة لتفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبئتها الأصلية، وتم حفظها بموجب تعليمات الخيرين، الحد،الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر، المدونة على العبوة،يم في حالة التلذبح عليك استشارة الصيدلي الصريف، لك هذا الدواءيم، لا يجوز تخزين، أدوية مختلفة في نفس العبوة

**رقم سجل الدواءالحج** ١٤٦٩٨، ٣٢٤٣٦٠٠

**المنتج**،لج، سينتور، هولندا،لخصم قبل سينتور هيسانيا، اسبانيا،الحج

**صاحب الامتياز والمستورد**،لج، اينوقاميد،مريم،ضربيم، ش.م،ح.م، ٨٩، ١٣٩٨٨٠٨٩، م.م،م،يم ١٢، إيفن، نهوت ٥٠٠، ليم