

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصبلة لمستحضرات الحد ١٩٨1

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

هذا الدواء ملازم بوصفه طبيب

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص في قبلها في كانون الأول ٢٠١١

# بيكالوتاميد اينوفاמיד ١٥٠ ملغم أقراص مطلية

التركيبالج

كل قرص مطلي يحتوي على١٥٠ mg Bicalutamide

كل قرص يحتوي أيضًا على حوالي ١٨٢ ملغم لكمزور مونوهيدراتيم

**المركبات الغير فعالةلج**
Lactose Monohydrate, Povidone (K-29/32), Crospovidone, Sodium Lauryl Sulfate, Magnesium Stearate, Purified Water, Hypromellose, Titanium Dioxide (E171), Macrogol (PEG 4000).

**المجموعة الصيدلانيةلج**
مستحضر مضاد لمنشطات الذكورة يتدخل في قسم من التأثيرات الهرمونية المنشطة للذكورة داخل الجسميم

**الفعالية الطبيةلج**

لمعالجة سرطان البروستاتيم

**متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟**

لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباتهيم
هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى النساء بما في ذلك الحوامل والمرضعاتيم
لا يجوز إعطاء هذا الدواء للأطفاليم
لا يجوز استعمال هذا الدواء بشكل متزامن مع تريفتاندين، استيمبترول أو سيترابريديم

**لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدمًالج**

إذا كنت تعاني من خلل في وظيفة الكبديم إذا كنت تعاني من السكري وتتعاطى أدويةتحت HRHلج تشمل جوزلين، بوزلين، ليورولين، لخبوبور،ليهدا، وتريبتورلينيم

**تحذيراتلج**

يجب الأخذ بعين الاعتبار إجراء الفحوص الطبية الدورية أثناء فترة تناول هذا الدواء لوظائف الكبديم

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدوائيم

يحتوي المستحضر على لكتوز لعللى شكل كمزور مونوهيدراتيد وتيتانيوم ديوكسيد. الذين قد يسببان الحساسية لدى الأشخاص الحساسين لهذه المركببيم

**كيف يؤثر الدواء على حياتك اليومية؟**

قد يسبب استعمال الدواء بعض الأحيان الى العتاس. لذلك، يجب التصرف بحذر شديد عند قيادة المركبة، عند تشغيل الماكينات الخطرة وفي كل فعالية تتطلب اليقظةيم

**التفاعلات بين الأدويةلج**

إذا كنت تتعاطى دواءً إضافيًا، بما في ذلك أدوية تصرف بدون وصفة بية وإضافات غذائية، أو إذا تهيئت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب وعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم التفاعلة الناتجة عن التفاعلين.
عقاقير خاصة بالأوية التي تنتمي الى المجموعات التالية:مضاداتخثر الدم،المطعانةعن طريق الفم، مستحضرات مضادة للسرطان،مضاد فيروساتين،أستيمبترول،ج. سيترابريد،مستعمل في علاج حالاتعقبةمنعسر الهضم،ج.سكوكوسبيرون،لخنتيبيطها،أزالامعانة،ج.معدقات قنوات الكلس،لختلصاعظا،المعالوي،والحالاتمن أمراض القلبالج. كيدوكوزول، أو سيمنتيدينيم

**الأعراض الجانبيةلج**

إضافة الى المعالجة الهرمونية للدواء، قد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية، مثل:ج

أعراض جانبية شائعة جدًا:الخثوثر على أكثر من ١ من ضمن ١٠ معالجبن،الجحج،دوخة،إسك، غثيان، حساسية،و تضخم الثديين، موجات من

الحرارة، شعور بضغف، انتفاخ، فقر دم، تخفق بسبب الشحوب والتعبالجيم

أعراض جانبية شائعة لالخثوثر على أقل من ١٠ معالجبن،الجحج،إصفرار الجلد، أو بياض العينين،لخصف،راجيم، قد تكون هذه علامات لمشاكل في **أدراككيدوي** وفي حالات نادرة،قدقتل كيديم،قدفان الخشونة للطعام، انخفاض الشهوة الجنسية، اكتئاب، شعوربتعاس،مشاكل في الهضم، انتفاخ، غازات في البطن، تساقط شعر، نمو شعر من جديد، أو نمو شعر إضافي، جكة، جلد جاف، طفح جلدي، عجز جنسي، زيادة وزن، آلام في الصدر، انخفاض في أداء القلب، نوبة قلبيةيم

قد يسبب الدواء أحيانًا تغيرات في الدم. الأمر الذي يلزم طبيبك بأن يقوم بفحوص م معيّنينيم

**الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتمامًا خاصًالج**

أعراض جانبية شائعة جدًا:الخثوثر على أكثر من ١٠ من ضمن ١٠ معالجبن،الجحج،أدوي البطن، دم في البول،انخفاض جدًا،الجحج،راج،الطبيب فورًايم
صعوبات خطيرة في التنفس، أو تاقلم ففاني في صعوبات التنفس، التي قد يرافقها سعال أو صد وتوقيم
قد يتطور لدى بعض المرضى الذين يتعاطون دواء التهاب رئة، يسمى مرض رئوي بين نسبي،لخغير شائع،الجحج، راجع الطبيب فورًايم

أعراض جانبية شائعة لالخثوثر على أقل من ١٠ معالجبن،الجحج،إصفرار الجلد،والقسم الأبيض للعين، تم قدتكون علامات لمشاكل في

الكبد وفي حالات نادرة علامات لنفشل كيدي،ج. راجع الطبيب فورًايم
آلام في البطن، دم في البول،ج. راجع الطبيب فورًايم

أعراض جانبية غير شائعة،لجتفاعل لتحسسيمي،قدتشمعل الأعراض بدائية،قدتقل،لجكبد،لجمع كل،باروندا،والانتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحلق، أو أجزاء أخرى في الجسم، ضيق نفس، زفير أو صعوبات في التنفس، تم راجع الطبيب فورًايم

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم نذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالًايم

**الجرعة الدوائيةلج**

حسب تعليمات الطبيب فقطيم

في حال عدم وجود تعليمات أخرى للطبيب، فالجرعة الدوائية الاعتيادية للكبار هي قرص واحد في اليوميم

لا تتجاوز الجرعة الموصى به في

إذا نسبت تناول الدواء في الزمن المحدد، فلا يجوز تناول جرعة دوائية إضافية، وإنما الاستمرار في البرنامج العلاي لتناول الدواءيم

**إرشادات الاستعماللج**

لا يجوز سحق مضغ، أو شطر القرص الى نصفين،ج يجب بلع القرص كاملًا مع المائيم

يجب تناول القرص يوميًا في نفس الوقتيم

**كيف تستطيع أن تساهم في نجاح العلاج؟**

يجب إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيبيم

لا تتوقف عن استعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحيةيم

**تجنب التسميملج**

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال ونساء الرضغ، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسميميم

إذا أقرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ المظلمة خطأ من هذا الدواء عليك التوجه الى المستشفى حالًا مصطحبًا عبوة الدواءيم
لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب،ج

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمرضى آخرين، لا تعطه من الدواء الى أقاربك، جيرانك أو معارفكيم

لا تتناول الدواء في العتمة،ج يجب تشخيص طابع الدواء،والتاكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها،دوائيم ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر،ولكليم

**التخزينلج**

يجب حفظ هذا الدواء في مكان بارد لحدون ٢٥ درجة مئوية،لج في علبيته الأصلية،يم

تبقى الأوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبيها الأصلية، وتم حفظها بموجب تعليمات التخزين، الجراء ملاحظة تاريخ

انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوةيم في حالة الشك،لج عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء،يم لا يجوز تخزين دوية مختلفة في نفس العبوة

رقم سجل الدواء،لج ١٤٦،٩٩،٣٢٤٣٠٠٠

**المنتج،ج سينتو، هولندا**
لخصن قبل سينتو، هيسباينا، اسبانيا،الجيم

**صاحب الامتياز والمستورد،لج**
فوقايمد، ميم،ض.يم، ش.يم،ج.م ٠٨٩،٣٩٨٨٠٨٩،ص.يم،يم ١٢، إيفن، بهوت، ٤٠٥٠٠يم