

דקסמול® קיד טבליות ללעיסה

עלון לזכרון לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986.

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

כל טבליה ללעיסה מכילה:

פראצטמול מ"ג 250 Paracetamol 250 mg

רשימת המרכיבים הבולתי פעילים בתכשיר – ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה זמין מידע המציע על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה לרופא או לרוקח.

תרופה זו מיועדת בדרך כלל לילדים מעל לגיל 3 שנים. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. יש לפנות לרופא אם הרום נמשך יותר מ- 3 ימים או יש סימני המחלה המורכבים או משתפרים לאחר 3 ימים למרות השימוש בתרופה או בכל מצב שבו מופיעים תסמינים חדשים.

1. למע מיועדת התרופה?

לישבור כאבים מיוחדת הורדת חום.

קבוצת הרפואית:

משך כאבים ומוריד חום.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה/הילד רגיש לחומר הפעיל (פראצטמול) או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בדקסמול קיד ספר לרופא אם:

הינך או הילד סובל או סבלת בעבר מאילוקהוליום או צהבת או מילקיו בתפקוד; הכבד (כולל מחלת כבד אילוקהולית), הכליה/מערכת השתן.

הינך או הילד רגיש לזמן כלשהו או לתרופה לילדים. אתה או הילד סובל מדלקת פרקים ונאלץ לשתמש בכאב-בלי יום.

אינך בטוח לגבי הגורם למחלת הילד או המשחלה מזוהה בפריחה, קשי נשימה, שלשול או עייפות קיצונית או רדמת.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה משוטפת מבלי להיוועץ ברופא.

הימנע מלקחת מינון גבוה (אף אם בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.

התכשיר מכיל פראצטמול העלול לגרום לנזק בכבד במקרים ילדה; ניתן במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת, שתיית משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול, או נכשולים.

תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.

אין לטול תרופות נוספות לרודדת חום ושיכור כאבים, או תרופות להגנתו ללא התייעצות עם רופא או רוקח, למעט מינון יחיד/רעה של פראצטמול.

אין לטול תרופות נוספות ממשפחת "דקסמול" /או תכשירים נוספים המכילים פראצטמול.

אם אתה או הילד פיתחת בעבר תופעות אוזניים עריות כתוצאה מנטילת תכשירים המכילים פראצטמול או לטול תכשירים המכילים פראצטמול, כדי שלא יגרמו שוב תופעות עריות מחרות.

אם אתה או הילד לוקחים, או אם לקחתם לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה או הילד לוקחים:

תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות הרגעה, לשינה ולאפינפריה);

• תרופות נגד קרישת דם (כגון וורופין)

• תרופות מחרזות פעילות אנזימי הכבד כגון: ברביטורטיס, פניטואו או קרבמזין (המשמשות בעיקר לאפילפסיה);

• עוויתות, לועיות (ספאטילין), רפנפיצין (אנטיביוטיקה), פרובניד (לטיפול בטחור), תרופות נגד זיאנו כגון ממשפחת הרטיקליים (Tricyclic antidepressants).

• נוגדי דלקות שאינם סטרואידים, אספירין או סיליולטיים אחרים, תרופות נוספות המשככות כאבים או מרודדת חום.

• מוטולולאמריד או זומפריזון (לטיפול בחבליה, הקאות ובעיות קיבה אחרות); מולטיטריאמינ (להפתחת יתר שומני הדם).

• אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול (אם אינך בטוח שהתרופה שהינך נוטל מכילה פראצטמול, היוועץ ברופא או לרוקח).

שימוש בדקסמול קיד וזריכת אזהרות:

אין לשתות משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול בתרופה בגלל הגדלת הסיכון לנזק לכבד.

הריון והנקה:

אם הינך בהריון או מניקה היועץ ברופא לפני תחילת השימוש.

שימוש בילדים:

יש להיוועץ ברופא בעת השימוש בתרופה זו בילדים מתחת לגיל 3 שנים. על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לואי וכל תרופה נוספת שהינך לילד.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

בהעדור הוראה אחרת מלרופא, הימנע המקובל הוא:

מבוגרים וילדים מעל גיל 16 שנים: 2-4 טבליות כל 4-6 שעות, עד 4 פעמים ביממה.

ילדים:

12-16 שנים: 2-3 טבליות, עד 4 פעמים ביממה.

10-12 שנים: 2 טבליות, עד 4 פעמים ביממה.

8-10 שנים: 1½ טבליות, עד 4 פעמים ביממה.

4-8 שנים: 4 טבליות, עד 4 פעמים ביממה.

3 שנים: ½ טבליה, עד 4 פעמים ביממה.

אין להשתמש בתרופה יותר מ- 3 ימים ללא הוראת רופא.

אין לעבור על המנה המומלצת על ידי הרופא או הרוקח או על מספר המנות ביממה. יש לטול במרווחים של לא פחות מ- 4 שעות.

יש ללשט את התרופה לפני בליעתה. ניתן לאחות או לתכוש.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לאחד מינון של בית חולים. והבא אריות התרופה איתך **אין לגרם להקבא** לפי הוראה מפורשת מרופאן גם אם הרגשת נוחה. טיפול מיידי הוא חיוני, בגלל סיכון להתפתחות נזק חמור לכבד.

עלולות תופעות הפעות לואי כגון: שלשול, תאבון ירוד, חבליה או הקאות, הזעה מוגברת, עייפות או כאב בטן, נפיחות, כאב או רגישות בבטן עליונה, וייתכן והן לא משקפות את הנזק לכבד.

אין לטול תרופות בחושיך בזק החותית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפים אם הינך זקוק להם.

4. תופעות לואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בדקסמול קיד עלול לגרום לתופעות לואי כגון מחרוזת, גרויים בחלק המשתמשים. אל תיבהל

למקרא רשימת תופעות הלואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. תופעות הלואי עלולות להיות חמורות יותר בקשישים.

תופעות לואי חמורות:

• **יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא בהופעת:** סימנים של אלרגיה כגון: פריחה, גרוד בעור או חרלת המלווה לעיתים בהתנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון אשר עלולים לגרום לקשיי בליעה או לקשיי נשימה/קוצר נשימה, או צפופים או סומברים, התנפחות הפנים.

• פראצטמול יכול לגרום במקרים נדירים להופעת מחלות עור חריפות שכימנים שלהן ילומי להיות: אדום, פריחה, שלפוחיות, כאבים בפה, קילוף העור, פגיעה עורית נרחבת.

• תופעות לואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול ללא בעיה.

• סימנים של שישנים במערכת הדם כגון: נטייה לדימומים, שפיט דם בלתי מוסברים, התפרקות דלקות ביתר קלות.

• בחילה, ירידה תאומות במשקל, תאבון ירוד והצטננה או העור העייני, פגיעה בכבד או בכליית (שימוש ממושך).

• תופעות לואי הנוגעות ממינון יתר (ראה סעיף 4) נטלת בטעות מינון גבוה יותר.

אם אחת מתופעות הלואי מתמירה או כאשר אתה או הילד סובלים מתופעת לואי שאינה חמורה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלתן תרופה זו וכל תרופה אחרת. יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים /ואו יתנוקות על ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרם להקבא ללא הוראה מפורשת מרופאן.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של חומר שוטף.

• תנאי אחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C. אחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, Strawberry flavour, Sodium starch glycolate, Saccharin sodium, Maize starch, Fumaric acid, Ethylcellulose, Magnesium stearate, Polyethylene C-10, Silica colloidal anhydrous, Sodium laurylsulfate, Silicon dioxide, Red lake E127.

כל טבליה מכילה:

→ 13 מ"ג סטרין 25-20 מ"ג נרין.

כיצד רגית את התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליה ורודה מנוקדת בעלת קו חצי.

כל אריזה מכילה 10, 20, 50 או 1000 טבליות באריזות מגשית. לא כל האריזות עשויות להיות משווקות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי

במשרד הבריאות:

051 96 26529 00

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות ב- 04/2014.

לשם הפספוט והקבלת הקריאה, עלון זה בנוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה והדלקת בעלון מעידים לבני שני המינים.

יצרן ובעל רישום: דקסמול® בע"מ

רח' דקסל 1, אור-עקיבא 3060000, ישראל