



## فاسيجين® ٥٠٠ ملغ أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على تينيدازول Tinidazole 500 mg

قائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر في الفقرة ٦.

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

### (١) لأي غرض مخصص الدواء؟

- لعلاج التلوثات في الأعضاء التناسلية والمسالك البولية لدى النساء والرجال على حد سواء التي تحدث بسبب المشعرة المهبيلية (trichomonas vaginalis).
- لمنع تلوثات تسببها جراثيم لا هوائية بعد عمليات جراحية نسائية وعمليات جراحية في البطن.

**الفصلية العلاجية:** دواء من فصيلة الأزول، لعلاج التلوثات الطفيلية والجرثومية.

### (٢) قبل إستعمال الدواء:

**❌ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:**

- × لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت حساساً (البرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.
- × لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت حاملاً في الثلث الأول من الحمل أو مرضعة.
- × لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت تعاني من مرض عصبي أياً كان.
- × لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في تركيبة الدم (blood dyscrasias).

لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج:

- إذا كنت حاملاً في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.
- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة جهاز الأعصاب.
- إذا كنت تتناول أدوية ضد تخثر الدم، يجب مراقبة وملاءمة جرعة مضادات التخثر في حال وجود حاجة لذلك.

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء**

- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

**❗ إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إكح للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.** يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية ضد تخثر الدم لأنه يجب مراقبة وملاءمة جرعتها في حال وجود حاجة لذلك، وفقاً لتعليمات الطبيب.
- ديسولفيرام (اللطام من الكحول) أو خلال ١٤ يوماً من التوقف عن العلاج به.

### ❗ إستعمال فاسيجين® والطعام

يجب تناول الدواء مع أو بعد وجبة طعام. يجب بلع الدواء مع القليل من الماء.

### ❗ إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يجوز إستهلاك الكحول بتاتاً خلال العلاج بالدواء ولمدة ٧٢ ساعة على الأقل بعد نهاية العلاج.

### ❗ الحمل والإرضاع

لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت حاملاً في الثلث الأول أو مرضعة. إذا كنت في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج.

### ❗ السباقة وإستعمال الماكينات

لا يجوز القيادة أو تشغيل ماكينات خطيرة إذا كان إستعمال فاسيجين® يسبب أعراض جانبية لديك مثل: دوار، نعاس وإضطرابات في التناسق والحركة.

### (٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً! عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

**لا تتجاوز الجرعة الموصى بها!**

لا يجوز السحق/الشطط/الضغ! لأن الأقراص مطلية.

**إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء،**

توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

**إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب،** لا يجوز تناول جرعة

مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى لو طرأ تحسن على وضعك الصحي.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### ٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال فاسيجين® قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها.

**يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالاً إذا:**

كنت تعاني من رد فعل اليرجي مثل: صعوبات في التنفس، صغير عند التنفس، إنتفاخ في الجفون، في الوجه، في الشفتين أو في اللسان، طفح (شرى)، حكة.

**الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً:**

دوار، ثيرتيغو، تشنجات (نادر)، إضطرابات في التناسق والحركة، عدم السيطرة على العضلات، إنخفاض الشعور بالألم، تنمل، مرض أعصاب محيطية، إضطرابات حسية، فقدان الشهية للطعام، التهاب في الفم، التهاب اللسان وتغير في لون اللسان.

**أعراض جانبية إضافية:**

سخونة، إرهاق، إسهال، غثيان/ تقيؤات، ألم بطن، صداع، إضطراب في حاسة المذاق، بول داكن، نقص الكريات البيضاء (leukopenia).

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

#### ٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. يجب تخزين الدواء في درجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية.

#### ٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Microcrystalline cellulose PH 102, Alginic acid, Maize starch (dried), Hydroxypropyl methylcellulose 2910, Vegetable Magnesium stearate, Titanium dioxide E171, Propylene glycol, Sodium lauryl sulfate.

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:**

فاسيجين® ٥٠٠ ملغ: قرص مدور بلون أبيض مطبوع عليه الكتابة «FAS 500» على جانب واحد. الدواء متوفر ضمن بليستر فيه ٤ أقراص.

اسم المنتج: فايزر PGM، فرنسا.

صاحب الإمتياز: فايزر فارماسيوتيكس إسرائيل م.ض.، شارع شنكر ٩، هرتسليا بيتوواح ٤٦٧٢٥

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورُخص في تاريخ: كانون الأول ٢٠١٣

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

١١١-٩٩-٢١٣٢٧-٠٠

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.