

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד



פאסיג'ין® 500 מ"ג טבליות מצופות

כל טבליה מכילה טינידזול 500 mg Tnidazole
רשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר בפרק 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו רשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

- לטיפול בזיהומים של אברי המין ודרכי השתן ובגברים כאחד הנגרמים על ידי טריכומונס וגנילית.
- למניעת זיהומים של חידיקים אנארוביים אחרי ניתוחים גניקולוגיים וניתוחי בטן.

קבוצה תרופתית:

תרופה ממשפחת האזולים, לטיפול בזיהומים טפילים וחיידקיים.

2. לפני השימוש בתרופה:

⚠️ אין להשתמש בתרופה אם:

- × אין להשתמש בתרופה אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- × אין להשתמש בתרופה אם הנך בהריון בשליש הראשון או מניקה.
- × אין להשתמש בתרופה אם הנך סובל ממחלה ניורולוגית כלשהי.
- × אין להשתמש בתרופה אם אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בהרכב הדם (blood dyscrasias).

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

- אם הנך בהריון בשליש השני או השלישי.
- אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד מערכת העצבים.
- אם הנך נוטל תרופות נגד קרישת דם, יש לנטר ולהתאים במידת הצורך את מינון נוגדי הקרישה.

אזהרות מיוחדות השימוש בתרופה

- אם אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עלך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

⚠️ **אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות נגד קרישת דם מכיוון שיש לנטר ולהתאים במידת הצורך את המינון שלהן, לפי הוראות הרופא.
- דיסולפירם (לגמליה מאלכוהול) או תוך 14 יום מהפסקת טיפול בו.

⚠️ השימוש בפאסיג'ין® ומזון

יש ליטול את התרופה עם או אחרי ארוחה. יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.

⚠️ שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לצרוך כלל אלכוהול במהלך הטיפול בתרופה ולמשך 72 שעות לפחות לאחר תום הטיפול.

⚠️ הריון והנקה

אין להשתמש בתרופה אם הנך בהריון בשליש הראשון או מניקה.

אם הנך בשליש השני או השלישי להריון יש להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול.

⚠️ נהיגה ושימוש במכונית

אין לנהוג או להפעיל מכונית מסוכנת במידה והשימוש בפאסיג'ין® גורם לך לתופעות לוואי כגון: סחרחורת, ישנוניות והפרעות בתיאום ובתנועה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא! עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת!

אסור לכתוש/לחצות/ללעוס! מכיוון שהטבליות מצופות.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מינון של בית חולים והבא ארזית התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, רשימתם בפאסיג'ין® עלול לגרום לתופעות לוואי. חלק מהמשמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם:

הנך סובל מתגובה אלרגית כגון: קושי בנשימה, צפצופים בנשימה, נפיחות בעפעפיים, בפינים, בשפתניים או בלשון, פריחה (סרפדת), גרד.

תופעות לוואי המהיבות התייחסות מיוחדת:

סחרחורת, ורטיגו, עוויתות (נדיר), הפרעות בתיאום ובתנועה, אי שליטה בשרירים, רגישות נמוכה לכאב, נימול, מחלת עצבים היקפיים, הפרעות תחושתיות, אובדן תאבון, דלקת בפה, דלקת הלשון ושיתוי צבע הלשון.

תופעות לוואי נוספות:

חום, עייפות, שלשול, בחילה/קאות, כאב בטן, כאב ראש, הפרעה בחוש הטעם, שנת כחה, ליקופניה.
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא הוזכרה בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לילדים ידם של ילדים /או/ תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה הנמוכה מ 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Microcrystalline cellulose PH 102, Alginate acid, Maize starch (dried), Hydroxypropyl methylcellulose 2910, Vegetable Magnesium stearate, Titanium dioxide E171, Propylene glycol, Sodium lauryl sulfate.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

פאסיג'ין® 500 מ"ג: טבליה עגולה בצבע לבן עם הכיתוב "FAS 500" מוטבע בצד אחד.

התרופה מגיעה בבליסטר של 4 טבליות.

שם היצרן: פיזר PGM, צרפת.

בעל הרישום: פיזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ, שנקר 9, הרצליה פיתוח 46725.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: דצמבר 2013.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 111-99-21327-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. אף על זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.