

## ALERT CARD

**חשוב- כרטיס אזהרה**  
זיאגן (abacavir sulfate) טבליות  
זיאגן (abacavir sulfate) תמיסה לשתייה  
קיווקסה (abacavir sulphate/ lamivudine) טבליות  
טריזיוויר (abacavir sulphate/ lamivudine/ zidovudine) טבליות  
שא כרטיס זה איתך כל הזמן

מטופלים הלוקחים זיאגן/ קיווקסה/ טריזיוויר עשויים לפתח תגובת רגישות יתר (תגובה אלרגית חמורה) אשר יכולה להיות מסכנת חיים אם הטיפול ממשיך. **פנה לרופא שלך מיד להתייעצות האם עליך להפסיק לקחת זיאגן/קיווקסה/טריזיוויר אם:**

- (1) אתה מפתח פריחה בעור או
- (2) אתה מפתח תסמין אחד או יותר מ-2 הקבוצות הבאות לפחות:
  - חום
  - קוצר נשימה, כאב גרון או שיעול
  - בחילה או הקאות או שלשול או כאב בטן
  - עייפות קשה או כאבים או הרגשת חולי כללית

אם הפסקת לקחת זיאגן/ קיווקסה/ טריזיוויר עקב תגובה זו, **אסור לך לקחת שוב לעולם** זיאגן/ קיווקסה/ טריזיוויר או כל תרופה אחרת המכילה אבקיור, שכן **תוך שעות** אתה עלול לחוות ירידה מסכנת חיים בלחץ הדם שלך או מוות.

**אם הרופא שלך אינו זמין, עליך לפנות לעזרה רפואית חלופית בדחיפות (למשל חדר מיון של ביה"ח הקרוב).**

**IMPORTANT - ALERT CARD**  
Ziagen (abacavir sulfate) Tablets  
Ziagen (abacavir sulfate) Oral Solution  
Kivexa (abacavir sulphate/ lamivudine) Tablets  
Trizivir (abacavir sulphate/ lamivudine/ zidovudine) Tablets  
Carry this card with you at all times

Patients taking Ziagen/ Kivexa/ Trizivir may develop a hypersensitivity reaction (serious allergic reaction) which **can be life-threatening** if treatment is continued. **CONTACT YOUR DOCTOR IMMEDIATELY** for advice on whether you should stop taking Ziagen/ Kivexa/ Trizivir if:

- 1) you get a skin rash OR
- 2) you get one or more symptoms from at least 2 of the following groups
  - fever
  - shortness of breath, sore throat or cough
  - nausea or vomiting or diarrhoea or abdominal pain
  - severe tiredness or achiness or generally feeling ill

If you have discontinued taking Ziagen/ Kivexa/ Trizivir due to this reaction, **YOU MUST NEVER AGAIN TAKE** Ziagen/ Kivexa/ Trizivir or any other abacavir containing medicine, as **within hours** you may experience a life-threatening lowering of your blood pressure or death.

**If your doctor is not available, you must urgently seek alternative medical advice (e.g. the emergency unit of the nearest hospital).**