

הודעה על החמרה (מידע בטיחות) בעלון לצרכן

תאריך 18/12/14

שם תכשיר באנגלית ומספר:

Glycerin Forte Suppositories (1428432039)

Glycerin Suppositories (0313825506)

Glycerin paediatric Suppositories (0338125843)

שם בעל הרישום סס-און בע"מ

טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד !

ההחמרות המבוקשות		
טקסט חדש	טקסט נוכחי	פרק בעלון
<ul style="list-style-type: none"> אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (גליצרין) או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים. אם לא הופיעה פעילות מעיים במשך יום אחד או יומיים בלבד (ראה גם בסעיף "אזהרות"). במקרה של אי ספיקת לב במקרה של דימום רקטלי בלתי מוסבר ובמקרה של חסימת מעיים או חוסר תפקוד כרוני של המעיים. במקרים של בחילות, הקאות, כאבי בטן במקרים של סימנים של דלקת התוספתן 	<ul style="list-style-type: none"> אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (גליצרין) או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים. במקרה של חסימת מעיים או חוסר תפקוד כרוני של המעיים. 	<p>אין להשתמש בתרופה:</p>
<ul style="list-style-type: none"> את בהריון או מניקה אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הלב ו/או כלי דם, מערכת העיכול, מכאב בטן חזר, מדימום בפי הטבעת, מסימנים של דלקת התוספתן (כגון כאב בטן, בחילות והקאות). אם הבחנת בשינוי פתאומי בתדירות פעילות המעיים אשר מתמשך מעל לשבועיים 	<ul style="list-style-type: none"> את בהריון אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הלב, מכאב בטן חזק, מדימום בפי הטבעת, מסימנים של דלקת התוספתן (כגון כאב בטן, בחילות והקאות בלתי מזוהים). 	<p>לפני הטיפול בגליצרין ספר לרופא אם:</p>
<p>אם את בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש</p>	<p>אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת השימוש אם הינך בהריון</p>	<p>הריון והנקה:</p>
<p>כמו בכל תרופה, השימוש בגליצרין עלול לגרום בחלק מהמשתמשים לתופעות לוואי כגון פריחה בעור עם גירויים, בחילה, סחרחורת, כאבי בטן.. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.</p> <p>יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם:</p> <ul style="list-style-type: none"> אתה סובל מגירוי מקומי, מפריחה מקומית או דלקת. הופעת דימום רקטלי או העדר פעולת מעיים אחרי שימוש בתכשיר. הופיעה תגובה אלרגית שמתבטאת בגרד, נפיחות בפנים, בידים, בפה או בגרון, לחץ בחזה, קשיי נשימה. 	<p>השימוש בגליצרין עלול לגרום לתופעות לוואי כגון פריחה בעור</p> <p>יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם:</p> <ul style="list-style-type: none"> אתה סובל מגירוי מקומי או דלקת. 	<p>תופעות לוואי:</p>