

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - ١٩٨٦

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها

فُحص ورُخص من قبلها في تموز ٢٠٠٦

إيلوكوم غسول

التركيب: Mometasone furoate 0.1%

المواد غير الفعالة:

Alcohol isopropyl, Propylene glycol, Hydroxypropylcellulose, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Purified water.

تأثيرات الدواء الطبية:

مضاد للالتهابات, للعلاج الموضعي على سطح الجلد وعلى جلد فروة الرأس في التهابات الجلد التي تستجيب للكورتيكوستيروئيدات.

متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟

لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.
لا يجوز الاستعمال في حالات العقبولة (هريس), جدري الماء وسل الجلد.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل أو الرضاعة.
إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة: العينين (كالجلوكوما), السكري.

تحذيرات:

لا يجوز استعمال هذا الدواء لغرض لم يوصف من قبل الطبيب.
لا يجوز استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب.
يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء.
لا يجوز الدهن على مساحات واسعة من الجلد أو الجروح المفتوحة.
إن استعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمراهقين يتطلب حذر خاص, لذا فالاستعمال لديهم يجب أن يترافق بمراقبة طبية.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر, فيجب إعلام الطبيب المعالج, وذلك لتفادي الأضرار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء, فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية مثل: تهيج موضعي, حرقان في الجلد, حكة. تخففي هذه الأعراض عادة خلال فترة قصيرة بعد فترة التعود على المستحضر, لكن إذا استمرت هذه الأعراض أو إذا حصل تفاقم في الجلد و/أو في جلد فروة الرأس يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال والرضع:
على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل عرض جانبي وكذلك عن كل دواء آخر يُعطى للطفل/ة!

المقادير الدوائية الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:
إدهن/ي قطرات معدودة من الغسول على المنطقة المصابة/جلد فروة الرأس مرة في اليوم.
ذلك/ي بلطف وبشكل جذري حتى اختفاء الدواء.
الجرعة حسب تعليمات الطبيب فقط.
يجب مراجعة الطبيب إذا لم يطرأ تحسن على وضعك خلال أسبوع أو إذا تفاقم وضعك، إذا سبب المستحضر تهيجات في الجلد.

لا يجوز العلاج بالمستحضر لدى الرضع والأطفال دون ٤ سنين من العمر لفترة تزيد عن ٣ أسابيع.
يجب الامتناع عن استعمال الضمادات السوداء في المنطقة المصابة إذا لم يوصي الطبيب بذلك (تعتبر الحفاضات البلاستيكية من الضمادات السوداء).

إنتبه/ي!

هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.
يجب الامتناع عن تماس الدواء بالعينين، الأنسجة المخاطية (كالفم والأنف). في حال التماس يجب غسلهم جيداً.

إرشادات الاستعمال:

يجب دهن المستحضر بمساعدة الإصبع ومن ثم غسل الإصبع جيداً

كيف تستطيع/ين المساهمة نجاح العلاج؟

لا تتوقف/ي عن استعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

تجنب/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً أ عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تمنع/ين التسمم.
إذا أفرطت في استعمال المقادير الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه الى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمرضى آخر. **لا تعط/ي من الدواء إلى أقاربك، جيرانك أو معارفك.**
لا تتناول/ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة لا تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

بالإمكان الاستعمال لفترة ٣ أشهر من يوم فتح الدواء للمرة الأولى.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن.
الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢٢.٢٨٧١٥.٤٨.١٣٧

المنتج:

ميرك شارپ ودوهم كورپ., نيوجيرسي, الولايات المتحدة الأمريكية.

صاحب التسجيل: شركة ميرك شارپ ودوهم (إسرائيل - ١٩٩٦) م.ض., ص.ب. ٧١٢١, بيتح - تكفا ٤٩١٧٠.