

עלן לצריך לפי תקנות הרוקחים (תק Shirim)

התשמ"י-1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

נוורופן® פלוֹס

טבליות

חומרם פעילים:

כל טבלייה מכילה:

איבuprofen 200 mg

קודאין פואפט האמיידראט 12.8 mg

Codeine phosphate hemihydrate 12.8 mg

(שווה ערך לקודאין 10 mg)

(equivalent to codeine 10 mg)

חומרם בלתי פעילים: ראה סעיף 6 - מידע נוסף.

קרוא בעין את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמצתי על התרופה. אם יש לך שאלות

נסופות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 שנים.

עלך לבלוע את התרופה בצורה נכונה. הייעוץ ברוקח אם

הינך קוק למידע נסוף. עלך לפעוט את הרופא באם סימני

המחלה (סימפטומים) מחמורים או אין מושתפים לאחר

רוצפים. במידה יש צורך בשימוש ממושך יותר, יש להיוועץ

ברופא או ברוקח, אם נטלת התרופה זו לשיכר כאבי ראש

במשך יותר משלשה ימים, התרופה עלולה להחמיר את

הכאבם.

תרופות המכילות קודאין ישמשו רק לטיפול בכאב חריף

(শমস্কট קצ'ר) בעוצמה בימינית, כגון: כאבים ריאומטיים

(שיגורניים), כאבי גב, נאולגיה, מיגרנה,

כאבי ראש, כאב שיניים וכאבי מזוין.

העוגבה כי שימוש בקודאין עלול להגביר את הסיכון לדיכי

נשימתו.

1. מה מיועדת התרופה?

תרופה זו הניה לשימוש קצר טוויה לשיכר כאב חריף (শমস্কট קצ'ר) בעוצמה בימינית, כגון: כאבים ריאומטיים (שיגורניים), כאבי גב, נאולגיה, מיגרנה, כאב ראש, כאב שיניים וכאבי מזוין.

קבוצה טיפולית

איבuprofen שייר לקבוצת נגדי דלקת שאים סטרואידים. קודאין שייר לקבוצת משככי כאבים אופיאטים.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתכשיר אם:

• הינך בשלושת החודשים האחרונים להרionario או שהינך מניקה.

• אתה רגש (אלרגי) לחומרם הפעילים או לכל אחד מההורכיבים הניטפים אשר מכילה התרופה או לאספירין (ראה סעיף 6).

• הינך סובל או סבלת בעבר (שי אරעים או יותר) מכיב, ניקוב או דימום בקיבה.

• הינך סובל מחלת מחלת כבד או שבעה עורות (שיגורני).

• תרופות להרידה לחץ דם כגון מעכבי ACE (גאגן קפטופריל), חוסמי בטא (גאגן אטמול), חוסמי קולטני אנטיגוטני 2 (גאגן לוסוטן), תרופה תומחתת (גאגן פורוסטמי).

• הינך סובל מחלת לב או שבעה עורות לחיות לב.

• תרופה או חומרה של כליה או בעיות לב.

• הינך סובל מחלת כבד או בעיות לב.

• הינך סובל מחלת לב או בעיות לב.

• הינך צער מ-3 ימים אכיב הראשultimo לימי נסוף.

• הינך ידוע שבગוף עבר מדימום במערכת העיכול או מניקוב בקיבה לאחר נטלת התרופה מקבצת נגדי דלקת שאים סטרואידים.

• סבלת בעבר מתופעות אלרגיות כגון אסטמה, פריחה בעור, גדר, מלת או נפיחות בפינים בנטילה של איבuprofen, אספירין או תרופה דומות.

• אין לטלוב בזמן עם תרופות אחרות מקבצת נגדי דלקת שאים סטרואידים או אספירין במינון יומי מ-75 mg.

• הינך צער מ-12 שנים.

• הינך שייר לקבוצת הקודאין מטבוליזם (פירוק) מהיר

קודאין ולפיך הינך נמצא בסיכון מוגבר לסבול מתופעות לוואי

חומרה בשימוש של קודאין.

• לילדים ואדונאים עקב דום נשינה חסימתי בשינה

מוסכמת, באשר לילדיים (מעל לגיל 12 שנים), יש להזהיר מרכיבה על אופנים או ממשחקם בקורס הכבש וכדומה.

שימוש: אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הין מעשן.

שימוש בתרופה וחשיפה לשמש: תרופה זו איננה מיועדת לשמש כתרופה מחייבת עם חשיבותם מוגברת של מקרים דדים אלה עלולות להטעות לבעלי חיים אחרים (גאנז, יטר, בלבול או נשמה איטית או שטוחית, אישונים מכוכזים, תחושת חול, בחילות, עצירות, חוסר תאבון, במרקם אלה יש לש הפונת מידית את החולות לקלבת טיפול רפואי).

ברוב המקרים לא ניתן לידע מארש האם החולות שיר לקבצת האנשים אשר הם בקבוצת היסICON מחייבת זו. אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת כליל למניעת נזילות מארש האם החולות שיר.

3. כיצד השתמש בתרופה? עלייך לבדוק אם התרופה או הרוקח אם אין בטוח. תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 שנים: מנגנון וילדיהם מעל גיל 12 שנים: 1-2 טבליות עד 3 פעמים ביום. יש להמתין לפחות 4 שעות עד לניטילת המנה הבאה.

אין ליטול מעל 6 טבליות-ב-24 שעות. אין ליטול 3 ימים לאורה מופרשת מרופא. תרופה זו מכילה משלשה מינימ. עם הפסקת השימוש לאחר שימוש ממושך עלולות להופיע תופעות גמילה מהתרופה. אין ליטול מעלה למניעת המומלצת.

יש ליטול את המנה הנומוכה ביוזר המשגגה את מטרת השימוש. עברת את גיל 60.

נטילת תכשיר זה בימין גובה מהמומלץ או לתקופת זמן עטינים, תכשיר תרופה המומלץ, עלולה להגביר את הסיכון לשbez מוח או התקף לב ולדימום בקיבה.

הפקם השימוש ופנה לרופא, אם האcabים נמשכים יותר מ-3 ימים. אם יש לך בעיות לב, עברת שbez מוח או התקף בסיכון למביצים אלו (למשל אם יש לך לחץ דם גבוה, סוכרת או כשלstral גבה, או אם הין מעשן), יש להיוועץ בראף לפני נטלת התרופה.

לפני הטיפול בתרופה זו ספר לרופא אם: הינך סובל או סבלת בעבר מלקיי בתפקיד מערכת הנשימה (גאגן אסטמה) או רגש (גאגן קצ'ר) בעוצמה בימינית, כגון: כאב חריף או כאב ראש או כאב גב, נאולגיה, מיגרנה, כאבים כגן פראצטמול או איבuprofen או אספירין וזאת לאור העוגבה כי שימוש בקודאין עלול להגביר את הסיכון לדיכי נשימתו.

4. תופעות לוואי: תופעות לוואי, השימוש בתרופה, יגרה וריגשה, מומלץ ליטול את הטבליות עם או אחר הארוחה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטשות בעל-ילן מן התרופה, פנה מייד לחדר או לחדר רפואי לאחר שימוש תרופה זו בזמן הדראש, אין ליטול מנה כפוליה. קח את המנה הבאה בזמן הריגול והיוועץ בתרופה, אם יש לך שאלות נוספת בנוגע לשימוש בתרופה, ברופא או ברוקח.

– מבעיות בהקיבת גאנז: צרבת, כאבי בטן, מחלות מע-

– דלקתיות (גאגן מחלת קרונית, קוליטיס כבית).

– מבעיות בקרישת דם, יתר לחץ דם, תת לחץ דם, מחלות לב ווליות – היכך, מעיים, בלוטות והטיס (טירואיד), בלוטת העורמונית, מחלבה בראש או עליה בלחץ התרן וולגטי, מצאבתת אנדומינית או מחלות בהקנות החיבור.

– כולסטROL בבה, סבלת ממלחמות במערכת העיכול כגון: מחלת קרונית או אולדקט כיבת של המעי הגס.

– הינה להר המנקב לב או שbez.

– הינך מועל מטל מטהנים.

– נטלת תרופה מבקצת זօן או כל משכך אחר גרמה לIALIZEDות לוואי חומחות.

– הינך בששת החודשים הראשונים להרionario (ראה סעיף 6).

5. איך לאחנן את התרופה? אם אתה לוחקת תרופה אחרתות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר עלך לרופא או לרוקח, במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה נטל:

– תרופה ננד קריית דם (גאגן קומון וגראתוני), אספירין, טיקלופידין, וופרין.

– תרופה להרידה לחץ דם כגון מעכבי ACE (גאגן קפטופריל), חוסמי בטא (גאגן אטמול), חוסמי קולטני אנטיגוטני 2 (גאגן לוסוטן), לוטסן, תרופה תומחתת (גאגן פורוסטמי).

– מעכבי MAO לטיפול בדיכאון.

– סל'יציליטים / או נוגדי דלקת אחרים.

– תרופה המשפיעה על מערכת העצבים המרכזית (גאגן: תרופה להרעה, לשינה, פראליוזן, לאפליפסיה), קווטיקוטרואידים, מוטוטריאט (לטרון ולספוטן), ותיזאידים, ליטיום, פרובנץ, זידובודין (לאידיז').

הרionario והנקה: אין להשתמש בתרופה אם הינך בשלושת החודשים האחרונים להרionario או אם הין מניקה. נרופן פלוֹס עלול לפגוע בפוריות נשימות. פגיעה זו הינה בהפוך להרעה, לשינה, פראליוזן, לאפליפסיה, תרופה קוטריאידים, מוטוטריאט (לטרון ולספוטן), ותיזאידים, ליטיום, פרובנץ, זידובודין (לאידיז').

אין להשתמש בתרופה אם הינך מניקה.

ונרופן פלוֹס עלול לפגוע בפוריות נשימות.

המוועע על גבי הארץ. תאריך התגובה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• תנאי איחוסין: יש לאחנן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C .

• יש לאחנן באזירה המקורית.

6. מידע נוסף:

• נסוף על החומריים הפעילים המכילה גם: Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycollate, Hypromellose, Starch pregelatinised, Opaspray white M-1-7111B (solids), Talc.

• כדי גראית התרופה ומה מרכיביה: טבלייה לבנה.

• הסימן+A+ מוטבע על הטעינה. הרוכב משקל'ים אם הירץ זוקן להר.

• גודל הארץ: 12 טבליות.

בעל הרישום: ורקט בנקיזר (נייר איסט) בע"מ רח' הנגר 6, הר השרון, תל. 6440, ירושלים 4527704 09-9577055 service.israel@rb.com

שם היצרן: רקט בנקיזר הלט'ק אינטראשיון בע"מ, מיטיגמה, אנגליה.

עלון זה נבדק ואישר ע"י משרד הבריאות בתאריך: מאי 2015.

7. מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי

במשרד הבריאות: 132 54 31026.

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה מסוכן בלשון זכר.