



- 5. עצום את עינן למשך 30 שניות.
- 6. רחץ ידיים לאחר מריחת זובירוקס.

אין לעברו על המנה המומלצת.

אם השתמשת בטיעות במינן גבוה יותר

ספר להרחק או לרוקח שלך אם אתה משתמש בו יותר מדי זובירוקס. זובירוקס משחת עיניים מיועדת לשימוש בעין, אם בלעת ממנה פנה לרופא או לרוקח שלך.

אם בטיעות בעל ירך מן התורפה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבאירות התורפה איתך.

אם שכחת לשתחטט בתורפה

- אם שכחת לשתחטט בזכירוקס', השתמש בהרגע שנזכרת. אולם, אם הזמן סתום למועד המנה הבאה שלך, וdag על המנה שהוחומצה.
 - אין לשתחטט ממנה כפולה כדי לפצוץ עלמנה שנשחטה.
- יש להתרמוד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם לא קחת תרופות בחושך וממנה בכל פעם שهنך נטל תרופה. הררכב משקפיים אם הנך יzkוק להם.

אם ש לך שאלות נוספות בוגוע לשימוש בתורפה, הוויעך ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בזכירוקס' עלול לגרום לתופעות לוואי באחלה מהמשתמשים. אל ת.table למלקרא רשות תופעות הלואו. יתכן ולא תסבול מארח אחת מהן.

תגובהות אלרגיות (תופעות בפחות מ-1 מילון 10,000 אנשים) אם יש לך תגובה אלרגית, **פסיק לשתחטט בזכירוקס' ונפה מיד לרופא**. הסימנים יכול כלול:

- פריחה, גיד או חרולת (גבישויות מגדורות) על העור שלך
- פ貴ות של הפם, השפתיים, הלשון או חלקים אחרים בגוף שלך
- קוצר נשימה, צצופים או קושׂשׂ לנשימה
- חום בלתי מוסבר ותוחשה של עלפון, במיוחד בעת מעבר לעמידה.

תופעות לוואי נוספת

שיכחות מאוד (תופעות ביותר מ-1 מילון 10 אנשים)

גירוי או חרישה כלואו יש משחו בעין שלך.

שיכחות (תופעות בעד 1 מילון 10 אנשים)

עקבוצ'ן קל בעין שלך מיד לאחר השימוש בזכירוקס'

עינויים פסוחות, דROWSNESS (ליקת הלםות).

נדירות

(תופעות בפחות מ-1 מילון 1,000 אנשים)

עפעפים ונפוחות.

אם הפעעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה בעין, עליך להתריעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התורפה?

- מנע הרעלתו! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום טגר או מלחן מחוץ לשדה הראיות והשׂם דם ורזה מרווחת מינית!/או תינוקות ועל ידי קר תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה לאין והזאה מפורשת לרופא.
- אין לשתחטט בתרופה אחריו תאריך התוגoga (date exp.) המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התוגoga מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מינימום 25°C.
- שמר את השפפרות הרטב כאשר אתה לא משתמש בזכירוקס'.
- יש לשתחטט תוך חדש ימים מפתחת השפפרות לדואשנה.

6. מידע נוסף

• נסף על החומר הפעיל, התורפה מכילה גם –

White soft paraffin (white petrolatum).

כיצד נראית התורפה ומה תוכן הארייה –

כל קרטון מכל 4.5 g שפפרת של זובירוקס. לשפפרת יש מכסה וכיילה משחה בצעב אפוי-ויאו.

בעל הרשות: ל.קסוסטיטילין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.

יצרן: יוביילט הוליסטיטיטיר שופרפט ליליט, קובירוקס, קודהה.

עלן זו נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות ב-יולי 2014.

מספר רישום התורפה בפקנס' התורפות הממלכתי במשרד הבריאות: 027-71-21521

מיועדת לבני שני המינים.

Zov OO PT 30

החוור הפעיל הוא אצטילקוביר W/a 3%.

רשימת הרכבים הנוספים מפורטת בסעיף 6.

קרא בעזין את העלון עד סוף בוטום תשתמש בתורפה. עלון זה מכיל מידע תמציתית על התורפה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. הוא עלול להזקק לך אם אפילו אם נהאה לך כי מכם רפואי זונה.

1. למה מיועדת התורפה?

זובירוקס' משחת עיניים (נקראת 'זובירוקס' בעלון זה) מכילה תרופה המכנית אצטילקוביר. היא משמשת לטיפול בחויפות בעיניים הנגרמים על ידי נגיף רפואי טיפלקלקס. הוא פועל על ידי עיצירת הדוליה או הריגת של גזופים בתחום הקדמי של גלגל העין שלך (קוניטיה).

קבוצה טיפולית
אנט-וירלי.

2. לפחות שימוש בתורפה

אין לשתחטט בתורפה אם:

- אתה גרייש (אלרגי) לאצטילקוביר, ולאצטילקוביר או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילים אצטילקוביר (אצטילקוביר, פקטו סטטוט סטטוט סטטוט). פנה לרופא או לרוקח ש郎 פניה לשימוש בזכירוקס'.

אזורות מיוחדות הנגועות לשימוש בתורפה:

ספר לרופא או לרוקח ש郎 לפני השימוש בזכירוקס' אם:

- אתה מרכיב עדשות מגן, הסकק להרכיב אתון במנון תושימוש בזכירוקס'.
- אם אין לך בתוכו, פנה לרופא או לרוקח ש郎 לפני השימוש בזכירוקס'.
- אם אתה לודק, או אם אתה לודק לאם ראיין ברורה. תרופות צמחיות ותוספי תזונה, ספר לך לרופא או לרוקח.

הרין והנקה:

אם הין בהרין או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

נήגיה וטומסן במכוון:

אתה עשוי חזרות טוטשוט ראייה לאחר השימוש בזכירוקס'. **אל תנגע או תשתחטט** במכונות כלשהן אלא אם ראיין ברורה.

3. כיצד תשתחטט בתרופה?

תמיד יש לשתחטט לפני הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או לרוקח אם אין לך בתוכו. המינון ואופן הטיפול וקבע על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל הוא:

- 1 ס"מ זובירוקס' למרייה בעין הנגועה במשך פעמיים ביום.
- עליך לשחות כמותו של זובירוקס' של ארבע שעות בין מליחיה של זובירוקס' השעות המוציאות הן: 23:00-07:00, 11:00-15:00, 19:00-21:00.
- עליך להמשיך לשתחטט בזכירוקס' לפחות 3 ימים לאחר שמאכבל העין שלך התשרפה.
- אייתיר עליה להיות מטופשתת לפחות 5 עד 10 דקות לאחר מריהה של זובירוקס'.
- המן עד שתוכל שוב לראות בברור לפני נήגיה או שימוש בכלים או מכונות כלשהם.

כיצד לארה זובירוקס' לעין שלך?

רחץ את ידיים.

השתמש באצבע שלך כדי לשחוט בעינך כידי מסתת את העפעף והחתון של עין הגעה.

3. הטה את ראשך קלות לאחר והבט מלעלת.

4. מחר 1 ס"מ של זובירוקס' לתוך העפעף והחתון של עין השתדל להמען מגע של קארא השפפרות בחלק כלשהו של עין.

