

- نه زنیف هملا قله عده قیمه و متن طلا اینا
نالا لاید biger (اکلیسیفرا پرمتی) زنیف هملا
قیمه عده لشه نه بسته طلا (gold).
بالعمرتسل بیلیخ تیپنیانه باید آنے کل عملمندانه
بینی و

إذا سبست تناول الماء: يجب تناول الماء في أوقات محددة حسب ما محدد في وقت القيمة المعالج، إذا سبست تناول الماء في وقت المقدار المحدد، يجب تناول الماء في كل حال، لكن لا يجوز تناول الماء مفاجأة، تناول الماء على الأقل في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب المراقبة على طعامك كل يوم من قبل الطبيب.

لانتهاء الأدوية في المرة: يجب شخيص طابع الماء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ومن المفترض أن يكون الماء الذي أذن لك الطبيب.

٤ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب

- إلا في الطبيب أو الصيدلي بالخصوص إذا كنت تتناول:

 - أسيبرين أو الأسپاراسيت.
 - الوريد التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (مثل: فينوتريازاتين، أدوية مهدئه، أدوية أرانبوكسون، التشنجات، مضادات الهيستامين، مضخة الأوكسيتوسين).
 - مواد مقدرة للعمليات الجراحية ومسكبات الآلام من قصبة المعدة.
 - الوريد ضد نشر الدم MAOI.
 - مستحضرات ضد ارتفاع ضغط الأعصاب لا ستيروبينيدية أو الوريد ضد ارتفاع ضغط الأوعية الدموية أو السقوفنة.
 - الوريد مضادة لغاز الكوليون [مث: مستحضرات ضد تشنجات البطن].
 - الوريد التي تضر بغضق شفاط انتزاعات الكبد مثل باربوريات أو فينېتين (التشنجات).
 - الوريد ضد التشنجات.
 - بوناسينوم كلوريد.
 - استعمال المواد والطعام:**
 - يجب تناول الدواء مع أو بعدوجبة الطعام.
 - الحمل والإرضاع:**
 - منوع استعمال الدواء خلال العمل والإرضاع.

السيادة واستعمال الماكولات:

 - لا يجوز تناوله قبل أو تناوله تناقل طفارة خلال استعمال هذا الدواء أو قبل تناوله قد يضعف القبلة.
 - بالنسبة للأطفال يجب تناوله من قبل قيادة دراجة أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.

(٣) فحقة استعمال الدواء:

 - يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً.
 - على الإستفاضة من الطبيب أو الصيدلي الذي لم تكن واقفاً.
 - طرقه وطريقه العلاج بحددها من قبل الطبيب فقط.
 - لا يجوز تناول جرعة قدرها ٨ أقراص خالٍ ٤ ساعه.
 - هذا الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر ١٢ سنة.
 - إذا لم تطرأ تحسن على حالتك خلال ٢ أيام يجب التوجه إلى الطبيب ثانية.
 - اتفاقي: يجب الانتظار على الأطباء وتناول المنيات التناقضية.
 - الأقل فين تناول هذا الدواء وتناول المنيات التناقضية: مضادات الميكروبية كذلك يجب الانتظار فترة ٦ ساعات بين تناول هذا الدواء وحقن دوxygen.

كتيبة الاستعمال:

 - يجب بلع الدواء مع الماء، بالإمكان تناول الدواء مع أو بعدوجبة الطعام.
 - في الأماكن سحق الأقراص قبل تناولها لا يجوز تخزين الأقراص سухة.
 - لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.
 - إذا تناولت بالخطأ جرعة كبيرة: إذا تناولت بالخطأ جرعة مفرطة أو إذا بلع طفلاً جرعة الماء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأخصر على الماء معك.