פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו
לשימוש וטרינרי בלבד
ע"פ מרשם רופא וטרינרי

T61 וטרינרי
T61 Veterinary

תמיסה להזרקה
Solution for injection
למתן תוך-ורידי, תוך-ריאתי
For I.V., Intra-Pulmonary use

חומר הזרקה להמתת חסד לשימוש בכלבים, חתולים, סוסים, יונים, ציפורי שיר, חיות מעבדה וחיות אחרות.

הרכב: כל 1 מ"ל מכיל:

Embutramide	200 mg
Mebezonium iodide	50 mg
Tetracaine HCl	5 mg

מינון והתוויה:

כלבים
הזרקה תוך-ורידית: 0.3 מ"ל/ק"ג משקל גוף.
ההזרקה צריכה להיות מהירה דייה אבל לא מהירה מידי.
הזרקה תוך-ריאתית: עד למשקל 10 ק"ג משקל גוף - 10-7 מ"ל.
מעל 10 ק"ג משקל גוף בתחילה 10 מ"ל וכמנה שניה 10-3 מ"ל בהזרקה לתוך הלב או תוך-ריאתית כאשר בעה"ח נפל על צידו.
נקודת ההזרקה התוך-ריאתית הטובה ביותר נמצאת בשליש החלק הגבי העליון של חלל בית החזה מיד ובצמוד לחלק האחורי של עצם הסקפולה.
ניתן להזריק כאשר בעה"ח במצב עמידה או במצב שכיבה על ביטנו.
יש להשתמש במחט חדה וארוכה מספיק בהתאם למידות בעה"ח.
יש להחדיר את המחט בצורה אלכסונית כאשר היא מופנית לכיוון ראש החיה בנגוד למרפק הבע"ח.

חתולים
הזרקה תוך-ריאתית:
חתלתולים בני מס' ימים - 1 מ"ל
חתולים עד גיל 6 חודשים - 3 מ"ל
חתולים מעל גיל 6 חודשים - 5 מ"ל
חתולים ששוקלים יותר מ 5 ק"ג - 10 מ"ל

ההזרקה הנוחה והטובה ביותר נעשית כאשר החתול שוכב ומוחזק על ביטנו. מחט חדה מותאמת לגודלו של החתול מוחדרת כ 3-2 ס"מ מתחת לעמוד השידרה במרכז בית החזה, בצורה אלכסונית, מוטת קדימה בנגוד למרפק החתול.

מינק
הזרקה תוך-ריאתית : 0.5-1 מ"ל

חיות גדולות:
דיווחים מרופאים וטרינריים בשטח מצביעים על כך שניתן להשתמש ב-T61 גם בחיות גדולות.
המינון המומלץ הוא 6-4 מ"ל/50 ק"ג משקל גוף בהזרקה תוך-ורידית.
ההזרקה צריכה להיות מהירה אבל לא יותר מידי.

בשר מחיות שהומתו ע"י T61 אינו מתאים למאכל אדם וחיות.

בע"ח אחרים (יונים, ציפורי שיר, חיות מעבדה):
הזרקה תוך-ריאתית של 0.5-1 מ"ל בהתאם לגודל החיה.

לשים לב:
יש להשתמש בתכשיר בזהירות.
במקרה של תזוזה פתאומית של בעה"ח אם חלק מהחומר הוזרק ליד המפעיל או חדר דרך פצע פתוח או המפעיל דקר עצמו,
יש לרחוץ ביסודיות את חלק העור הנגוע אם המחט חדרה לתוך העור,
יש לגרום ללחץ במקום ההזרקה על מנת לנסות ולהוציא את החומר המוזרק באופן מיידי.
יש לשקול שימוש בתרופות אנאלפטיות לטיפול סימפטומטי.
אנטידוט אפשרי הוא Neostigmin וטיפול ב-N-Acetylcystein (נגד נזק בכבד).

חומרי גלם בלתי פעילים:
Dimethylformamide, Water for injection

הגשה: בקבוק של 50 מ"ל

יצרן:
אינטרוווט אינטרנשיונל GmbH, אונטרשלייסהים, גרמניה.
בעל הרישום:
אינטרוווט (ישראל) בע"מ, א.ת. נווה-נאמן 2, הוד השרון 45240

Intervet

T61VET SOL SH0807015