

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אלכוקסידין תמיסה

הרכב וכמות החומר הפעיל: Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v, Alcohol 70% v/v

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

1. למה מיועדת התרופה?

אלכוקסידין הינה תמיסה לחיטוי העור. לשימוש חיצוני בלבד.

קבוצה תרפויטית- תכשירים אנטיספטיים.

2. לפני שימוש בתרופה

א. מתי אין להשתמש בתכשיר?

- אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.
- אין להשתמש בתמיסה על רקמת המוח, קרום המוח או האוזן התיכונה.
- השימוש בתכשיר אינו מהווה תחליף לכפפות סטריליות.
- אין להשתמש בתכשיר בתינוקות מתחת לגיל חודשיים.
- אין להשתמש בתכשיר על פצעים פתוחים.

ב. אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
- אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
- יש להימנע ממגע עם העיניים או רקמות ריריות.
- במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף העיניים עם הרבה מים.
- במקרים שבהם מתפתחת נפיחות בפצע או הפצע מלווה בחום, יש להיוועץ ברופא.
- אין למהול את התמיסה או להוסיף לה חומרים כלשהם!
- אין לקרב המוצר למקורות חום או אש
- התכשיר מכיל למעלה מ- 20% אלכוהול
- אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התכשיר

ג. תגובות בין-תרופתיות:

אם אתה לוקח , או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

שים לב: לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

יש להימנע ממגע עם עיניים ורקמות ריריות. במקרה של מגע יש לשטוף עם הרבה מים ולפנות לרופא במידת הצורך.

מינון :

אין לעבור על המנה המומלצת.

מינון מקובל , בהיעדר הוראה אחרת מהרופא, ראה את אופן השימוש הבא :

יש לנגב את האזור המיועד לחיטוי בצמר גפן ספוג באלכווקסידין נוזלי, בכל פעם שנדרש.

אם השתמשת במנת יתר או אם בטעות בלעת או בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מינון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, כמו בכל תרופה, השימוש באלכווקסידין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

- גירוי מקומי, דלקת, פריחה, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא.
- בכל מקרה שבו הינך מרגיש תופעת לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ובתינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד. ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- סגור היטב, יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-25°C.
- ניתן להשתמש בתכשיר עד 6 חודשים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה, ולא יאוחר מתאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

- זהירות! חומר דליק, שמור מפני אש
- גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.date) של התרופה! תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
- אחסן באריזה המקורית. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

- Purified water, Sunset yellow C.I. 15935
- **כיצד נראית התרופה : התרופה הינה תמיסה בצבע כתום.**
- יצרן ובעל הרישום: ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 114 בנימינה 3055002, ישראל.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 15.04.2015
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1165028130
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.