



- إذا كانت يداك ضعيفتين، فلن الممكن أن يكون أكثر راحة لديك أن تمسك المنشفة بكأنا اليدين، وإن تض�ي اصبعي السيادة على غلبة الوداء وأصبعي الإبهام على قاعدة المنشفة.
  - إذا لزم الأمر، من الممكن استعمال بيسار (AeroChamber Plus).

卷之三

- اتنز ع غطاء الفمه لا تخرج عليه الياء من غلاف البلاستيك

- نظف الجانب الداخلي والخارجي من الفوهة وغلاف البلاستيك بقطعة قماش جافة ونظيفة أو ورق ناعم.
  - أعد غطاء الفوهة.

- ## • لا يجوز ملامة

- لا يجوز ملامسة الوعاء المعدني مع الماء.

فحص و متابعة:

- سوف يتابع الطبيب أعراض الريبو لديك واستجابتك للعلاج

- في مرضي السكري - من الممكن أن تكون هناك حاجة لمتابعة لصيغة أكدة

- في حالات معينة من الممكن أن يقع الطبع

- فَأَلْفَهُ

- إذا قمت بتناول جرعة زائدة أو إذا ابتلع ولد الدواء بطريق الخطأ، فيجب التوجه فوراً إلى الطوارئ.

- الطيب أو عرقه الطوارى في مستحبى وأحصاره ملوك الدواه معك.  
إذا ظهرت أعراض وخيمة لجراحته مفرطة، توجه للراجل الحصولى من مساعدة طبية تشمل  
أعراض الرغبة المفرطه: المتشدّي في الصدر، ضغط معدى على أو مُنخفض، الرأس، ثنت  
غضلات، صعوبات في النوم، عصبية، جفاف في الفم، فقدان الشهية، تشنجات، اختلالات،  
رعاش، ندأ، إغماء، تعب، شعور بوعكة وشحور عام ينبع من الممكن أيضاً خروج  
اضطرابات في إيقاع ضربات القلب، انخفاض في كمية البوتاسيوم، ارتفاع في انخفاض في  
السكر في الدم، الـ ميطن، غثيان، تقيّي، انخفاض الوزن، انخفاض في مستوى الوعي (يمكن  
التعبير عنه بارتراك وتعاس).  
الطب

- إذا استعملت جُرعةً أعلى من الموصى به، طوال فترة مُتوصلة، يجب إشتارة طبيب لأن شأن الجرارات المُرتفعة أن تُسبب في انخفاض في هرمونات الستيرونيدات التي تُنتَج بشكل اعتدال. في حينها (انظر إلى "الأعراض الحادّة")

- إذا نسيت أن تستعمل المنشقة في الوقت المحدد، ف يجب عليك الاستعمال فوراً ذكرك. إذا حوقت تناول القراءة القادمة، تخطي القراءة المنسية. لا يجوز أخذ جرعتين من أجل التغذية عن القراءة المنسية.

- يجب مواصلة العلاج على النحو الموصى به من قبل الطبيب. حتى وإن طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا تتوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

- إذا توقف عن تناول الماء: من المهم الحرص على استعمال المشقة يومياً، حسب تعليمات الطبيب من أجل السيطرة على الربو، حتى إذا شعرت على ما يرام. إذا رغبت في التوقف عن استخدام المشقة، اشتبر الطبيب، سقير الطبيب يرشن الطريقية قليلاً بذلك، عادةً، بواسطة تخفيف الدورة الدموية من المجرى الدموي.**

- يجب عدم تناول الأدوية في الظلام! تتحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء  
فم بارتداء النظارات إذا كنت بحاجة لها.

- إذا كانت لديك اسئلة أخرى بالنسبة لإستهلاك الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبيّة

- كما هو الحال مع أي دواء، قد يتسبب استخدام ليفوفورم فيثار جانبية لدى بعض المستخدمين، إذ لم تختفي الآثار الجانبية أو إذا كانت مزمعة أو إذا تفاقمت، فيجب استشارة الطبيب. لا تزغ من سرد قائمة الآثار الجانبية، فقد لا تعلمي من أي منها. سهل سنجعل لك الطبيب الجرعة الأنسب والضروسية لعلاج الربو لديك، من أجل تحفيض الجرعة لاحتواء ثائر جانبية.

**توقف الطبيب** فوراً عن ظهور رد فعل تحسسي، رد الفعل التحسسي الوخيم هو أمر نادر، يشمل أعراض رد الفعل التحسسي: انتفاخ ملحي لللثتين، الوجه، الحلق أو الشفتين، سطح جدلي أو حكة على وجه الشخص تلك التي سجلت الجسم (كلام)، دوار، إعماق، تغيير شفاهي في نمط النوم.

[١] مراجعة الأطباء، طب الأطفال، النسخة الخامسة، ٢٠٠٣.

- توقف عن استعمال المنشفة وترجح الطبيب إذا شعرت بعد استعمالك للفلوفيرم مُباشرة بزيادة الصفير وضيق التنفس.** في هذه الحالة، فمُيُسْتَعْمَلْ مُنْشَفَةً مُوجَّهَةً لِدِيكَ الْحَالَاتِ الْتِي تَنْتَاجُ فِيهَا تَخْفِيفَ فُرْقَى وَتَوْجِهَ الطَّبِيبِ.